

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

金 华 猪

GB 2417—81

北 京

1 9 8 1

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

金 华 猪

GB 2417—81

本标准适用于金华猪品种鉴别和在选择、销售等生产、科研、教学活动中对种猪进行分级评定。

### 一、品 种 特 征

#### 1. 特征

金华猪是我国有名的古老猪种。它体格中等，公猪成年体重80~110公斤，母猪75~100公斤；体质细致结实，全身各部位结合良好；毛色两头乌，头颈部和臀尾部为黑色，其余部分为白色。

金华猪性成熟早，遗传稳定，繁殖力强，是经济杂交的优良母本；肥猪早熟易肥，肉质鲜美，是制作金华火腿的优质原料。

#### 2. 生产性能

##### (1) 繁殖性能

金华猪成年母猪产仔数14头左右，产活仔数12~13头，60日龄断乳，重100~130公斤。

##### (2) 肥育性能

金华猪肥猪日增重350~400克，每增重1公斤需可消化能12000大卡左右。

##### (3) 胴体品质

金华猪肥猪70公斤左右屠宰时，屠宰率70~72%，腿臀比例30~32%，瘦肉比例40~45%，骨骼比例7.5~9%，膘厚3.4~3.8厘米，皮厚0.34~0.38厘米。

### 二、种猪评定分级标准

金华猪种猪评定分级在三个生长阶段进行：2月龄的种用仔猪，6月龄的后备种猪，24月龄的繁殖种猪。

#### 3. 种猪必备条件

种猪必备条件是各个生长阶段的种猪都必须具备的共同要求。必备条件缺一者，属于失格，不列入评定分级的范围。种猪必备条件如下：

##### (1) 毛色两头乌；

(2) 皮薄骨细，结构紧凑，后腿皮肤无明显皱褶，6月龄后备种猪后管围不超过13厘米，24月龄种公猪后管围不超过18厘米，24月龄种母猪后管围不超过16厘米；

##### (3) 睾丸、阴户发育正常，有效乳头14只以上；

(4) 符合等级标准的种猪的后代，以及血缘清楚，确系金华猪纯种而本身表现比较优秀的个体。

#### 4. 种猪评定标准

##### (1) 种用仔猪评定标准

种用仔猪根据60日龄体重，断乳同胞数和同胞均匀度（同窝60日龄体重变异系数）三项进行评定，

国 家 标 准 总 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 提 出

1981年3月1日 实施  
金华地区农科所  
金华地区畜牧兽医站  
金华种猪场 起草  
东阳县良种场