



# 中华人民共和国国家标准

GB 17016—1997

---

## 流行性腮腺炎诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of  
management for mumps

1997-10-06 发布

1998-10-01 实施

---

国家技术监督局  
中华人民共和国卫生部

发布

## 前 言

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒引起的急性呼吸道传染病,呈世界性分布,在我国归属于法定丙类传染病,全年均可发病,以冬春季为高峰,多发于儿童,呈散发或流行,在集体儿童机构中可形成暴发流行。临床以唾液腺急性非化脓性肿胀为特征,常伴发脑膜炎、胰腺炎及睾丸炎等。为更好地指导防治工作,特制定本病的诊断标准及处理原则。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由天津市传染病医院负责起草。

本标准起草人:曹武奎、邹焕文。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

## 流行性腮腺炎诊断标准及处理原则

GB 17016—1997

### Diagnostic criteria and principles of management for mumps

#### 1 范围

本标准规定了流行性腮腺炎的诊断标准及处理原则。

本标准适用于全国各级、各类医疗保健和卫生防疫机构对流行性腮腺炎的诊断、报告和处理。

#### 2 诊断原则

主要依靠流行病学史、腮腺和/或其他唾液腺肿大等特征作出临床诊断,确诊须通过血清学及病原学检查。

#### 3 诊断标准

##### 3.1 流行病学史

发病前 2~3 周有与流行性腮腺炎患者接触史或当地有本病流行。

##### 3.2 症状体征

3.2.1 腮腺或其他唾液腺非化脓性肿胀。含食酸性食物胀痛加剧。

3.2.2 剧烈头痛、嗜睡、呕吐、脑膜刺激征阳性。脑脊液呈非化脓性改变(与其他病毒性脑炎相似)。

3.2.3 恶心呕吐、伴中上腹部疼痛与压痛,局部肌紧张。

3.2.4 睾丸肿痛(常为单侧)。

##### 3.3 实验室检测

3.3.1 1 个月内未接种过腮腺炎减毒活疫苗,血清中特异性 IgM 抗体阳性。

3.3.2 双份血清(间隔 2~4 周)IgG 抗体效价呈 4 倍或 4 倍以上增高。

3.3.3 唾液、尿、脑脊液、血中分离到腮腺炎病毒。

##### 3.4 病例分类

###### 3.4.1 疑似病例:

a) 具备 3.2.1 或伴 3.2.2 或 3.2.3 或 3.2.4;

b) 具备 3.2.2 或 3.2.3 或 3.2.4 项加 3.1。

3.4.2 临床诊断病例:3.4.1.1 加 3.1。

3.4.3 确诊病例:疑似病例或临床诊断病例加 3.3.1 或 3.3.2 或 3.3.3。

#### 4 处理原则

##### 4.1 一般治疗与对症处理

4.1.1 注意口腔清洁,清淡饮食,忌酸性食物,多饮水保证入量。

4.1.2 对高热、头痛、呕吐者给予解热止痛、脱水剂等对症治疗。