

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 145.8—1998

烟用香精 香味质量通用评定方法

Tobacco flavor—General method for evaluation of flavor quality

1998-03-12 发布

1998-05-01 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业标准
烟用香精 香味质量通用评定方法
YC/T 145.8—1998

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1998年11月第一版

*

书号：155066·2-12411

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

前 言

本标准为烟草用香精香味质量的评定提供了一种通用方法。本标准在制定过程中参考了QB 1506—1992《烟用香精》。

本系列标准包括：

- YC/T 145.1—1998 烟用香精 酸值的测定
- YC/T 145.2—1998 烟用香精 相对密度的测定
- YC/T 145.3—1998 烟用香精 折光指数的测定
- YC/T 145.4—1998 烟用香精 乙醇中溶混度的评估
- YC/T 145.5—1998 烟用香精 澄清度的评估
- YC/T 145.6—1998 烟用香精 香气质量通用评定方法
- YC/T 145.7—1998 烟用香精 标准样品的确定和保存
- YC/T 145.8—1998 烟用香精 香味质量通用评定方法
- YC/T 145.9—1998 烟用香精 挥发性成分总量通用检测方法

本标准的附录 A 为标准的附录。

本标准的附录 B 为提示的附录。

本标准从 1998 年 5 月 1 日起实施。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院。

本标准主要起草人：谢剑平、胡清源、罗丽娜、胡军。

中华人民共和国烟草行业标准

烟用香精 香味质量通用评定方法

YC/T 145. 8—1998

Tobacco flavor—General method for evaluation of flavor quality

1 范围

本标准规定了评定烟用香精香味质量的通用方法。

本标准适用于烟用香精。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3358.1~3358.3—93 统计学术语

GB 4086.1~4086.6—83 统计分布数值表

GB 5606.4—1996 卷烟 感官技术要求

GB 10220.1—88 感官分析方法总论

GB/T 14455.2—1993 精油 取样方法

GB/T 16447—1996 烟草及烟草制品 调节与测试的大气环境

YC/T 145.4—1998 烟用香精 乙醇中溶混度的评估

YC/T 145.7—1998 烟用香精 标准样品的确定和保存

3 原理

将一定量的待测烟用香精和标准样品分别用适当浓度的乙醇水溶液溶解稀释至一定的浓度,然后用微量注射器将此溶液分别注入未加香精和料液的单料卷烟或配方卷烟中,通过评吸卷烟评定的香味质量是否与标准样品一致。

4 试剂、材料和仪器

4.1 乙醇水溶液

参见 YC/T 145.4。

4.2 烟用香精标准样品

参见 YC/T 145.7。

4.3 试验卷烟

根据待测烟用香精的类型,选择相对应的烟丝或烟支。

4.4 微量注射器

10~25 μL 的微量注射器,精度为 0.1 μL 。

4.5 移液管

容量为 1 mL,精度为 0.01 mL。

4.6 滴定管

国家烟草专卖局 1998-03-12 批准

1998-05-01 实施