

江苏省地方标准

DB32/T 4015—2021

送嫁药防治水稻二化螟技术规程

Technical regulation for the control of *Chilo suppressalis* (Walker)
by application pesticides before rice seedling transplant

2021-03-04 发布

2021-04-04 实施

江苏省市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由南京农业大学提出。

本文件由江苏省农作物标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京农业大学、江苏省植物保护植物检疫站、苏州市吴江区植保植检站、苏州市吴江区平望镇农业服务中心。

本文件主要起草人：吴敏、韩召军、朱凤、李海东、尤希宇、王成燕。

送嫁药防治水稻二化螟技术规程

1 范围

本文件规定了送嫁药防治水稻二化螟的施药条件、送嫁药实施、效果调查和记录。
本文件适用于单季中稻二化螟防治。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则
GB/T 15792—2009 水稻二化螟测报调查规范
NY 21 农药安全使用指南
NY/T 1276 农药安全使用规范总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

送嫁药 **application pesticides before rice seedling transplant**
水稻秧苗移栽前施用农药，其药效可延续到大田。

4 施药条件

4.1 虫源调查

每年4月底至5月初时，选择代表性有效虫源田，根据GB/T 15792—2009提供的棋盘式采样法，调查稻桩中二化螟的幼虫和蛹的数量。

4.2 用药指标

每亩¹⁾稻桩残留虫量(幼虫和蛹数量的总和)大于或等于50头时，应实施送嫁药。

5 送嫁药实施

5.1 施药时间

水稻移栽前2 d~3 d为宜。

1) 1亩≈666.67 m²。