
【倪博士医考语录】

我们的押题：每年小册子原文押中至少一半，如果加上考前视频讲解押中的至少覆盖 70% 以上，智商推理题是不需要押题的，只要智商正常即可，占 25% 左右，**强烈建议您亲自对照我们考前发的小册子一一核实，有没有水分，一清二楚！保证您自己口服心服!!!**
只要课听完，小册子好好看，那么，**中域医考通过率 100%!** 原文对照，就是我们的铁证!!!

原文押中题：小册子原文押中，集中记忆，属于医考**最难记**的部分。

讲解押中题：讲义真题\小册子讲解，漫画故事讲解，属于理解为主，**相对容易**记忆的部分。

智商推理题：不需要特别记忆，属于智商、人文、逻辑推理题，含科普类题，**最容易**部分，属于送分题。

统计源：目前网络公开的执业医师原题共计 490 题

原文押中 257 题，占 52.3%；讲解押中 99 题，占 20.2%；智商推理题 119 题，占 24.2%；未押中或未讲解题 15 题，占 3.0%
讲解押中+小册子原文押中共计占 **72.5%**，如果加上最容易的部分智商推理题共计占 **97%**

按照我们的要求，看我们的考前押题考点，就 7000 个，我们一个一个带着您过的，难记的考点都有漫画，都有原创故事，最最难记的部分统统简化成了最最好记三秒见答案的最 EASY 的题目，还有什么搞不定???

一年的时间成本=10 万

医师资格证=100 万（初级每年挂证 8K，中级 2W，高级 3~5W，平均 2 万，50 年寿命）

您的三个月用心投入中域教育=考试押中铁证=医师资格证=100 万!!!

国家执业医师资格考试已经没有什么秘密了，原文的披露使其走光露点，这个点就是小册子!

2012年国家执业医师资格考试真题与中域教育图书及课程押题对比统计表

原文押中红色 257 题 讲解押中橘红色 99 题 智商推理题褐色 119 题 未押中蓝色 15 题 空格缺失题 10 题

一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
单元	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85		87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		98	99	100
元	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122								130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
二	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
单元	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
元	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
三	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
单元	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
元	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
四	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

倪博士医考微博: <http://weibo.com/drnee> 中文名: 倪博士健康家园

中域 2012 年执业医师图书及押题命中中详情

目 录

2012 原文对照 第一单元.....	1
2012 原文对照第二单元.....	28
2012 原文对照 第三单元.....	57
2012 原文对照 第四单元.....	87

2012 原文对照 第一单元

2012 原文对照 第一单元	中域 2012 年执业医师图书及押题命中详情		备注
	押题出处	考前视频讲解方法	
1. 胆汁酸合成的限速酶是 A. HMG CoA 还原酶 B. 鹅脱氧胆酰 CoA 合成酶 C. 胆固醇 7α-羟化酶 D. 胆酰 CoA 合成酶 E. 7 α -羟胆固醇氧化酶	小册子 49 页原文 初级胆汁酸：胆固醇通过 7α 羟化酶 催化，是限速酶。生成的 胆酸、鹅脱氧胆酸 为游离型初级胆汁酸，它们与甘氨酸、牛磺酸结合后生成结合型初级胆汁酸。 【鹅蛋】		原文押中
2. 治疗癫痫小发作的首选药物是 A. 乙琥胺 B. 硫酸镁 C. 苯巴比妥 D. 扑米酮 E. 苯妥英钠	小册子 53 页原文 小发作： 乙琥胺；丙戊酸钠 对各型的癫痫都行一定疗效； 安定 治疗癫痫持续状态 乙琥胺→小发作，大障碍→ 可引起再生障碍性贫血		原文押中
3. 心理护理的主要目标是 A. 明确患者的人生目标 B. 消除不良的情绪反应 C. 树立良好的道德观念 D. 提高患者的智力水平 E. 改善患者的躯体症状		思想无境界，言行有禁区 珍惜生命，远离政治	智商推理题
4. 下列不属于心理治疗原则的是 A. 正义原则 B. “中立”原则 C. 真诚原则 D. 保密原则 E. 回避原则		患者经常上访？	智商推理题
5. 根据可预防的疾病负担和费用效果分析，下列临床预防服务项目中最优先推荐的措施是 A. 阿司匹林预防心脑血管病 B. 血脂异常的筛检 C. 糖尿病的筛检		阿司匹林很便宜	智商推理题

D. 骨质疏松的筛检 E. 流感的免疫接种			
6. 参与经典途径激活补体的是 A. IgE B. LPS C. IgD D. IgA E. IgM	小册子 49 页原文 【通过胎盘与胎儿 大小三阳 II 型超敏 补体经典途径 皮肤狼疮带 体液免疫产生 IgM 乙脑: IgM 抗体检测】	哥哥和妹妹的故事	原文押中
7. 对一个地区全体居民进行, 可计算当地的 A. 高血压患病率 B. 高血压发病率 C. 高血压家庭续发率 D. 高血压病死率 E. 高血压罹患率	小册子 61 页原文 发病率 (新病例数/特定人群—横断面调查) ——急性病 罹患率: (短时间新发病例频率 ——疾病的流行或爆发 患病率: (新旧病例数/平均人口数) ——现患人数, 适于病程长的慢性病 【激发缓慢 痼疾】		原文押中
8. 医师在执业活动中享受 A. 保护患者隐私 B. 履行医师职责 C. 从事医学研究 D. 遵守技术规范 E. 遵守职业道德		区分权利和义务	智商推理题
9. 下列不属于心身疾病的是 A. 精神分裂症 B. 冠心病 C. 消化性溃疡 D. 糖尿病 E. 高血压		经典的心身疾病是: 溃疡病 溃疡性结肠炎, 甲状腺机能亢进, 局限性肠炎, 类风湿性关节炎, 原发性高血压及支气管哮喘, 糖尿病等	智商推理题
10. 慢性病防治的基本原则不包括 A. 高危人群为主 B. 三级预防并重 C. 以健康教育和健康促进为主要手段 D. 以社区和家庭为基础 E. 生命全程预防			智商推理题
11. 成年人受到持续寒冷刺激时, 产热量大为增加的主要方式是 A. 肝脏代谢增强 B. 基础代谢增强 C. 肌紧张产热 D. 骨骼肌代谢增强 E. 褐色脂肪组织产热		【寒颤】 【游泳与减肥的故事】	讲解押中
12. 公共卫生的功能不包括 A. 提供公平有效的公共服务			智商推理题

<p>B. 预防疾病的发生和传播 C. 预防意外伤害 D. 研究具体的临床治疗措施 E. 促进和鼓励健康行为</p>			
<p>13. 卫生领域中的公平性是指生存机会的 A. 以社会阶层为导向 B. 以支付能力为导向 C. 以需要为导向 D. 以市场经济规律为导向 E. 患者年龄为导向</p>			智商推理题
<p>14. 有关医际关系与医患关系的表述，下列哪项错误的是 A. 医际关系的恶化在一定程度上将对医患关系产生不良影响 B. 医患关系的恶化在一定程度上将对医际关系产生不良影响 C. 处理医际关系和与医患关系依据的伦理原则是相同的 D. 医际关系与医患关系既互相独立又相互关联 E. 良好的医际关系有助于形成良好的医患关系</p>			智商推理题
<p>15. 不含高能磷酸键的化合物是 A. 1,3-二磷酸甘油酸 B. 磷酸肌酸 C. 肌苷三磷酸 D. 磷酸烯醇式丙酮酸 E. 1,6-双磷酸果糖</p>		漫画讲解	讲解押中
<p>16. 医学道德修养是指医务人员在医学道德方面所进行的自我教育，自我锻炼和自我陶冶，以及在此基础上达到的 A. 医学道德境界 B. 医疗实践能力 C. 医疗技术水平 D. 医患沟通能力 E. 医疗道德意识</p>		智商学科强调政治语言，政治高度	智商推理题

<p>17. 大量出汗时尿量减少, 主要原因是</p> <p>A. 血浆胶体渗透压升高, 导致肾小球滤过减少</p> <p>B. 血浆晶体渗透压升高, 引起 ADH 分泌增多</p> <p>C. 肾素-血管紧张素系统活动增强, 可引起醛固酮分泌增多</p> <p>D. 交感神经兴奋, 引起肾小球滤过减少</p> <p>E. 血容量减少, 导致肾小球滤过减小</p>		<p>体液平衡两大调节系统:</p> <p>渗透压主要通过下丘脑·垂体后叶—抗利尿激素 (ADH) 系统进行调节</p> <p>血容量主要通过肾素·血管紧张素 (AT)-醛固酮系统调节</p>	讲解押中
<p>18. 下列选项中仅属于医师的道德义务不属于法律义务的是</p> <p>A. 努力钻研业务, 提高专业技术水平</p> <p>B. 关心、爱护、尊重患者、保护患者隐私</p> <p>C. 宣传卫生保健知识, 对患者进行健康教育</p> <p>D. 遵守法律、法规、遵守技术规范</p> <p>E. 积极开展义诊, 尽力满足患者的健康需求</p>			智商推理题
<p>19. 组织和细胞损伤后, 周围细胞增殖、修复的过程是</p> <p>A. 增生 B. 再生 C. 化生</p> <p>D. 肥大 E. 机化</p>	<p>小册子 50 页原文</p> <p>再生: 先再见, 后生长 (同种细胞) ——先前的没有了</p> <p>化生→非典型增生→癌变【客串】</p>		原文押中
<p>20. 标准正态分布的两个参数值分别是</p> <p>A. $\mu=0, \sigma=0$ B. $\mu=1, \sigma=0$</p> <p>C. $\mu=1, \sigma=-1$ D. $\mu=-1, \sigma=1$</p> <p>E. $\mu=0, \sigma=1$</p>	<p>小册子 60 页原文</p> <p>标准正态分布是均数为 0、标准差并为 1 的正态分布</p>		原文押中
<p>21. 预防医学的特点不包括</p> <p>A. 着重于疾病预防</p> <p>B. 研究方法上注重微观和宏观结合</p> <p>C. 研究对象包括个体和群体</p> <p>D. 以环境、人群为研究重点</p> <p>E. 着重于个体治疗</p>			智商推理题
<p>22. 佐剂的功能不包括</p> <p>A. 作用于 T 细胞抗原受体</p> <p>B. 激活抗原提呈细胞</p>		<p>抗原和抗体结合</p> <p>佐剂机制: 改变抗原的物理</p>	智商推理题

<p>C. 延长抗原的体内滞留时间 D. 改变免疫应答的类型 E. 增强免疫应答</p>		<p>形状；延长抗原在机体内保留时间；刺激单核吞噬细胞对抗原的递呈能力；刺激淋巴细胞分化，增加扩大免疫应答能力。</p>	
<p>23. 属于乙类传染病但采取甲类传染病预防和控制措施的疾病是 A. 白喉 B. 传染性非典型肺炎 C. 梅毒 D. 新生儿破伤风 E. 百日咳</p>		<p>2003年非典大流行，死亡率为9.3%</p>	<p>智商推理题</p>
<p>24. 某营养素可耐受最高摄入量：平均每日可摄入该营养素的最高量</p>	<p>可耐受最高摄入量：某一生理阶段和性别人群，几乎对所有个体健康都无任何副作用和危险的平均每日营养素最高摄入量。目的是为了限制膳食和来自强化食物及膳食补充剂的某一营养素的总摄入量，以防止该营养素引起的不良作用。</p>		
<p>25. 下列关于卫生服务需求不正确的选项是 A. 需求与需要的实质是一致的 B. 需求可以由需要转化而来 C. 需求与消费者的支付能力成正比 D. 需求与消费者的购买意向成正比 E. 有些需求是不必要的</p>			<p>智商推理题</p>
<p>26. 下列可在基因克隆技术中生成的物质是 A. 组织或细胞中直接提取的物质 B. 小鼠基因组 DNA C. 酵母基因组 DNA D. 质粒 DNA E. 人类基因组 DNA</p>	<p>小册子 59 页原文 质粒：闭合环状 DNA 构成，可自我复制，是核质以外的遗传物质能携带多种遗传性状并通过结合、转化等方式在菌间传递质粒而获得新的生物学性状。主要的质粒有 耐药性 R 质粒</p>		<p>原文押中</p>
<p>27. 在进行临床疗效评估中错误的是 让受试者了解</p>		<p>双盲、三盲讲解试验</p>	<p>讲解押中</p>
<p>28. 主动-被动型的医患关系主要用于 A. 焦虑障碍患者 B. 康复期治疗患者 C. 严重昏迷的患者 D. 慢性感染患者 E. 急性感染期患者</p>		<p>(1) 主动-被动型医患关系。 (2) 指导-合作型医患关系。 (3) 共同参与型医患关系</p>	<p>智商推理题</p>
<p>29. 执业医师处分权的取得方式是</p>		<p>黄部长的故事</p>	

<p>A. 被医疗机构聘用后取得 B. 在注册的执业地点取得 C. 在上级医院进修后取得 D. 医师资格考试合格后取得 E. 参加卫生行政部门培训后取得</p>		<p>按现行法律，外地遇上急救病人开展急救属于非法行医</p>	
<p>30. 苯二氮卓类药物的作用特点是 A. 作用部位主要在脑干网状结构 B. 对大脑损伤引起的肌肉僵直无作用 C. 小剂量药物无抗焦虑作用 D. 停药后代偿性反跳较明显 E. 对快动眼睡眠时相影响较小</p>	<p>小册子 53 页原文 正常睡眠分为两个时相。。在整个慢波睡眠中，以副交感神经活动占优势，在快波睡眠期，以交感神经活动占优势，苯二氮卓类(地西洋)药物对快波睡眠影响小</p>		<p>原文押中</p>
<p>31. 下列属于反式作用因子的是 A. 延长因子 B. 增强子 C. 操作序列 D. 启动子 E. 转录因子</p>	<p>小册子 49 页原文 【操纵子（序列） 顺式作用元件（启动子、增强子和沉默子） 单顺反子】</p>	<p>反式作用因子是指能直接或间接地识别或结合在各类顺式作用元件核心序列上参与调控靶基因转录效率的蛋白质，也称转录因子。</p>	<p>原文押中</p>
<p>32. 肿瘤相关抗原的含义是 A. 表达于肿瘤细胞而不表达正常细胞 B. 肿瘤细胞和正常细胞无差异性表达的 C. 表达于正常细胞而不表达于肿瘤细胞 D. 高表达于肿瘤细胞而低表达于正常细胞 E. 高表达于正常细胞而低表达于肿瘤细胞</p>	<p>小册子 69 页原文 AFP>500 μg / L 持续 4 周，或 AFP 由低浓度逐渐升高不降，或 AFP>200 μg / L 持续 8 周，可诊断为原发性肝癌</p>	<p>肿瘤相关抗原 AFP</p>	<p>原文押中</p>
<p>33. 下列国家中安乐死合法化的是 A. 日本 B. 比利时 C. 澳大利亚 D. 美国 E. 新加坡</p>		<p>发达小国家人权法制更加完善 荷兰、比利时和美国的一些州等少数国家和地区承认安乐死的合法地位</p>	<p>智商推理题</p>
<p>34. 某病早期治疗效果好，若漏诊后加重，对此病的诊断试验应特别注重 A. 提高阴性预测值 B. 提高阳性预测值 C. 降低假阳性率 D. 提高特异度 E. 提高灵敏度</p>			<p>智商推理题</p>


<p>35. 对职业人群进行医学监护的内容不包括</p> <p>A. 定期体检 B. 就业前体检</p> <p>C. 职业有害因素监测</p> <p>D. 离岗或转岗时体检</p> <p>E. 职业病的健康筛检</p>			智商推理题
<p>36. 引起生物地球化学疾病的原因是</p> <p>A. 某些生物病原体的污染</p> <p>B. 工业企业排放物的污染</p> <p>C. 某些病原体与化学污染物的</p> <p>D. 生活废弃物的污染</p> <p>E. 土壤或水中某些元素过高或过低</p>			智商推理题
<p>37. 急性普通型肝炎，肝坏死的类型为</p> <p>A. 碎片状坏死 B. 大片坏死</p> <p>C. 桥接坏死 D. 点状坏死</p> <p>E. 灶状坏死</p>	<p>小册子 19 页原文</p> <p>急性肝炎：起病急，相关表现，如过去无肝炎病史者，应首先考虑为甲型或戊型肝炎的诊断。 普通型点状坏死/气球样变重型大块坏死</p>		原文押中
<p>38. 所产毒素与噬菌体有关的细菌是</p> <p>A. 产气荚膜梭菌 B. 破伤风梭菌</p> <p>C. 白喉棒状杆菌 D. 霍乱弧菌</p> <p>E. 大肠埃希菌</p>	<p>小册子 59 页原文</p> <p>溶源性转换 溶源性转换指侵入细菌的噬菌体（寄生病毒）在溶原期，以前噬菌体形式与细菌的染色体发生重组，导致细菌的基因型发生改变。溶源性细菌可因之而获得新的特性</p>	<p>白喉棒状杆菌噬菌体带有编码外毒素的 Tox 基因，而白喉棒状杆菌本身无此基因。噬菌体侵入白喉棒状杆菌，在溶原阶段 Tox 基因即可整合到宿主染色体上，使之产生毒素</p>	讲解押中
<p>39. 属于上皮组织发生的肿瘤是</p> <p>A. 淋巴瘤 B. 血管瘤</p> <p>C. 乳头状瘤 D. 平滑肌瘤</p> <p>E. 脂肪瘤</p>	<p>小册子 22 页原文</p> <p>区别癌与肉瘤的主要依据是组织来源 来源于间叶组织的肿瘤是肉瘤</p>	<p>上皮组织(包括覆盖上皮与腺上皮)肿瘤最为常见，乳头状瘤由覆盖上皮发生，乳头状间叶组织肿瘤包括脂肪、血管和淋巴管、平滑肌、横纹肌、纤维组织、骨组织等的肿瘤。</p>	讲解押中
<p>40. 下列不属于临床预防服务内容的是</p> <p>A. 慢性病的自我管理</p> <p>B. 健康筛检 C. 化学预防</p> <p>D. 健康教育 E. 免疫接种</p>			智商推理题
<p>41. 不符合“人人享有卫生保健”内涵的是</p> <p>A. 卫生资源公平分配</p>			智商推理题



<p>B. 不发达地区的人们也能享受到基本的卫生保健服务</p> <p>C. 为人们治愈所有疾病</p> <p>D. 尽可能控制影响健康的危险因素</p> <p>E. 力争使人们的生理、心理和社会适应都达到完好的状态</p>			
<p>42. 下列关于酶结构与功能的叙述, 正确的是</p> <p>A. 酶只在体内发挥作用</p> <p>B. 酶的催化作用与温度无关</p> <p>C. 酶能改变反应的平衡点</p> <p>D. 酶能大大降低反应的活化能</p> <p>E. 酶的催化作用不受调控</p>	<p>小册子 46 页原文</p> <p>酶的催化高效性是因为酶能降低反应的活化能</p> <p>酶促反应中决定酶专一性的部分是酶蛋白</p>		原文押中
<p>43. 有权批准医疗机构配制临床需要而市场无供应的麻醉药品和精神药品制剂的部门是</p> <p>A. 省级卫生行政部门</p> <p>B. 设区的市级药品监督管理部门</p> <p>C. 省级药品监督管理部门</p> <p>D. 设区的市级卫生行政部门</p> <p>E. 县级卫生行政部门</p>	<p>小册子 66 页原文</p> <p>医疗机构配制的制剂, 应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种, 并须经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准后方可配制。不得在市场销售。</p>		原文押中
<p>44. 医务人员彼此协作的基础是</p> <p>A. 没有分歧 B. 彼此独立</p> <p>C. 互相信任 D. 互相学习</p> <p>E. 彼此竞争</p>			智商推理题
<p>45. 糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成途径的共同代谢物是</p> <p>A. 1,6-双磷酸果糖 B. F-6-P</p> <p>C. G-1-P D. 3-磷酸甘油醛 E. G-6-P</p>		微博图片讲解	讲解押中
<p>46. 硝酸甘油抗心绞痛的作用机制是</p> <p>A. 增加心肌供氧量</p> <p>B. 抑制心肌收缩力</p> <p>C. 收缩外周血管</p> <p>D. 减慢房室传导</p>		诺贝尔奖 IgnArro 的故事	讲解押中

E. 释放 NO			
47. 肺结核原发综合征的临床表现 A. 病灶常为多结节性 B. 原发灶、淋巴管炎及肺门淋巴结结核 C. 肺内可有一个或多个空洞 D. 病灶位于锁骨上、下 E. 肺内常见结核球	小册子 3 页原文 <u>I型</u> 原发型肺结核：原发病灶、结核性淋巴管炎与局部淋巴结炎性肿大构成之 哑铃样影像		原文押中
48. 非特异性感觉投射的临床特点正确的是 A. 不通过脑干网状结构上行激动系统起作用 B. 与大脑皮层具有点对点的投射关系 C. 没有专一的感觉传导功能 D. 为单突触传递系统 E. 不易受巴比妥类药物的影响	小册子 45 页原文 感觉的非特异性投射系统投射至皮层广泛区域， 提高皮层的兴奋性，受到破坏时昏睡		智商推理题
49. 能抑制胃排空的因素是 A. 壁内神经丛反射 B. 迷走-迷走反射 C. 组胺 D. 进入胃内的事物 E. 肠-胃反射		十二指肠 的刺激，如 pH3.5 以下，高渗液等可引起胃运动减弱及 幽门舒张 称为肠胃反射。 告知上游生产流水线：我们已近开工啦，不要那么着急啦。。。	讲解押中
50. 因女性不孕而实施的体外授精-胚胎移植技术，可能产生的伦理问题 不包括 A. 用剩余胚胎进行干细胞研究 B. 代孕母亲 C. 妇女的“贞操” D. 卵子商品化 E. 对胚胎进行非医学目的的性别鉴定			智商推理题
51. 对于铁的摄入，最好的食物来源是 A. 豆类 B. 粮谷类 C. 蔬菜、水果 D. 动物肝脏		肝主藏血 含有血液多，槟榔肝	讲解押中

E. 奶及奶制品			
<p>52. 医疗机构对有能力诊治的危重患者应当采取的处置措施是</p> <p>A. 办理住院手续 B. 及时转诊 C. 抢救</p> <p>D. 提请上级医院派人会诊</p> <p>E. 请示当地卫生局依法处理</p>			智商推理题
<p>53. 心理卫生又称为</p> <p>A. 心理健康 B. 心理和谐</p> <p>C. 心理宽容 D. 心理调节</p> <p>E. 心理平衡</p>			智商推理题
<p>54. 骨骼肌兴奋-收缩藕联的藕联因子是</p> <p>A. Na^+</p> <p>B. IP_3</p> <p>C. DG</p> <p>D. Mg^{2+}</p> <p>E. Ca^{2+}</p>		硫酸镁与钙离子的故事	讲解押中
<p>55. 对感染艾滋病病毒的孕产妇无偿提供预防艾滋病母婴传播的服务是</p> <p>A. 无偿用血 B. 家庭接生</p>			智商推理题

<p>C. 终止妊娠 D. 产前指导 E. 基因诊断</p>			
<p>56. 关于抑癌基因的正确叙述是 A. 其产物具有抑制细胞增殖的能力 B. 与癌基因的表达无关 C. 肿瘤细胞出现时才表达 D. 不存在于人类正常细胞 E. 缺失与细胞的增殖和分化有关的因子</p>	<p>小册子 49 页原文 典型的抑癌基因有 RB 基因、p53 基因 等</p>	<p>对于正常细胞，编码生长因子的基因（如原癌基因等）和调控抑制生长的基因（如抑癌基因等）的协调表达是控制细胞生长的重要机制之一。</p>	<p>讲解押中</p>
<p>57. 医学心理学的研究任务不包括 医学管理中存在的心理问题解决办法</p>			<p>智商推理题</p>
<p>58. 下列关于脂肪氧化分解过程的叙述，错误的是 A. β-氧化中的受氢体为 NAD^+ 和 FAD B. 含 16 个碳原子的软脂酸经过 8 次 β-氧化 C. 脂肪酰 CoA 需转运入线粒体 D. 脂肪酸首先要活化生成脂肪酰 CoA E. β-氧化的 4 步反应为脱氢、再水、再脱氢和硫解</p>	 <p>The diagram illustrates the four steps of the β-oxidation cycle. It starts with a long-chain fatty acyl-CoA (RCH₂CH₂CO-SCoA) where the β and α carbons are highlighted. Step 1: Oxidation of the α and β carbons to form a trans-2-enoyl-CoA (RCH=CHCO-SCoA), releasing FADH₂. Step 2: Hydration of the enoyl-CoA to form a 3-hydroxyacyl-CoA (RCH(OH)-CH₂CO-SCoA), adding H₂O. Step 3: Oxidation of the 3-hydroxyacyl-CoA to form a 3-ketoacyl-CoA (RC(=O)-CH₂CO-SCoA), releasing NADH + H⁺. Step 4: Thiolysis of the 3-ketoacyl-CoA into a shorter acyl-CoA (RCO-SCoA) and acetyl-CoA (CH₃CO-SCoA). The final products are labeled as 脂酰CoA (少2C) and 乙酰CoA.</p>	<p>生物化学 87. 关于脂肪酸 β-氧化的叙述错误的是 A. 酶系存在于线粒体中 B. 不发生脱水反应 C. 需要 FAD 及 NAD^+ 为受氢体 D. 脂肪酸的活化是必要的步骤 E. 每进行一次 β-氧化产生 2 分子乙酰 CoA</p>	<p>讲解押中</p>
<p>59. 参与联合脱氨基的酶是 A. NADH-泛醌还原酶 B. HMG CoA 还原酶 C. 葡萄糖-6-磷酸酶 D. 谷氨酸脱氢酶</p>	<p>小册子 48 页原文 肌肉中最主要的脱氨基方式是 嘌呤核苷酸循环【肌肉 ATP】 肝肾氧化脱氨基 联合脱氨基；肌肉 嘌呤核苷酸循环 脱去氨基；脱氨基后生成 α-酮酸</p>	<p>联合脱氨基：通过转氨酶和 L-谷氨酸脱氢酶的联合作用脱去氨基----肝肾组织 嘌呤核苷酸循环：通过转氨酶和腺苷酸脱氨酶的联合作用脱去氨基----肌肉组织</p>	<p>讲解押中</p>

<p>E. 丙酮酸脱氢酶</p>	 <p>参阅北医主编《生物化学》第1版P205</p> <p>嘌呤核苷酸循环</p>	
<p>60. 肺通气的直接动力是</p> <p>A. 肺内压与胸内压之差</p> <p>B. 胸内压与跨壁压之差</p> <p>C. 大气压与肺内压之差</p> <p>D. 大气压与胸内压之差</p> <p>E. 大气压与跨壁压之差</p>	<p>空气由大气进入肺内</p>	<p>智商推理题</p>
<p>61. 下列有关蛋白质变性的叙述，错误的是</p> <p>A. 蛋白质变性时生物学活性降低或丧失</p> <p>B. 蛋白质变性时理化性质发生变化</p> <p>C. 蛋白质变性时一级结构不受影响</p> <p>D. 去除变性因素后，所有变性蛋白质都可以复性</p> <p>E. 球蛋白变性后其水溶性降低</p>	<p>讲义原题生化 13. 下列有关蛋白质变性的叙述，错误的是</p> <p>A. 蛋白质变性时一级结构不受影响</p> <p>B. 蛋白质变性时理化性质发生变化</p> <p>C. 蛋白质变性时生物学活性降低或丧失</p> <p>D. 去除变性因素后变性蛋白质都可以复性</p> <p>E. 球蛋白变性后其水溶性降低</p>	<p>原题押中</p>
<p>62. 关于高分化肿瘤的叙述，正确的是</p> <p>A. 瘤细胞极性消失</p> <p>B. 瘤细胞呈巢状生长</p> <p>C. 瘤细胞异型性大</p> <p>D. 瘤细胞呈结节性生长</p> <p>E. 瘤细胞与起源的细胞相似</p>	<p>干细胞 (=原始细胞=低分化=恶性程度高) → 分化为各种细胞 (如肝细胞, 肌细胞等) → 属于高分化细胞 (恶性程度低) → 与此起源的瘤细胞相似 → 恶性程度低 → 高分化</p>	<p>讲解押中</p>

<p>63. 残气量与肺活量之和等于</p> <p>A. 深吸气量 B. 肺总量 C. 用力呼气量 D. 功能残气量 E. 补吸气量</p>	<p>1. 肺容积和肺容量:</p> 	<p>图片讲解</p>	<p>讲解押中</p>
<p>65. 决定免疫球蛋白类别的结区是</p> <p>A. 轻链可变区 B. 轻链恒定区 C. 重链恒定区 D. 铰链区 E. 重链可变区</p>	<p>免疫学讲义原文 32. 免疫球蛋白分类的主要依据是</p> <p>A. L 链♦B. H 链♦ C. 二硫键数目♦ D. 单体数♦ E. 分子量大小♦</p>	 <p>图 9-13 免疫球蛋白 IgG1 结构的模式图</p>	<p>原文押中</p>
<p>66. 下列不属于药品的是</p> <p>A. 抗生素 B. 血液 C. 疫苗 D. 血液制品 E. 血清</p>		<p>药监局管药 卫生局管血站</p>	<p>智商推理题</p>
<p>67. $IQ=15(X-M)/S +$ 智商是指</p> <p>A. 混合智商 B. 晶体智商 C. 比率智商 D. 离差智商 E. 液体智商</p>	<p>小册子 48 页原文 样本标准差 S 总体标准差 σ (Sigma) 样本方差 S^2 总体的方差符号为 σ^2 样本均数 \bar{X} 总体均数 μ</p>	<p>似懂非懂 其实不懂 一看答案 马上就懂</p>	<p>讲解押中</p>
<p>液体智力，是以生理为基础的认知能力，二十岁以后达到顶峰，受教育文化的影响较少。 晶体智力，则是经验知识为基础的认知能力，其与教育文化有关 离差智商是，韦克斯勒将离差智商的平均数定为 100，标准差定义为 15。表示的是个体智力在年龄组中所处的位置。 $Z =$ 标准分数 $X =$ 某人在测试中的实得分数 $M =$ 人们在测试中取得的平均分数 $S =$ 该组人群分数的标准差 比率智商的计算公式：智商 = (智力年龄 / 实际年龄) x 100</p>			
<p>68. 可作为人免疫缺陷病毒 (HIV) 受体的表面分子是</p> <p>A. CD20 B. CD3 C. CD4 D. CD21 E. CD8</p>	<p>免疫学讲义原文 71. 人类免疫缺陷病毒(HIV)在人体内作用的靶细胞是</p> <p>A. CD4+T 淋巴细胞♦ B. CD8+T 淋巴细胞♦C. B 淋巴细胞 D. NK 细胞♦ E. CTL 细胞</p>	<p>诸葛亮的故事</p>	<p>原文押中</p>

<p>69. 在职业病的危害防治和职业人群健康监护中，不属于第一级预防的措施是</p> <p>A. 加强通风排毒 B. 改革工艺，采用无毒原料 C. 生产过程机械化、自动化、密闭化 D. 制订职业接触限值 E. 定期对工人进行体检</p>		逻辑分类	智商推理题
<p>70. 溶血性链球菌主要引起的炎症时</p> <p>A. 脓肿 B. 出血性炎 C. 假膜性炎 D. 纤维素性炎 E. 蜂窝织炎</p>	<p>小册子 66 页原文 红色菌： 链球菌：偏向于侵犯免疫系统（淋巴管炎症，风湿病）猩红热，蜂窝织炎，风湿热，丹毒</p>	红黄绿的故事	原文押中
<p>71. 普通培养基最适宜的灭菌方法是</p> <p>A. 巴氏消毒法 B. 煮沸法 C. 高压蒸气灭菌法 D. 流通蒸气灭菌法 E. 间歇灭菌法</p>	<p>适宜用于黏膜和创面消毒的是碘伏 能够杀灭芽胞的化学消毒剂是过氧化乙酸 电离辐射灭菌的是一次性输血器，宫内节育器，橡胶管，清蛋白，适用于怕热的灭菌物品 胃镜消毒宜选用的化学消毒法是浸泡法 镊子、接种环、平皿、针头都可采用高温高压湿热灭菌法。普通培养基大部分可以用高温高压湿热灭菌法，少部分含血清、抗生素等温敏性物质的培养基，应该用过滤法除菌。</p>		
<p>72. 微血栓的主要成分是</p> <p>A. 血小板 B. 白蛋白 C. 纤维素 D. 红细胞 E. 白细胞</p>	<p>小册子 50 页原文 白色血栓：血小板头部；红色血栓：凝固性血栓尾部；透明血栓：微血栓，纤维性 DIC</p>		原文押中
<p>73. 疏松组织的弥漫性化脓性炎症属于</p> <p>A. 肉芽肿 B. 浆液性炎 C. 卡他性炎 D. 蜂窝织炎 E. 纤维素性炎</p>		<p>蜂窝织炎：累及真皮深部和皮下组织的弥漫性化脓性炎症 蜂窝の疏松</p>	智商推理题
<p>74. 通过感觉、知觉、记忆等进行的活动称为</p> <p>A. 意志过程 B. 人格倾向 C. 情感过程 D. 人格特征 E. 认识过程</p>			
<p>75. 根据微生物的分类，新生隐球菌属于</p> <p>A. 细菌 B. 立克次氏体</p>		<p>新生隐球菌是深部感染真菌中隐球菌属的主要菌种之一，主</p>	

C. 真菌 D. 放线菌 E. 支原体		要侵犯中枢神经系统。条件致病菌，已成为艾滋病患者常见的并发症之一发病率也呈逐年增加的趋势。	
76. 公民临床用血时，交付费用的项目不包括的是 A. 采集血液费用 B. 检验血液费用 C. 分离血液费用 D. 储存血液费用 E. 购买血液费用		逻辑分类	智商推理题
77. 医学伦理学的研究对象是 A. 医学道德难题 B. 医德基本理论 C. 医学道德关系 D. 医德基本实践 E. 医德基本规范		概括性理论性政治语言	智商推理题
78. 下列违背道德要求的是 个人利益优先，兼顾社会利益			智商推理题
79. 某研究者拟采用多中心、随机、双盲临床试验评价补肾活血颗粒改善帕金森病患者运动功能的有效性，试验组使用的中药配方包括山茱萸、何首乌和当归等成分。对照组用药由淀粉、糊精和苦味剂等成分制成，其气味、口感与试验用药非常近似，但没有药理作用。该试验采用的对照属于 A. 交叉对照 B. 标准方法对照 C. 自身对照 D. 安慰剂对照 E. 空白对照			智商推理题
80. 男，70岁。服用氟桂利嗪3个月后发现动作徐缓，僵硬，手部震颤，跌倒一次。美多芭治疗无效。查体：智能正常，面具脸，四肢肌力正常，肌张力高。最可能的诊断是 A. 血管性帕金森综合症 B. 帕金森叠加综合症 C. 药物性帕金森综合症 D. 外伤性帕金森综合症 E. 原发性帕金森病		服药史+帕金森症状=? 帕金森叠加综合症，症状类似帕金森病但症状和病变的范围都要比帕金森病广泛	智商推理题
81. 男，40岁。10年前发现乙型肝炎表面抗原阳性，未规律诊治。近日食欲下降。肝穿刺可见假小叶，其正确的诊断是 A. 肝癌 B. 慢性乙型肝炎 C. 肺结核 D. 肝淋巴瘤 E. 乙肝肝硬化	小册子 51 页原文 肝硬化特征性病理表现是假小叶形成		原文押中
82. 某县药品监督管理部门接到某药店将保健食品作为药品出售给患者的举报后，立即对该药店进行了查处，并依照《药品管理法》的规定，将其销售给患者的保健食品认定为 A. 按假药论处的药 B. 假药 C. 食品 D. 劣药 E. 按劣药论处的药			智商推理题
83. 某单位在职工体检中发现员工高血压和超重的检出率较高。医务人员为该单位制定的健康教育与健康促进干预活动主要包括调整食堂的膳食结构、制定工间操制度和组织文体活动等。这些干预活动主要是 A. 社会因素 B. 强化因素 C. 人群因素 D. 倾向因素 E. 促成因素		题干中：促进干预活动	智商推理题
84. 女，19岁。因发热伴头痛、烦躁2天，于1月28日入院。查体：T BP 130/80 mm Hg，精神差，神志清楚，全身散在瘀点、	小册子 51 页原文	细菌感染：中性粒细胞 病毒感染：淋巴洗吧	原文押中

<p>瘀斑，颈抵抗阳性，Kernig 征及 Babinski 征均阳性。实验室检查：腰穿脑脊液压力 240mmH₂O，外观混浊，WBC 1200 x 10⁶/L，蛋白质 1.5g/L，糖 2.5mmol/L，氯化物 100mmol/L。本病蛛网膜切片的病理改变不包括</p> <p>A. 血管扩张充血 B. 可见大量中性粒细胞 C. 可见大量淋巴细胞核单核细胞 D. 明显水肿 E. 可见纤维素</p>	<p>化脑：高热，有颅高压症状（呕吐、两眼凝视、前囟隆起），皮肤出血点、淤斑</p> <p>化脑合并硬膜下积液 长期发热迁延不断 肺炎链球菌 流感嗜血杆菌</p>		
<p>85. 男，35 岁。间断腹泻，脓血便 4 年，再发 1 个月。口服抗生素无缓解。结肠镜检查：直肠和乙状结肠弥漫充血水肿，黏膜粗颗粒样改变，质地脆，易出血。其黏膜活检可能的病理发现是</p> <p>A. 非干酪性肉芽肿 B. 可见阿米巴滋养体 C. 抗酸染色阳性 D. 隐窝脓肿 E. 干酪性肉芽肿</p>	<p>溃疡性结肠炎：漫画讲解，炎性特征</p> <p>溃疡性结肠炎：肠黏膜有多发性浅溃疡，黏膜粗糙呈颗粒状，质地脆，触之易出血；可见炎性息肉，活组织学可见糜烂、溃疡、隐窝脓肿、腺上皮增生及杯状细胞减少等变化</p> <p>肛瓣与直肠柱之间的直肠黏膜形成许多袋状小窝，称肛窦（肛隐窝）。</p>		讲解押中
<p>86. 本次比较四种疗法治疗慢性胃炎的效果，观察了 200 例该病患者，结果如下表。（题目不全）</p>			
<p>87. 某县医院妇产科医师欲开展结扎手术业务，按照规定参加了相关培训。培训结束后，有关单位负责对其进行了考核并颁发给相应的合格证书。该有关单位是指</p> <p>A. 地方医师协会 B. 地方卫生行政部门 C. 卫生部 D. 地方医学会 E. 所在医疗保健机构</p>		<p>卫生局负责行政管理，医学会、医师协会是其下属单位</p>	智商推理题
<p>88. 某高校心理咨询工作人员接待了一位大学生，该生对心理咨询师说，他多次难以自控地想自杀其女友。那么，此情况下心理咨询员的最佳做法是</p> <p>A. 劝其尽快接受治疗 B. 严格保守该生的秘密 C. 告知该生女友家属对其进行保护，同时建议该生家属带其进行必要的心理诊治 D. 通知该生的家长对其妥善监管 E. 联系精神病医院并直接送该生入院</p>			智商推理题
<p>89. 女，28 岁。在心理咨询中谈到所交的两个男朋友她都很喜欢，不知道该与哪个继续相处，难以做出抉择，希望得到帮助，而根据心理治疗的原则，心理咨询师没有替她作出决定。该咨询师遵循的原则是</p> <p>A. 灵活原则 B. 综合原则 C. “中立”原则 D. 耐心原则 E. 回避原则</p>			智商推理题
<p>90. 女，37 岁。发作性喘息 2 年，查体：双肺满布哮鸣音。X 线片未发现异常。应首先采取的治疗措施是</p> <p>A. 吸入糖皮质激素 B. 口服抗过敏药物 C. 静脉点滴抗生素 D. 使用支气管舒张剂 E. 无创通气</p>	<p>小册子 2 页原文</p> <p>支气管哮喘：反复发作性咳嗽、喘息，经支气管扩张剂治疗后可缓解或自行缓解。。。。</p> <p>β₂ 受体激动剂：沙丁胺醇（舒喘</p>		原文押中

	灵), 特布他林 (博利康尼)		
91. 男, 22岁。水肿, 进行性少尿1周。查体: BP 155/100 mm Hg, 双下肢水肿。尿 RBC 20~40/HP, 蛋白(++)。SCr679umol/L, 抗GBM 抗体阳性。肾活检病理示新月体性肾小球肾炎。其最重要的发病机制是 A. 循环免疫复合物沉积引起的体液免疫反应 B. 原位免疫复合物形成引起的体液免疫反应 C. 高血压、蛋白质、高血脂等非免疫因素 D. 细胞免疫 E. 遗传因素	小册子10页原文 急进性肾小球肾炎.....病理呈新月体肾炎表现的一组疾病, 又称 新月体肾炎 ,.....分为五型; ① I型又称 抗肾小球基膜型 ; ② II型又称 免疫复合物型 , 激活补体, 补体下降 ; ③ III型为 非免疫复合物型 , 血清 ANCA 常呈阳性 ; ①+②= 原位免疫复合物		原文押中
92. 男, 44岁。右上腹胀痛3天。伴寒战、高热(39.2C), 食欲不振, 乏力。右上腹皮肤有凹陷性水肿。肝肋下5Cm, 有压痛。血WBC 19 x10 ⁹ /L, N 0.92。B超示右肝内多个2~3Cm大小的液性暗区。X先片示右膈肌升高, 肝阴影增大。抗感染治疗主要针对的细菌是 A. 产气荚膜梭菌 B. 无芽孢厌氧菌 C. 溶血性链球菌 D. 肉毒梭菌 E. 志贺菌	小册子25页原文 原发性腹膜炎常见致病菌应是 溶血链球菌和肺炎双球菌 自发性腹膜炎, 又称原发性腹膜炎 继发性腹膜炎常见致病菌是 大肠杆菌和厌氧菌	引起细菌性肝脓肿的最常见致病菌为大肠杆菌及链球菌 细菌性肝脓肿的感染途径以胆道为主、门脉系统及全身血液循环系统次之 细菌性肝脓肿常为多种细菌所致的混合感染	原文押中
93. 某研究者采用随机单盲临床试验比较两种降压药(波依定与洛汀新)对轻中度原发性高血压患者的降压疗效。其单盲设计中不了解试验分组情况的人是 A. 测量血压的护士 B. 实施治疗的医生 C. 负责设计的研究者 D. 统计分析人员 E. 接受治疗的患者		单盲、双盲、三盲讲解	讲解押中
94. 男, 37岁。因有明显的幻觉及妄想表现而到医院就诊。经询问病情后, 医生欲采用心理测验对其进行评估, 以协助诊断。针对该患者, 通常可采用的心理测验工具为 A. EPQ B. MMPI C. SAS D. SCL-90 E. TAT	小册子64页原文 人格测验: 明尼苏达多相人格调查表(MMPI, 使用频率最高) 、以及艾森克人格问卷(EPQ)等。 投射法: 受试者根据自己的理解和感受对一些意义不明的图像、墨迹等作出回答, 如 洛夏测验、主题统觉试验(TAT)	焦虑自评量表 (Self-Rating Anxiety SCAIE SAS) 症状自评量表-SCL90 SympTon CHECK LisT 90	
95. 某大型企业计划在自然疫源地兴建旅游建设项目, 在征询意见时, 有专家提醒, 根据《传染病防治法》规定, 应当事先由法		重大项目通常由省级以上相关部门审核	智商推理

<p>定单位对该项目施工环境进行卫生调查。该法定单位是</p> <p>A. 省级以上旅游主管部门 B. 省级以上疾病预防控制机构 C. 国务院卫生行政主管部门 D. 省级以上环境保护主管部门 E. 省级以上环境监测评价机构</p>			
<p>96. 男, 35 岁, 吸烟 10 年, 每天 1 包烟, 不想戒烟。他说: “就算生病我也不会把烟戒掉。” 按照行为改变阶段模式属于</p> <p>A. 行动阶段 B. 准备阶段 C. 打算转变阶段 D. 维持阶段 E. 无打算阶段</p>			智商推理
<p>98. 男, 24 岁。间断心悸 1 月余。心悸时心电图示: 窦性心律, 可见提前出现的宽大畸形的 QRS 波群, QRS 时限 0. 16s, 其间无 P 波, 代偿间期完全。期前收缩后代偿间期形成的生理学机制是</p> <p>A. 房-室延搁 B. 心肌传导速度不均一 C. 自律细胞兴奋性增加 D. 心内兴奋传导途径多变 E. 心肌有效不应期长</p>	<p>小册子 64 页原文</p> <p>心肌细胞动作电位的主要特征是有缓慢的 2 期平台, CA²⁺内流, 不应期延长</p>	整点发车的故事	原文押中
<p>99. 男, 32 岁。左下肢肿胀、发紫、剧痛 2 小时。1 天前用粪便在农田施肥, 伤及左足, 半夜感胀裂样痛, 症状加重, 左下肢肿胀, 皮肤由紫红变成紫黑色、水肿有水泡。查体: 局部失去弹性, 皮下有捻发音, 伤口处有恶臭的血性浆液渗出。该致病菌产生的酶中, 毒性最强的是</p> <p>A. 胶原酶 B. 卵磷脂酶 C. 透明质酸酶 D. DNA 酶</p>	<p>小册子 22 页原文</p> <p>【气性坏疽=梭状芽胞杆菌+高压氧+胀裂感+大理石花纹+恶臭味+1000 万 U+卵磷脂酶】</p>	卵磷脂酶, 又称为 α 毒素, 它因能水解卵磷脂, 可以水解各种组织的细胞	原文押中
<p>100. 主治医师张某被注销执业注册满 1 年, 现欲重新执业, 遂向卫生行政部门递交了相关申请, 但未批准。其原因是</p> <p>A. 未经过医师规范化培训 B. 刑事处罚完毕后不满 2 年 C. 变更执业地点不满 2 年 D. 未到基层医疗机构锻炼 E. 在医疗机构的试用期不满 1 年</p>	<p>小册子 65 页原文</p> <p>受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚决定之日起至申请注册之日止 不满二年的, 不予注册 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作</p>		原文押中
<p>101. 男, 65 岁。间断腹胀、上腹隐痛 25 年。胃镜检查提示: 胃体黏膜变薄, 血管透见, 皱襞稀疏。患者可能缺乏的维生素是</p>	小册子 7 页原文	小册子 8 页原文	原文押中

<p>A. 维生素 B4 B. 维生素 C C. 维生素 B12</p> <p>D. 维生素 B2 E. 维生素 D</p>	<p>常伴有、甚至恶性贫血</p>	<p>漫画讲解</p>	
<p>102. 男, 46 岁。因直肠癌入院。癌肿距离肛缘 5Cm, 大小为 2Cm x 1Cm。拟行手术治疗, 患者强烈要求保留肛门。该患者适合保肛的病例依据是癌肿</p> <p>A. 周围淋巴结状况 B. 浸润肠壁的深度</p> <p>C. 是否侵及泌尿系统 D. 向下的纵向浸润范围</p> <p>E. 组织学分类</p>	<p>小册子 26 页原文</p> <p>经腹腔直肠癌切除术 (Dixon 手术) 5Cm 以外 DistAl 最远的保留肛门</p> <p>Miles 手术人工肛门, 5Cm 以内</p>	<p>以肛直肠环距肛缘约 4Cm 计算, 加上直肠经充分游离拉直后尚有 4 (3~5) Cm 的伸长, 故经直肠指检距肛缘低至 4Cm 的直肠癌仍有施行超低位 Dixon 术的可能</p>	<p>智商推理题</p>
<p>103. 男, 67 岁。反复咳嗽、咳痰 30 年, 加重 1 周。查体: 双肺可闻及干湿性啰音。动脉血气分析示: pH 7. 21, PACO₂ 75mm Hg, PAO₂ 50 mm Hg, HCO₃⁻ 19. 6 mmol/L。酸碱平衡失调的类型是</p> <p>A. 代谢性碱中毒 B. 代谢性酸中毒</p> <p>C. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒 D. 呼吸性酸中毒</p>	<p>小册子 3 页原文</p> <p>【II 型呼衰+呼酸合并代酸+慢阻肺+通气障碍+ P02 <60+C02 潴留+细小支气管狭窄+CV↑+呼气性呼吸困难+持续低浓度给氧】</p>	<p>蒙对答案的故事</p> <p>漫画讲解</p>	<p>讲解押中</p>
<p>104. 男, 50 岁, 某公司总经理。在公司某次业务培训会的开幕式上致辞后出现口误, 宣布“会议闭幕”。此口误背后折射出该总经理的心理活动为</p> <p>A. 潜意识 B. 前意识 C. 超我 D. 意识 E. 本我</p>		<p>日有所思 夜有所梦 身不由己潜意识: 说漏嘴了</p>	<p>智商推理题</p>
<p>105. 男, 30 岁。反复上腹痛 6 年, 为空腹及夜间发作。加重伴呕吐宿食 2 周。该患者可能存在的主要电解质紊乱是</p> <p>A. 高血钙 B. 低血钾 C. 低血镁</p> <p>D. 高血钾 E. 高血钠</p>	<p>小册子 43 页原文</p> <p>需要休息: 甲亢, 醛固酮增多, CusHing 综合征, 输入葡萄糖, 洋地黄中毒, 胃肠减压, 恶心呕吐, 腹泻, U 波</p>	<p>漫画讲解</p>	<p>原文押中</p>
<p>106. 男, 40 岁, 农民。以高热伴食欲明显减退、呕吐 2 周入院。实验室检查: WBC 3. 2 x 10⁹/L, 嗜酸细胞 0。为该患者做了肥达试验, 下列解释正确的是</p> <p>A. H 效价不高、O 效价增高提示是非特异性回忆反应</p> <p>B. O 效价不高、H 效价增高提示伤寒杆菌感染</p> <p>C. O 效价不高、H 效价增高提示与其他沙门菌间的交叉反应</p> <p>D. H 效价不高、O 效价增高提示是预防接种的结果</p> <p>E. O 和 H 效价均增高有助于伤寒的诊断</p>	<p>小册子 19 页原文</p> <p>TypHo: D 伤寒 O 抗原 TO, TH</p> <p>【斑疹伤寒=立克次缺壁+外斐+XO+人虱鼠蚤】</p> <p>【喹诺酮类+稽留热+再燃+血培养+肝脾肥达+ TO +WBC 低+玫瑰疹+肠出血穿孔=伤寒】</p>		<p>原文押中</p>

<p>107. 女, 35 岁。丈夫因车祸去世, 令其痛不欲生, 遂到心理咨询门诊寻求帮助。该女生在诉说其目前的心境时痛哭流涕。对此, 心理咨询师在初始阶段一般不应采取的措施是</p> <p>A. 对质其懦弱 B. 帮助其领悟 C. 增强其自控 D. 指导其放松 E. 接受其宣泄</p>		对悲伤应安抚	智商推理题
<p>108. 男, 22 岁, 大学生。平常乐于助人、尊师爱校。不仅在学习上经常帮助同学, 而且在生活上夜常常照顾他人, 并能积极组织班级的集体活动。这种行为方式在性格的特征中属于</p> <p>A. 行为特征 B. 意志特征 C. 态度特征 D. 情绪特征 E. 理智特征</p>		性格四大特征: 态度特征、理智特征、情绪特征、意志特征 莫莫工作态度认真。。。	智商推理题
<p>109. 男, 32 岁。因肝损伤急症手术。曾患甲型肝炎已治愈。术中见肝右叶外侧 5Cm 裂口, 深 3Cm。术后肝肾功能检查正常, 食欲、体力恢复正常。肝脏损伤得以顺利修复, 从内环境分析, 主要起再生作用的是</p> <p>A. 不稳定细胞 B. 肥大细胞 C. 纤维细胞 D. 稳定细胞 E. 永久性细胞</p>		肝细胞为稳定细胞, 在生理情况下, 增殖不明显. 但受到组织损伤的刺激时, 表现出较强的再生能力 假小叶的形成	讲解押中
<p>110. 男, 35 岁。淋雨后寒战、发热 3 天, 胸透示右下肺炎, 血 WBC 12. 3 x 10⁹/L。该患者感染的病原菌最可能是</p> <p>A. 肺炎链球菌 B. 结核分枝杆菌 C. 金黄色葡萄球菌 D. 流感嗜血杆菌 E. 铜绿假单胞菌</p>	小册子 3 页原文 肺炎球菌肺炎 (或称 肺炎链球菌) 所引起 大叶性肺炎 (即典型肺炎) 肺炎球菌为革兰阳性球菌, 菌体外有荚膜, 其毒力大小与 荚膜中的多糖结构及含量 有关, 咳铁锈色痰 , 痊愈时, 完全恢复组织正常 的结构和功能 受凉后高热 首选药物 青霉素 G	漫画讲解	原文押中
<p>111. 男, 74 岁。反复咳嗽、咳痰 30 年, 近 5 年来长期夜间家庭氧疗。1 周前因受凉后出现喘息, 夜间入睡困难。昨夜自服“舒乐安定”(艾司唑仑)” 2 片, 并将吸氧流量提高至 4L/分, 自觉喘息症状有所改善。今晨家属发现其呼之不应。入院查体: 轻度昏迷, 球结膜水肿, 口唇无发绀。双肺呼吸音低。双侧 BABinski 征 (+)。该患者最可能出现的问题是</p> <p>A. 电解质紊乱 B. 氧中毒 C. 肺性脑病 D. 镇静剂中毒 E. 脑梗死</p>	小册子 3 页原文 吸氧后神志渐不清、昏迷: 氧疗不当 低浓度 (<35%) 持续给氧		原文押中
<p>112. 某医师拟比较四组人群血型分布 (A、B、AB 和 O 型) 的</p>	小册子 61 页原文		原文押中

<p>差别, 适宜的统计分析方法为</p> <p>A. u 检验 B. 回归分析 C. 秩和检验</p> <p>D. T 检验 E. X² 检验</p>	<p>多样本: 比较不同 (职业) 人群的 (冠心病) 患病率的假设检验, 应计算的统计量为 x² 检验或称卡方检验, 可以分组比较 (不配对资料)和个别比 (配对)两类。</p>		
<p>113. 男, 30 岁。饥饿性上腹痛 2 年, 进食后可缓解。胃镜检查: 十二指肠溃疡愈合期, 快速尿素酶试验阳性。最有效的治疗方案是</p> <p>A. 奥美拉唑+枸橼酸铋钾+克拉霉素</p> <p>B. 法莫替丁+阿莫西林+克拉霉素</p> <p>C. 西咪替丁+克拉霉素+左氧氟沙星</p> <p>D. 奥美拉唑+硫糖铝</p> <p>E. 奥美拉唑+阿莫西林+替硝唑</p>	<p>小册子 8 页原文</p> <p>Hp 感染, 治疗选择一种抑酸剂或 (和) 铋剂联合两种抗生素</p>		<p>原文押中</p>
<p>114. 调查发现某高原地区居民结肠癌的发病率高于全国平均水平, 研究者注意到该地区人们的饮食习惯具有高脂肪摄入, 低蔬菜、水果摄入的特点, 拟开展一项课题研究, 分析饮食习惯与结肠癌的关系, 考虑到因果现象发生的时间顺序, 最佳研究方法应为</p> <p>A. 生态学研究 B. 横断面研究 C. 队列研究</p> <p>D. 病例对照研究 E. 临床试验</p>	<p>小册子 61 页原文</p> <p>队列研究遵循由因至果的原则, 而病例对照研究是由果至因 【病例先有结果 由果至因】</p>		<p>原文押中</p>
<p>115. 男, 15 岁。因发热、乏力、刷牙时牙龈出血 1 周入院。查体: T 38. 5℃, 牙龈肿胀, 胸骨压痛 (+), 双下肢小腿出现散在出血点及瘀斑。血常规: HB 80g/L, WBC 10. 1 x 10⁹/L, PLT 30 x 10⁹/L; 骨髓增生极度活跃, 原始细胞占 0. 60, POX 染色呈弱阳性, 非特异性酯酶染色阳性, 可被 NAF 抑制, 该患者原始细胞最可能的免疫表型是</p> <p>A. CD14+ B. CD41+ C. CD8+</p> <p>D. CD3+ E. CD4+</p>	<p>小册子 13 页原文</p> <p>M5 牙龈和皮肤浸润</p>	<p>CD14, 即 LPS 受体, 是一种存在于单核细胞、巨噬细胞等细胞表面的白细胞分化抗原</p> <p>小册子 58 页</p> <p>参与替代途径激活补体的物质是 LPS→细菌脂多糖</p> <p>幼儿园大班的故事</p>	<p>原文押中</p>
<p>116. 女, 26 岁。患重症肌无力 5 年, 因感冒后肌无力加重, 大量服用溴化吡啶斯的明后出现流口水、大量出汗、肌束颤动、腹痛。此种表现是由于</p> <p>A. ACH 毒蕈碱样作用亢进</p>	<p>小册子 53 页原文</p> <p>M 样作用: 腺体分泌</p>	<p>M、N 样作用均有, 答案只能选 E</p>	<p>原文押中</p>

<p>B. 中枢 ACH 神经元传递减慢 C. 神经肌肉接头处 ACH 兴奋传递加速 D. 乙酰胆碱 (ACH) 神经元的后发放 E. ACH 烟碱样作用亢进</p>	<p>N 样作用 骨骼肌收缩、神经节兴奋、 肾上腺髓质分泌增加 新斯的明 有机磷 解磷定</p>		
<p>117. 医师张某给一患者开具了处方，患者取药时，药剂师指出该处方不符合相关规定不予调配。其理由是 A. 该处方使用了药品通用名称 B. 该处方同时开具了中成药和西药 C. 该处方开具了 5 种药物 D. 该处方注明了 5 天有效期 E. 该处方开具了 7 天药物用量</p>			<p>智商推理题</p>
<p>118. 男，64 岁。突发心悸 4 小时就诊。心电图示：P 波消失，代之以 f 波，心室率 130 次/分，节律绝对不规则。为减慢心室率，应选择的药物是 A. 美托洛尔 B. 阿托品 C. 沙丁胺醇 D. 利多卡因 E. 新斯的明</p>		<p>小马驹的故事 美丽的小马驹：跳慢点</p>	<p>讲解押中</p>
<p>119. 女，16 岁。低热伴乏力、纳差、恶心、呕吐 3 天，来诊当日发现巩膜黄染、实验室检查：ALT 860U/L，TBil 120umol/L。出生时曾注射乙肝疫苗。本病的病理特点不包括 A. 假小叶形成 B. 肝细胞气球样变性 C. 肝细胞点状坏死 D. 炎症细胞浸润 E. 毛细胆管内胆栓形成</p>	<p>小册子 51 页原文 肝硬化特征性病理表现是假小叶形成</p>	<p>黄疸性肝炎→肝细胞损害、胆管阻塞</p>	<p>原文押中</p>
<p>(120~122 题共用题干) 某年夏季，某县中心小学 47 名学生相继出现剧烈呕吐、上腹部剧烈疼痛、腹泻等症状，少数患者有低热。调查得知发病学生在当天上午均吃过学校供应的课间餐（外购的奶油蛋糕），未吃者不发病。患者发病的潜伏期最短为 1 小时，最长为 6 小时。 120. 引起此次食物中毒最可能的细菌（或毒素）是 A. 副溶血性弧菌 B. 沙门菌属 C. 肉毒梭菌毒素 D. 蜡样芽胞杆菌 E. 金黄色葡萄球菌肠毒素 121. 引起此类中毒的食物除了奶制品、含奶糕点外，主要还有 A. 海产品 B. 蔬菜</p>	<p>小册子 62 页原文 葡萄球菌肠毒素食物中毒：腹泻不发烧</p>		<p>原文押中</p>

<p>C. 水果 D. 罐头制品 E. 肉类、剩饭</p> <p>122. 针对这起食物中毒事件, 主要的治疗措施为</p> <p>A. 应用多价抗毒素血清 B. 服用改变肠道菌群的制剂</p> <p>C. 应用止痛剂 D. 彻底洗胃、灌肠</p> <p>E. 静脉补充水、电解质, 静脉输注抗生素</p>			
<p>130. 属于恶性肿瘤的是 髓母细胞瘤</p>		<p>髓母细胞瘤是一种儿童后颅窝恶性胶质瘤</p>	
<p>131. 含有 2 个胚层以上的肿瘤是 畸胎瘤</p>			<p>智商推理题</p>
<p>(132~133 题共用备选答案)</p> <p>A. 分层抽样 B. 系统抽样 C. 整群抽样</p> <p>D. 单纯随机抽样 E. 普查</p> <p>132. 在调查研究中, 从总体中按照相同的间隔抽取调查单位进行调查的方法为 B</p> <p>133. 在调查研究中, 先将总体按照某种特征分成若干组群, 然后在每组群中进行随机抽样的方法为 A</p>	<p>小册子 61 页原文</p> <p>系统抽样的方法是按照一定比例或间隔抽取调查单位</p>	<p>分层抽样法也叫类型抽样法。它是从一个可以分成不同子总体(或称为层)的总体中, 按规定的比例从不同层中随机抽取样品(个体)的方法。</p>	<p>132 原文押中 133 智商推理题</p>
<p>(134~135 题共用备选答案)</p> <p>A. IDL B. VLDL C. LDL</p> <p>D. CM E. HDL</p> <p>134. 运输内源性甘油三酯的脂蛋白是 B</p> <p>135. 向肝内转运胆固醇的脂蛋白是 E</p>	<p>小册子 48 页原文</p> <p>HDL 可摄取血中肝外细胞释放的游离胆固醇, 经卵磷脂胆固醇酯酰转移酶(LCAT)催化</p> <p>极低密度脂蛋白 VLDL :是运输内源性甘油三酯的主要形式。</p>	<p>分层抽样法也叫类型抽样法。它是从一个可以分成不同子总体(或称为层)的总体中, 按规定的比例从不同层中随机抽取样品(个体)的方法。</p>	<p>原文押中</p>
<p>(136~137 题共用备选答案)</p> <p>A. 警告 B. 给予纪律处分 C. 责令限期整顿</p> <p>D. 吊销执业证书 E. 责令改正</p> <p>136. 医务人员发生医疗事故, 情节严重, 尚不够刑事处罚的, 卫生行政部门可以给予的行政处罚是 D</p> <p>137. 医疗机构没有正当理由, 拒绝为患者提供复印或者复制病历资料服务的, 卫生行政部门可以采取的措施是 E</p>			<p>智商推理题</p>
<p>(138~139 题共用备选答案)</p> <p>A. 对病毒感染有效 B. 对念珠菌属的细菌感染有效</p> <p>C. 杀灭结核分枝杆菌 D. 抑制二氢蝶酸合酶活性</p> <p>E. 对立克次体感染有效</p>	<p>小册子 55 页原文</p> <p>四环素: 强力霉素 氯霉素可能引起二重感染、再生障碍性贫血、灰婴</p>		<p>原文押中</p>

<p>138. 多西环素的药理作用是 E</p> <p>139. 磺胺药的药理作用是 D</p>	<p>立克次体（无细胞壁）感染最有效的药物是 四环素 【强力（立） 缺绿环 234】</p> <p>抑制细菌二氢叶酸还原酶→磺胺类</p>		
<p>(140~142 题共用备选答案)</p> <p>A. 舒张压 B. 循环系统平均充盈压</p> <p>C. 平均动脉压 D. 收缩压 E. 脉压</p> <p>140. 心动周期中，主动脉压的最高值 D</p> <p>141. 心动周期中，主动脉压的最高值与最低值之差是 E</p> <p>142. 心动周期中，主动脉压的最低值 A</p>			<p>智商推理题</p>
<p>(143~144 题共用备选答案)</p> <p>A. 呼吸道传播 B. 虫媒传播</p> <p>C. 性接触传播 D. 消化道传播 E. 血液传播</p> <p>143. 登革病毒的传播方式是经 B</p> <p>144. 人乳头瘤病毒的传播方式是经 C</p>		<p>登革热是登革热病毒引起、依蚊传播的一种急性传染病，起病急骤，高热，全身肌肉、骨髓及关节痛，出血倾向和淋巴结肿大。</p> <p>尖锐湿疣：H P V</p>	<p>讲解押中</p>
<p>(145~146 题共用备选答案)</p> <p>A. RNA 聚合酶 B. 转肽酶 C. 引物酶</p> <p>D. 逆转录酶 E. DNA 聚合酶</p> <p>145. 参与蛋白质合成的酶是 B</p> <p>146. 参与合成 CDNA 的酶是 D</p>	<p>小册子 48 页原文</p> <p>反转录酶催化以 mRNA 为模板、合成 CDNA，继而构建 CDNA 文库</p>		<p>原文押中</p>
<p>(147~148 题共用备选答案)</p> <p>A. 代偿性肥大 B. 代偿性增生 C. 内分泌性增大</p> <p>D. 病理性增生 E. 内分泌性增生</p> <p>147. 缺碘引起的甲状腺肿大属于 D</p> <p>148. 肉芽组织机化形成瘢痕属于 D</p>		<p>细胞通过分裂繁殖而数目增多的现象。有生理性增生和病理性增生两种</p>	<p>讲解押中</p>
<p>(149~159 题共用备选答案)</p> <p>A. CTL 细胞 B. B 细胞</p> <p>C. NK 细胞 D. 浆细胞</p> <p>E. 肥大细胞</p> <p>149. 介导 I 型超敏反应的细胞是 E</p>		<p>NATurAl KillEr 关羽是 CTL</p> <p>肥大细胞 mAsT Cell 是和血液的嗜碱粒细胞同样，含有肝素、组织胺、释放引起速发型过敏</p>	<p>讲解押中</p>

150. 介导主要组织相容复合体(MHC)非限制杀伤的细胞是 C		反应(炎症)。由于在肥大细胞上结合的 IgE 抗体和抗原的接触,使细胞多陷于崩坏	
----------------------------------	--	--	--

2012 原文对照 第二单元

2012 原文对照 第二单元	中域 2012 年执业医师图书及押题命中详情		备注
	押题出处	考前视频讲解方法	
1 下列食物成分进入十二指肠后,刺激胆囊收缩素分泌作用最强	小册子 44 页原文		原文押中


<p>的是</p> <p>A. 电解质 B. 碳水化合物 C. 脂肪</p> <p>D. 蛋白质 E. 纤维素</p>	<p>刺激小肠粘膜释放胆囊收缩素的最强物质是蛋白质分解产物。</p>	<p>胃肠道最主要的任务是消化蛋白质</p>	
<p>2 严重外伤患者发生脂肪栓塞综合征，该综合征主要累及的部位是</p> <p>A. 胰 B. 肾 C. 肝 D. 骨 E. 肺</p>	<p>小册子 28 页原文</p> <p>骨折引起脂肪栓塞是由于骨筋膜室压力过高</p>	<p>脂肪栓塞因为骨筋膜室压力过大产生，不会跑到动脉去，因为里面压力大，血液从血管往外走，所以只能往静脉里走，因为体循环负压回流到肺里</p>	<p>原文押中</p>
<p>3. 链球菌感染后急性肾小球肾炎与膜增生性肾小球肾炎相鉴别的要点是</p> <p>A. ASO 是否升高 B. 有无前驱感染</p> <p>C. 是否伴肾病综合征表现</p> <p>D. 早期有无少尿、无尿及肾功能恶化</p> <p>E. 低补体血症是否于 8 周内恢复</p>	<p>小册子 9 页原文</p> <p>血补体 C3 以及总补体在发病初期下降，8 周内渐恢复正常。</p>	<p>急性肾炎是自身免疫性疾病，预后好</p>	<p>原文押中</p>
<p>4. 脊柱结核发生率最高的部位</p> <p>A. 腰椎 B. 颈椎 C. 胸椎 D. 骶椎 E. 尾椎</p>	<p>小册子 30 页原文</p> <p>腰椎结核发病率最高，最常见的发生部位是椎体，拾物试验阳性</p>		<p>原文押中</p>
<p>5. 克罗恩病的主要手术指征是</p> <p>A. 营养不良，体重减轻 B. 严重腹泻</p> <p>C. 持续性粪隐血阳性 D. 疑有恶变</p> <p>E. 合并结肠息肉</p>		<p>手术指针通常选最要命的</p>	<p>智商推理题</p>
<p>6. 胃癌诊断明确后，已不适宜行胃癌根治术且预后差的是</p> <p>A. 合并完全性幽门梗阻</p> <p>B. 胃大弯癌肿已与横结肠粘连 C. 持续性粪隐血阳性</p> <p>D. 合并中等量癌性腹水 E. 进展期胃癌</p>		<p>手术指针通常选最要命的</p>	<p>智商推理题</p>
<p>7. 伤寒最严重的并发症是</p> <p>A. 肠穿孔 B. 心肌炎 C. 中毒性肝炎</p> <p>D. 肺炎 E. 肠出血</p>	<p>小册子 19 页原文</p> <p>【喹诺酮类+稽留热+再燃+血培养+肝脾肥达+ TO +WBC 低+玫瑰疹+肠出血穿孔=伤寒】</p>		<p>原文押中</p>
<p>8. 术前判断胰头癌是否侵犯大血管的检查方法是</p> <p>A. 内镜超声 B. 腹腔血管造影 C. 增强 CT</p>	<p>小册子 26 页原文</p> <p>经内镜逆行胰胆管造影 ERCP</p>		<p>原文押中</p>

D. B型超声 E. MRCP	【胆总管和肝内胆管均不扩张】		
9. 关于细菌性肝囊肿的临床表现 错误 的是 A. 肝肿大并有触压痛 B. 寒战、高热 C. 肝区胀痛 D. 胆囊肿大 E. 起病急		部位不同，与胆囊无关	智商推理题
10. 可分泌胃蛋白酶原的主要细胞是 A. 肥大细胞 B. 壁细胞 C. 黏液细胞 D. 杯状细胞 E. 主细胞	小册子 44 页原文 刺激小肠粘膜释放 胆囊收缩素 的最强物质是 蛋白质分解产物 ◆	胃肠道最主要的任务是消化蛋白质	原文押中
11. 对乳腺癌治疗方案设计和预后判断最有意义的是检测前哨淋巴结 A. 大小 B. 是否有癌转移 C. 质地 D. 数量 E. 染色的状况			智商推理题
12. 对十二指肠溃疡 急性穿孔 的描述， 错误 的是 A. 部分患者既往无溃疡病症状 B. 男性发生率高于女性 C. 穿孔部位多见于十二指肠前壁 D. 明确诊断后， 均 应行急诊手术治疗 E. 大部分立位腹部 X 线平片可见膈下游离气体		题干中出现“均、都”等绝对意义修饰词语，通常不对，出现“可”，称为“小可”的题目通常是对的	智商推理题
13. 对于 3 岁以下儿童股骨干骨折的治疗，正确的叙述是 A. 可以接受骨折断端有 2Cm 以内的缩短 B. 常采用切开复位内固定治疗 C. 常采用骨牵引治疗 D. 可以接受轻度的旋转移位 E. 应与成人骨折的治疗原则一致		成人下肢骨缩短<1Cm；儿童若无骨骺损伤，下肢缩短<2Cm可在生长发育过程中自行矫正；成角移位：与关节活动方向一致者可自行矫正； 侧方成旁移位、与关节活动方向垂直者必须完全复位；	讲解押中
14. 低渗性缺水的常见病因是 A. 大量出汗 B. 摄入水不足 C. 急性机械性肠梗阻 D. 大量使用利尿酸类利尿药 E. 急性化脓性腹膜炎		等渗性缺水=急性缺水=不渴=平衡盐=最常见 低渗性缺水=慢性缺水=不渴 高渗性缺水=原发性缺水=口渴	讲解押中
15. 为提高脓毒症血培养的阳性率，抽血的最佳时间是 A. 每天晚间 B. 寒战发热后	小册子 22 页原文 疑有败血症血培养最佳抽血时间在 预		原文押中

C. 寒战发热时 D. 寒战发热前 E. 每天早晨	计发生寒战及发热前 【拐点】		
16. 无症状性细菌尿最常见的致病菌是 A. 粪肠球菌 B. 大肠埃希菌 C. 葡萄球菌 D. 铜绿假单胞菌 E. 变形杆菌	小册子 12 页原文 导致尿路感染最常见的致病菌是大肠杆菌，白细胞管型是活动性肾盂肾炎的特征（也可进行尿抗体包裹细菌检查）		原文押中
17. 肾盂癌手术切除范围是 A. 患肾+同侧中上段输尿管 B. 患肾+同侧肾上腺 C. 患肾 D. 患肾+同侧上段输尿管 E. 患肾+同侧全长输尿管			智商推理题
18. 骨折的特有体征是 A. 局部皮下瘀斑 B. 功能障碍 C. 反常活动 D. 轴向叩击痛 E. 局部压痛			智商推理题
19. 有关直肠癌的描述，错误的是 A. 多有里急后重、肛门下坠感 B. 常以完全性肠梗阻就诊 C. 组织学类型主要为腺癌 D. 多有带黏液的血便 E. 早期可表现为大便习惯改变			智商推理题
20. 肠梗阻患者保守治疗期间，病情进展需手术的最主要指征是 A. 肠鸣音减弱或消失 B. 腹痛加重 C. 呕吐频繁和量大 D. 腹膜刺激征加重 E. 腹胀程度加重	小册子 24 页原文 绞窄性肠梗阻时会出现固定点压痛和腹膜刺激征的出现		原文押中
21. 下列关于 IgA 肾病错误的说法是 A. 病理类型主要为系膜增生性肾小球肾炎 B. 确诊有赖于肾活检病理检查 C. 青少年好发 D. 预后良好，很少有肾功能恶化 E. 常在感染后 72 小时以内发作肉眼血尿		急性肾小球肾炎 急进性肾小球肾炎 慢性肾小球肾炎 肾病综合征 隐匿性肾小球肾炎 【好了坏了好了坏了坏了】	讲解押中
22. 附睾结核多继发于 A. 肾结核 B. 骨结核 C. 淋巴结核 D. 肠结核 E. 肺结核		经输尿管，从膀胱逆行感染	智商推理题

<p>23. 我国重点监测的性传播疾病不包括</p> <p>A. 淋病 B. 生殖器疱疹 C. 梅毒 D. 阴道念珠菌病 E. 尖锐湿疣</p>	<p>小册子 36 页原文 豆渣样白带 念珠像豆子 糖尿病或长期口服避孕药→假丝酵母菌病/白色念珠菌→痒→2~4%碳酸氢钠阴道灌洗+制霉菌素栓剂</p>	<p>真菌感染较常见，如脚气</p>	<p>智商推理题</p>
<p>24. 急性胆囊炎的表现不包括</p> <p>A. 右上腹持续性痛并阵发性加重 B. 大多伴有黄疸 C. 右上腹局限性肌紧张 D. 可伴有右肩部不适症状 E. 右上腹压痛</p>		<p>胆囊炎无黄疸胆管未堵 胆管炎三联征</p>	<p>讲解押中</p>
<p>25. 骨折治疗原则中的首要步骤是</p> <p>A. 功能锻炼 B. 内固定 C. 复位 D. 包扎 E. 外固定</p>	<p>小册子 28 页原文 骨折后复位达到功能复位（不是解剖复位）即可愈合</p>		<p>智商推理题</p>
<p>26. 潜伏性感染的临床特征不包括</p> <p>A. 并不是每种传染病中都存在 B. 常见病原体有单纯疱疹病毒等 C. 其病原体易排出体外 D. 一般不引起显性感染 E. 在人体免疫功能下降时可引起显性感染</p>		<p>感染期，病原体最嚣张</p>	<p>智商推理题</p>
<p>27. 关于骨折愈合的过程，正确的是</p> <p>A. 原始骨痂形成期膜内成骨比软骨内成骨慢 B. Wolff 定律即骨折愈合过程中板层骨总是沿断端承受的生理应力方向吸收 C. 临床上骨折愈合过程多为一期愈合 D. 新骨的爬行替代过程是在破骨细胞和成骨细胞同时作用下完成的 E. 骨板形成塑形期在应力轴线上的骨痂逐步消失</p>	<p>小册子 28 页原文 血肿机化演进期(半月) 原始骨痂形成期(一个月) 骨痂改造塑形期(一个半月) 100 天 【15+30=45】</p>		<p>智商推理题</p>
<p>28. 各类型休克的根本变化是</p> <p>A. 代谢性酸中毒 B. 脉搏快 C. 尿量减少 D. 组织灌注不足 E. 低血压</p>	<p>小册子 20 页原文 休克的根本问题是：组织细胞受累，组织和细胞缺氧 循环骤停的临界时间是：4 分钟</p>		<p>原文押中</p>
<p>29. 对于直肠内高位带蒂息肉，最合理的切除方式是</p>	<p>讲义 外科学 473. 男性，肠镜发现距</p>		<p>原文押中</p>

<p>A. 经肛门用丝线从根部结扎切除 B. 腹腔镜直肠部分切除 C. 腹腔行局部切除术 D. 经肛门用血管钳夹切除 E. 内镜下高频电切除</p>	<p>肛门 20Cm 左右有一单个基底较宽肠息肉，选用下列哪种治疗最好 A. 圈厌器切除 B. 电灼 C. 剖腹息肉单纯切除 D. 部分结肠切除 E. 观察随诊</p>		
<p>30. 血尿的常见原因不包括 A. 输尿管结石 B. 急性膀胱炎 C. IgA 肾病 D. 单纯性肾囊肿 E. 膀胱癌</p>		<p>肾囊肿容易导致高血压（通过升高血压对抗囊肿压迫，提高肾小球动脉血流量）</p>	<p>智商推理题</p>
<p>31. 诊断低位肠梗阻最可靠的依据是 A. 腹部平片示小肠多个阶梯状气液平 B. 脐周可闻气过水音 C. 阵发性腹痛伴腹胀 D. 置胃管行胃肠减压后梗阻症状明显减轻 E. 频繁呕吐、呕吐量大</p>		<p>实践技能考试 X 线图片讲解</p>	<p>讲解押中</p>
<p>32. 有关肛裂的描述，正确的是 A. 老年人发病率高 B. 常伴发大出血 C. 常见于膝胸位肛门 12 点处 D. 应以手术治疗为主 E. 多因慢性腹泻发生</p>	<p>小册子 26 页原文 肛裂常发生在肛管的后正中位</p>		<p>原文押中</p>
<p>33. 关于外科感染的特点，错误的是 A. 多为混合性感染 B. 有明显的局部症状 C. 常需外科处理感染 D. 伴器质性病变 E. 不会引起严重的全身性感染</p>			<p>智商推理题</p>
<p>34. 对诊断门静脉高压最有价值的依据是 A. 肝功能异常 B. 脾大和脾功能亢进 C. 食管胃底静脉曲张 D. 腹水征阳性 E. 肝掌阳性</p>		<p>和门脉高压直接相关的部位</p>	<p>讲解押中</p>
<p>35. CHAnCE 骨折是指胸腰椎 A. 单纯性压缩骨折 B. 骨折—脱位 C. 屈曲—牵拉性损伤 D. 稳定性爆破型骨折</p>		<p>CHAnCE 骨折：屈曲牵张性椎骨骨折，多见于高速急刹车</p>	


E. 水平状撕裂性损伤			
<p>36. 内痔的早期症状是</p> <p>A. 排便时疼痛 B. 内痔脱出 C. 里急后重</p> <p>D. 肛门瘙痒 E. 排便时出血</p>	<p>小册子 26 页原文</p> <p>内痔早期的典型症状是里急后重、无痛性、间歇性便后出血</p> <p>【痔→便后出血 直肠息肉→便外带血】</p>		原文押中
<p>37. 对甲状腺结节的诊断，首先进行的辅助检查是</p> <p>A. 放射性核素扫描</p> <p>B. 甲状腺 B 超 C. 穿刺细胞学</p> <p>D. 颈部 MRI E. 颈部 CT</p>	<p>小册子 23 页原文</p> <p>通常甲状腺同位素扫描检查发现热结节以良性居多，冷结节可为良性肿瘤也可为恶性肿瘤（可能性大，男性癌症发病率高）。但最终确诊须依靠手术时病理检查</p>		原文押中
<p>38. 以下不适合用输尿管镜碎石的是</p> <p>A. 输尿管狭窄 B. 阴性结石</p> <p>C. 结石停留时间较长 D. 患侧肾积水 E. 肥胖患者</p>			智商推理题
<p>39. 肉眼血尿伴有凝血块可见于</p> <p>A. 急进性肾小球肾炎 B. 急性肾小球肾炎</p> <p>C. 慢性肾小球肾炎 D. 膀胱癌 E. AlporT 综合征</p>		<p>AlporT 综合征 遗传性肾炎，是以进行性血尿，肾功能不全为主，伴有耳聋和/或眼病变的一种遗传性疾病。</p> <p>选择肾脏以外的原因</p>	智商推理题
<p>40. 在梗阻性黄疸中，鉴别胆总管结石和胰头癌的主要依据是</p> <p>A. 血尿酸淀粉酶变化时间和幅度</p> <p>B. 黄疸进行性加重 C. 皮肤瘙痒</p> <p>D. 肝功能改变分析 E. 胆囊肿大</p>		<p>年龄 50 岁以上，渐进性黄疸加重通常考胰腺癌</p> <p>卫生部陈部长的故事</p>	讲解押中
<p>41. 一般不首选肠外营养治疗的是</p> <p>A. 严重脓毒症患者 B. 不宜经口进食超过 7 天者</p> <p>C. 脑外伤昏迷者 D. 小肠仅剩 50cm 者</p> <p>E. 急性重症胰腺炎患者</p>			智商推理题
42. 人类免疫缺陷病毒（HIV） 不易 传播的途径是			智商推理题



<p>A. 性传播 B. 器官移植 C. 母婴传播 D. 生活接触 E. 不洁注射</p>			
<p>43. 痛风患者合并的泌尿系结石，最可能的是 A. 草酸钙结石 B. 磷酸盐结石 C. 碳酸盐结石 D. 黄嘌呤结石 E. 尿酸结石</p>		<p>啤酒海鲜→尿酸增高→痛风 →尿酸结石→X线不显影</p>	<p>讲解押中</p>
<p>44. 股骨干下 1/3 骨折时骨折端移位方向是 A. 近折端向前上移位，远折端向前方移位 B. 近折端向前上移位，远折端向后方移位 C. 近折端向后上移位，远折端向前方移位 D. 近折端向后下移位，远折端向内侧移位 E. 近折端向后下移位，远折端向前方移位</p>			<p>讲解押中</p>
<p>45. 关于结肠损伤的描述，不正确的是 A. 结肠损伤发生率低于小肠损伤 B. 结肠内细菌多，一旦损伤继发腹腔感染较严重 C. 部分结肠位居腹膜后，损伤常导致腹膜后感染 D. 结肠内细菌多，一旦损伤腹膜炎均很早表现出来 E. 腹部闭合损伤中，结肠损伤易漏诊</p>		<p>腹膜后器官损伤→腹膜后感染→腹膜炎</p>	<p>智商推理题</p>
<p>46. 确诊流行性乙型脑炎常检查的抗体是 A. 特异性 IgM 抗体 B. 血凝抑制抗体 C. 血凝素抗体 D. 中和抗体 E. 补体结合抗体</p>	<p>小册子 19 页原文 乙型脑炎(简称乙脑)的主要传染源是 猪 人畜共患 蚊虫叮咬，早期诊断的实验室检查是 特异性 IgM 抗体检测 三带喙库蚊</p>	<p>GG 和 MM 的故事</p>	<p>原文押中</p>
<p>47. 感染性休克大剂量应用糖皮质激素治疗的时间最长不宜超过 A. 1 天 B. 5 天 C. 3 天 D. 7 天 E. 2 天</p>	<p>2002 原题：关于感染性休克病人应用糖皮质激素的依据与方法，不正确的是 A. 糖皮质激素可以稳定细胞即溶媒质膜，免收内毒素破坏 B. 大剂量糖皮质激素对心脏发挥正性肌力作用 C. 适当应用糖皮质激素可以减少并发症</p>	<p>大剂量突击疗法用于严重中毒性感染及各种休克。一日量可达 1g 以上，疗程不超过 2 天 (48 小时)。诱发或加重感染，胰腺炎及溃疡，骨质疏松等</p>	<p>原文押中</p>

	D. 糖皮质激素应从大剂量开始 E. 要取得治疗至少要使用 5 天		
48. 全身感染时, 可导致低体温、低白细胞、低血压的致病菌是 A. 肺炎链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 变形杆菌 D. 溶血性链球菌 E. 破伤风梭菌		革兰氏阴性菌的特点 男人和女人的故事	讲解押中
49. 属于成人中度烧伤的是 A. III 度烧伤面积小于 10% B. 烧伤总面积达 31%~50% C. II 度烧伤面积小于 10% D. II 度烧伤面积小于 20%伴休克 E. III 度烧伤面积 11%~20%	小册子 22 页原文 分度 II 度面积 III 度面积 轻 9 中度 29 9 一九二九不出手, 三九四九冰山走		原文押中
50. 对股骨头缺血性坏死早期诊断最有价值的是 A. B 超 B. 临床症状和体征 C. X 线片 D. CT E. MRI		股骨头缺血性坏死早期损害部位由于反应性硬化缘而呈现低信号区, 而坏死区内脂肪的高信号仍可保存, 形成所谓双线征	讲解押中
51. 分泌降钙素的细胞是 A. 神经垂体细胞 B. 甲状旁腺细胞 C. 甲状腺滤泡旁细胞 D. 甲状腺滤泡细胞 E. 腺垂体细胞	小册子 23 页原文 髓样瘤为来自 C 细胞→分泌降钙素		原文押中
52. 以缺血性静息痛为主要症状时, 提示血栓闭塞性脉管炎的分期是 A. IV 期 B. IIB 期 C. IIA 期 D. I 期 E. III 期	小册子 27 页原文 血栓闭塞性脉管炎 (BuErgEr 病): 游走性血栓性浅静脉炎, 好发男性青壮年→间歇性跛行	1. 第一期 (局部缺血期): 游走性浅静脉炎 。 2. 第二期 (营养障碍期): 间歇性跛行明显 3. 第三期 (坏死期)	智商推理题
53. 传染病的基本特征不包括 A. 感染后免疫 B. 病原体 C. 流行病学特征 D. 传染性 E. 遗传性			智商推理题
54. 代表乙肝病毒 (HBV) 复制最重要的血清指标是	小册子 18 页原文		原文押中

<p>A. HBsAg (+) B. HBEAg (+) C. 抗 HBC (+) D. 抗 HBs (+) E. 抗 HBE (+)</p>	<p>乙肝病毒标记物中反映 HBV 有活动性复制和传染性的是 E 抗原(HBEAg) 在乙型肝炎患者血清中，不能检测到的乙肝病毒标记物是 HBCAg</p>		
<p>55. 鉴别上尿路结石与腹腔钙化灶常用的检查方法是 A. 静脉尿路造影 B. CT C. 腹部侧位 X 线平片 D. B 超 E. MRI</p>		<p>一般根据病史、疼痛的性质和部位，尿中是否有红细胞，以及 X 线检查结果等不难鉴别 X 射线对钙化灶显影效果好</p>	<p>智商推理题</p>
<p>56. 女，出生 11 天。不能张口吸乳，偶有咳嗽、蹙眉，头后仰，上肢屈曲，下肢伸直，手半握拳状，无呼吸困难。其最可能的诊断是 A. 小儿抽搦症 B. 小儿癫痫 C. 呼吸道感染 D. 产后颅内血肿 E. 破伤风</p>	<p>小册子 22 页原文 不能引起败血症破伤风杆菌—特异性感染，痉挛毒素毒血症 革兰阳性厌氧芽孢杆菌 角弓反张</p>		<p>原文押中</p>
<p>57. 男，72 岁。进行性排尿困难 6 年，近 1 周出现排尿疼痛伴发热，T39C，B 超提示前列腺增大，残余尿 400ml，双肾积水。尿常规：WBC 30~50/HP。血 BUN 及 SCr 升高。入院后首选的治疗是 A. 耻骨上膀胱造瘘+抗感染治疗 B. A 受体阻滞剂 C. 5A 还原酶抑制剂 D. 前列腺切除 E. 抗感染治疗</p>		<p>前列腺增生导致尿路阻塞及肾积水，首先对症排尿</p>	<p>智商推理题</p>
<p>58. 女，35 岁。尿频、尿痛伴肉眼血尿 1 天。既往体健。查体无异常。尿亚硝酸盐阳性，尿沉渣镜检红、白细胞满视野。抗生素疗程一般为 A. 14 天 B. 5 天 C. 7 天 D. 10 天 E. 3 天</p>		<p>某些泌尿系统存在革兰氏阴性杆菌以将尿中蛋白质代谢产物硝酸盐还原为亚硝酸盐 治疗健康女性无合并征的膀胱炎，用甲氧苄氨嘧啶—磺胺甲基异恶唑和氟喹诺酮（环丙沙星）3 天疗程。</p>	
<p>59. 男，63 岁。2 型糖尿病 14 年，血压升高 5 年，尿蛋白定量 2.6g/D，血肌酐 132umol/L。其蛋白尿性质应为 A. 肾小球性 B. 功能性 C. 肾小管性 D. 溢出性 E. 分泌性</p>	<p>小册子 9 页原文 肾小球性蛋白尿 最常见多是由于肾小球滤过膜屏障损伤所致，若病变仅使电荷屏障受损，则尿中以白蛋白为主，称为选择性蛋白尿。</p>	<p>糖尿病肾病综合症</p>	<p>原文押中</p>

<p>60. 女, 25 岁。间断发热 5 天, 于 8 月底来诊。6 天前由南方到京, 次日出现寒战、发热、头痛, 服退热药后热退, 2 天后再次高热, 持续数小时, 大汗后退热, 伴乏力, 精神差。实验室检查: 血 WBC $6.5 \times 10^9/L$, 淋巴细胞 0.40。最可能的诊断是</p> <p>A. 急性血吸虫病 B. 流行性乙型脑炎 C. 败血症 D. 伤寒 E. 疟疾</p>		<p>疟疾典型临床表现</p>	<p>智商推理题</p>
<p>61. 男, 14 岁。左胫骨近端疼痛 2 个月, 呈进行性加重。X 线片检查发现左胫骨干骺端骨膜反应呈“日光射线”形态。最可能的诊断是</p> <p>A. 骨肉瘤 B. 骨巨细胞瘤 C. 骨软骨瘤 D. 骨结核 E. 骨囊肿</p>	<p>小册子 30 页原文 骨肉瘤是高度恶性的骨肿瘤, 多见于年轻人, 形成骨膜下的三角状新骨, 称为 CoDmAn 三角; 形成 X 线片上的“日光射线”征象, 化疗-肿瘤切除-化疗</p>		<p>原文押中</p>
<p>62. 女, 35 岁。上腹胀伴恶心、呕吐 20 天。进食后上腹胀明显, 恶心, 有时呕吐所进食物, 无发热。5 个月前曾撞伤上腹部。查体: 无贫血, 无黄染, 上腹部隆起, 可触及 18Cm x 14Cm 囊性包块, 不活动, 无压痛。钡餐透视见胃大弯受压上抬, 横结肠下移。最可能的诊断是</p> <p>A. 胰腺囊肿 B. 腹膜后血肿 C. 胰腺假性囊肿 D. 肠系膜囊肿 E. 胰腺囊腺瘤</p>	<p>小册子 25 页原文 方向盘常考胰腺损伤, 在各种腹部损伤中所占比例为 1-2%, 并发胰腺假性囊肿</p>		<p>原文押中</p>
<p>63. 男, 58 岁。上腹胀、隐痛 2 个月, 伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体: 消瘦, 浅表淋巴结无肿大。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱, 可见直径 3.5Cm 不规则充盈缺损, 胃壁僵直。其最常见的转移途径是</p> <p>A. 胃肠道内转移 B. 淋巴转移 C. 直接浸润 D. 血行转移 E. 腹腔内种植</p>	<p>小册子 25 页原文 胃癌最好发的部位是胃窦小弯侧。最主要的转移途径是淋巴转移</p>	<p>胃癌的转移可以有 4 条途径, 通常以淋巴转移和直接蔓延为主, 在晚期也可经血行转移。此外, 癌细胞可以直接种植于腹腔内。淋巴结占胃癌转移的 70%。</p>	<p>原文押中</p>
<p>64. 女, 37 岁。交通事故中右下肢受伤 3 小时。查体: 右下肢缩短, 右髋关节呈屈曲、内收、内旋畸形, 右足背麻木, 背屈无力。最可能的诊断是</p> <p>A. 髋关节中心脱位、坐骨神经损伤 B. 髋关节前脱位、坐骨神经损伤 C. 髋关节前脱位、闭孔神经损伤 D. 髋关节后脱位、股神经损伤 E. 髋关节后脱位、坐骨神经损伤</p>	<p>小册子 29 页原文 髋关节脱位的最多见类型是后脱位; 典型畸形屈曲、内收、内旋→易发生坐骨神经损伤→Allis 复位</p>		<p>原文押中</p>

<p>65. 男, 12 岁。10 天前出现上唇部红肿, 可见脓头, 自行挤压排脓液, 后出现发热, 畏寒, 体温最高达 38.9C, 寒战, 头痛剧烈, 神志不清, 其最可能的并发症是</p> <p>A. 颌下淋巴结炎 B. 眼眶内感染 C. 海绵状静脉窦炎 D. 面部蜂窝织炎</p>		<p>危险三角, 解剖学基础题 科普类知识点</p>	<p>智商推理题</p>
<p>66. 女, 27 岁。有不洁性交史, 查体: 外阴有一硬结节状物。荧光密螺旋体抗体吸收试验阳性, 应选择的治疗措施是</p> <p>A. 静脉滴注甲硝唑 B. 肌注青霉素 C. 口服多西环素 D. 口服阿莫西林 E. 口服红霉素</p>	<p>小册子 55 页原文</p> <p>螺旋体感染首选青霉素</p>		<p>原文押中</p>
<p>67. 男, 62 岁。皮肤黄染进行性加重 1 个月。伴上腹胀、隐痛, 食欲差、乏力, 10 天前感皮肤瘙痒, 大便呈陶土样。查体: 消瘦, 巩膜黄染, 腹部稍胀, 无明显压痛, 未触及包块, 胆囊无肿大。血 AFP 5ug/L。最可能的诊断是</p> <p>A. 肝门部胆管癌 B. 胆囊癌 C. 胆总管下段癌 D. 肝癌 E. 胰头癌</p>	<p>小册子 26 页原文</p> <p>下部胆管癌、胰头癌、壶腹癌和十二指肠癌, 则 Courvoisier 征可为阳性 (梗阻性黄疸同时可触及肿大而无触痛的胆囊)</p>		<p>原文押中</p>
<p>68. 男, 38 岁。突然呕血 1 天。呕吐物为血混有食物, 共 4 次, 每次约 100ml, 伴头晕。既往消化道溃疡病史 6 年。查体: P 100 次/分, BP 100/70mmHg, 贫血貌, 巩膜无黄染, 腹平软, 无压痛, 未触及包块, 腹水征 (一)。临床确定出血部位应特别注意检查</p> <p>A. 贲门部和十二直肠前壁 B. 胃底部和十二直肠球后部 C. 胃小弯和十二指肠后壁 D. 幽门和十二直肠前壁 E. 胃大弯和十二直肠侧壁</p>	<p>小册子 25 页原文</p> <p>90% 的 DU 溃疡穿孔发生在球部前壁, 而后部容易引起大出血</p> <p>胃癌: 胃窦 胃溃疡: 胃小弯 急性胃穿孔: 前壁 慢性胃穿孔、胃出血: 后壁</p>		<p>原文押中</p>
<p>69. 男, 40 岁。右下肢畏寒、疼痛间断发作 4 年。吸烟 8 余年。无高血压、糖尿病病史。查体: 右下肢皮温降低, 足背动脉搏动减弱。治疗措施中错误的是</p> <p>A. 戒烟 B. 抗凝药物治疗 C. 链激酶溶栓治疗 D. 腰交感神经节切除术 E. 高压氧舱治疗</p>	<p>小册子 27 页原文</p> <p>血栓闭塞性脉管炎 (Buerger 病): 游走性血栓性浅静脉炎, 好发男性青壮年 → 间歇性跛行</p>	<p>抽烟 → 交感兴奋 → 血栓闭塞性脉管炎</p>	<p>原文押中</p>
<p>70 男, 60 岁。排尿困难 2 个月。B 超检查见前列腺增大, 血清总 PSA 24ng/ml。为明确诊断, 最可靠的检查方法是</p> <p>A. 经直肠腔内超声 B. 前列腺 MRI C. 前列腺 CT D. 前列腺穿刺活检 E. 直肠指诊</p>		<p>年龄 50 以上考虑癌变</p>	<p>智商推理题</p>

<p>71. 女, 75 岁。摔倒时右手撑地, 腕部疼痛、肿胀。查体: 右腕部呈“枪刺刀”畸形:</p> <p>A. GAIEAZzi 骨折 B. ColIEs 骨折 C. MonTEggiA 骨折 D. CHAnCE 骨折 E. SmiTH 骨折</p>	<p>小册子 28 页原文</p> <p>伸直型桡骨下端骨折 (ColIEs 骨折) 的畸形是银叉型 (“枪刺” 样) 屈曲型骨折线方向相反</p>	 <p>图 3-2-1 Colles 骨折 图 3-2-2 背侧 Barton 骨折 图 3-2-3 Smith 骨折 图 3-2-4 掌侧 Barton 骨折 图 3-2-5 餐叉样畸形 图 3-2-6 枪刺刀样畸形</p>	<p>原文押中</p>
<p>72. 男, 32 岁。腹泻 3 个月, 大便每日 7~10 次, 稀便, 无脓血及黏液。有吸毒史 2 年。查体: T 37. 5C, 消瘦, 神志清楚, 肛周可见疱疹。实验室检查: 粪便镜检偶见白细胞。为明确诊断, 最重要的检查是</p> <p>A. 抗单纯疱疹病毒 IgM B. 抗 EBV IgM C. 结核抗体 D. 抗 CMV IgM E. 抗 HIV</p>	<p>科普知识: HIV 好发于男性同性恋吸毒人群</p>		<p>智商推理题</p>
<p>73. 女, 20 岁。甲状腺肿大 5 年, 右侧叶明显, 无不适, 近来出现 HornEr 综合征。其诊断最可能是</p> <p>A. 甲状腺腺瘤 B. 桥本甲状腺炎 C. 单纯性甲状腺肿 D. GrAvEs 病 E. 甲状腺癌</p>	<p>小册子 28 页原文</p> <p>PAnCoAsT 肿瘤又名肺顶癌+甲状腺癌 →颈交感神经受压, HornEr 综合征</p>		<p>原文押中</p>
<p>74. 女, 28 岁。腹痛 10 小时。起初上腹痛伴恶心、呕吐, 之后局限在右下腹, 持续性痛伴阵发性加剧。1 小时前腹痛从右下腹扩散到全腹, 发热。查体: T 39. 1C, 急性病容, 全腹肌紧张, 压痛和反跳痛 (+), 右下腹最明显。血常规: WBC 19. 1 x 10⁹/L, N 0. 91。考虑病情变化的主要解剖学基础是</p> <p>A. 阑尾动脉为终末血管, 出现梗塞缺血坏死 B. 阑尾黏膜内有丰富淋巴系统, 出现肿胀梗阻 C. 阑尾蠕动慢而弱, 进入的残渣和粪便嵌顿引起坏死 D. 阑尾在盲肠的开口狭小, 出现阻塞 E. 阑尾长, 阑尾系膜短, 出现扭转坏死</p>		 <p>阑尾阻塞→感染肿胀→压迫阑尾动脉→坏死穿孔→腹膜炎</p>	<p>讲解押中</p>
<p>75. 男, 32 岁。反复发作肛门胀痛伴畏寒、发热 2 个月。症状逐渐加重, 排尿不适, 肛门旁出现局部红肿疼痛, 继之破溃流出脓液。确保疗效的关键步骤是</p>	<p>小册子 26 页原文</p>	<p>确定内口外口, 选择是否挂线或手术治疗</p>	<p>原文押中</p>

<p>A. 瘻管切开，形成敞开的创面 B. 抗感染治疗后手术 C. 首先充分扩肛 D. 明确破溃外口和内口的位置 E. 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴</p>	<p>肛瘻不能自愈，必须手术治疗（包括挂线疗法-最佳疗法）。治疗原则：切开瘻管，形成开放创面，促使愈合</p>		
<p>76. 女，43岁。左乳头溢液10余天。无不适症状。查体：乳房视诊无异常发现，未扪及肿块，无压痛，按压左乳晕外上方可见黄褐色溢液。门诊首选的检查是 A. 热图像检查 B. 钼靶X线摄片 C. B型超声检查 D. 溢液图片细胞学检查 E. 近红外线扫描</p>		<p>门诊筛选，确定细胞性质，排除癌症</p>	<p>智商推理题</p>
<p>77. 男，26岁。腹泻半天，于8月15日来诊。腹泻30多次，开始为稀便，后为水样便，继之多次呕吐。查体：T 36.5℃，P 110次/分，BP 60/40 mmHg，神志清楚，皮肤干燥，弹性差。腹软，无压痛。粪常规：水样便，镜检 WBC 0~3/HP，RBC 0~2/HP。最可能的诊断是 A. 胃肠型细菌性食物中毒 B. 阿米巴痢疾 C. 急性细菌性痢疾 D. 溃疡性结肠炎 E. 霍乱</p>	<p>小册子19页原文 无发热、无腹痛+水样便=霍乱</p>		<p>原文押中</p>
<p>78. 女，70岁。跌倒后感右髋部疼痛1小时来诊。X线片检查示右股骨颈头下型骨折，PAUwEIs角为60度，最适宜的治疗方法是 A. 手术治疗 B. 右下肢皮牵引 C. 石膏固定 D. 休息制动 E. 手术复位</p>	<p>小册子29页原文 内收骨折：内收骨折是指 PAUwEIs角（远端骨折线与两髂嵴连线所成的角度）大于50°的骨折，属于不稳定骨折，容易移位</p>		<p>原文押中</p>
<p>79. 男，55岁。左下肢麻痛3年，间歇性跛行1年，左下肢疼痛逐渐加重，夜间疼痛更甚。吸烟史30年。查体：屈膝位，左小腿皮温较对侧降低，左侧足背动脉搏动消失。对该患者有助于诊断的试验是 A. PErTHEs试验 B. BuErgEr试验 C. PrATT试验 D. HomAns试验 E. TrEnDElEnBurg试验</p>	<p>小册子27页原文 血栓闭塞性脉管炎（BuErgEr病）：游走性血栓性浅静脉炎，好发男性青壮年→间歇性跛行</p>	<p>抬高肢体（下肢70~80°，上肢直举过头），持续60秒，肢体远端皮肤如苍白色，提示动脉供血不足；再将下肢下垂，正常人皮肤色泽10秒内恢复，如时间超过45秒，进一步提示动脉供血障碍。肢体持续下垂，出现明显潮红或发绀者，提示静脉逆流或回流障碍</p>	<p>原文押中</p>
<p>80. 女，43岁。腹痛16小时，呈持续性，阵发性加重，伴呕吐，无肛门排气。查体：全腹肌紧张，有压痛及反跳痛。行腹腔穿刺抽出的液体呈血性，伴臭味。最可能的诊断是</p>	<p>小册子25页原文 在鉴别单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻时，最有意义的化验检查项目是呕吐</p>		<p>原文押中</p>

<p>A. 绞窄性肠梗阻 B. 胃十二直肠穿孔 C. 急性阑尾炎穿孔 D. 结核性腹膜炎 E. 急性重症胰腺炎</p>	<p>物隐血试验 绞窄性肠梗阻时会出现固定点压痛和腹膜刺激征的出现 绞窄性肠梗阻是指肠梗阻并伴有肠壁血运障碍</p>		
<p>81. 女, 60岁。身高170Cm, 体重65kg, 每天所需基本热量约为 A. 1235 kCAI B. 1035 kCAI C. 1625 kCAI D. 755 kCAI E. 2560 kCAI</p>	<p>小册子 62 页原文 60岁, 身高170Cm, 体重65kg, 每日基础能量消耗约是1600kCAI, 1600~2000</p>		原文押中
<p>82. 男, 60岁。背部无痛性肿块5年, 约鸽蛋大小, 未见增大。查体: 右肩胛下皮下一圆形肿块, 直径约3.5Cm, 与皮肤粘连, 表面有黑头, 质稍硬, 无压痛, 边界清。其最可能的诊断是 A. 皮脂囊肿 B. 畸胎瘤 C. 鳞状细胞癌 D. 脂肪瘤 E. 纤维瘤</p>		<p>脂肪瘤质地柔软, 皮下, 可推动, 大小不等, 表皮正常 皮脂腺囊肿俗称“粉瘤”, 皮脂腺导管阻塞形成囊肿, 大小不等 纤维瘤橡皮球可推动≠神经纤维瘤≠创伤性神经瘤</p>	
<p>83. 男, 35岁。28小时前饱餐后参加剧烈运动时突发腹痛、腹胀。持续性, 伴阵发性绞痛, 并有频繁呕吐, 无肛门排气。病情加重并昏倒。查体: T 35.6C, P 126次/分, BP 80/50 mmHg, 急性病容, 四肢发绀, 全身冷汗。全腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音消失。腹穿抽出血性液体。该患者所患疾病最主要的病理生理改变是 A. 细胞外液容量迅速减少 B. 心输出量低, 外周阻力高 C. 左心室功能不全 D. 短时大量出血 E. 下腔静脉回流障碍</p>	<p>小册子 20 页原文 【中度休克 70-90 20-40% 800~1600 血红蛋白/重度贫血 60】</p>	<p>休克+呕吐 导致细胞外容量减少</p>	智商推理题
<p>84. 男, 52岁。无痛性肉眼血尿3个月。膀胱镜检查见膀胱三角区有一4Cm x 3Cm新生物, 呈浸润性生长, 病理诊断为膀胱腺癌, 最适宜的治疗方法是 A. 膀胱部分切除 B. 经尿道膀胱肿瘤电切 C. 化疗 D. 根治性膀胱切除 E. 放疗</p>	<p>小册子 23 页原文 I 期 T1N0M0 II 期 T0-2N1M0 III 期 T1--2N0--2M0 或 T3N0-2M0 IV 期 T1--3N0--2M0-2 或 T0N0-2M1 恶性肿瘤种植性转移到盆腔, 最多见的是胃癌• III 期者手术前、后及术中放疗或化</p>		原文押中

	疗。		
85. 男, 53 岁。上腹胀痛 10 余年, 多于饭后约 30 分钟加重。半年来上腹痛加重, 伴反酸, 间断呕吐胃内容物。吸烟 15 年饮白酒 10 年, 每日约半斤。患者的病变最可能位于 A. 十二指肠球部 B. 胃窦 C. 胃体 D. 贲门 E. 胃底	小册子 25 页原文 90% 的 DU 溃疡穿孔发生在球部前壁, 而 后部容易引起大出血 胃癌: 胃窦 胃溃疡: 胃小弯 急性胃穿孔: 前壁 慢性胃穿孔、胃出血: 后壁	饱痛与饿痛的故事	原文押中
86. 男, 32 岁。咽痛、咳嗽 7 天, 水肿、伴尿少 5 天。化验: HB 90g/L, 尿蛋白 (+++), 血肌酐 500umol/L, 血尿素氮 23mmol/L, B 超示双肾增大。其最可能的临床诊断是 A. 肾病综合征 B. 慢性肾小球肾炎 C. 急性肾小球肾炎 D. 急性肾盂肾炎 E. 急进性肾小球肾炎	小册子 68 页原文 慢性肾衰竭按肾功能损害的程度可分为 1. 肾储备能力下降期, 血肌酐正常, 临床无症状; 2. 氮质血症期 , 血肌酐<450umol/L; 3. 肾衰竭期: 血肌酐在 450-700umol/L 4. 尿毒症期: 血肌酐>700umol/L	急进性 坏了	原文押中
87. 女, 60 岁。双下肢水肿两周。既往高血压 10 年, 平时血压 140/90 mmHg, 糖尿病 3 年。尿蛋白 3. 8g/D, 尿红细胞 3~5/HP, 血 AIB 29g/L, 空腹 Glu 8. 5 mmol/L, SCr 198 umol/L。双侧眼底出血。以下最支持糖尿病肾病诊断的是 A. 空腹血糖高 B. 眼底出血 C. 水肿 D. 血肌酐升高 E. 糖尿病病史 3 年		糖尿病 → 微血管改变 → 肾病及视网膜病变 95% 以上合并有糖尿病视网膜病变	智商推理题
88. 女, 28 岁。结节性甲状腺肿 10 年, 近半年出现怕热、多汗。T3、T4 值高于正常值近 1 倍。妊娠 4 个月, 有哮喘史。最适合的治疗方法是 A. 抗甲状腺药物治疗 B. 普萘洛尔治疗 C. 碘剂治疗 D. 放射性碘治疗 E. 甲状腺大部切除术	小册子 15 页原文 甲亢患者合并妊娠 8 个月宜采用治疗措施 小剂量丙基硫氧嘧啶	胎儿越小产生先天性疾病 (≠遗传性) 的概率越高, 通常 3 月胎龄最明显	原文押中
89. 女, 60 岁。宫颈癌行子宫切除术后 3 天, 晨起时突发左小腿疼痛, 左足不能着地踏平, 行走时疼痛加重。查体: 左小腿肿胀, 深压痛, 足背动脉搏动存在。首先的检查为 A. 同位素骨扫描 B. 下肢 CT C. 下肢 X 线平片 D. 下肢 MRI E. 下肢超声多普勒	小册子 35 页原文 孕妇小腿深静脉血栓: 霍曼氏征 (HomAns) 即直腿伸踝试验为阳性	深静脉血栓	原文押中
90. 女, 55 岁。左乳房红肿、增大 1 个月, 进展较快, 无疼痛、发热。查体: 左乳房红肿, 局部温度略高, 发硬, 但未触及包块,	小册子 24 页原文		原文押中

<p>左腋窝有肿大淋巴结，稍硬，活动度好，无压痛。血常规正常。最可能的诊断是</p> <p>A. 乳腺增生症 B. 急性乳腺炎 C. 乳房结核 D. 导管内乳头状瘤 E. 炎性乳腺癌</p>	<p>炎性乳癌：多见年轻、妊娠期、哺乳期女性，恶性程度较高，且预后最差。</p>		
<p>91. 男，32岁。会阴部骑跨伤5小时。伤后会阴部疼痛，尿道口滴血，不能自行排尿。生命征稳定，阴囊肿大、青紫。正确的处理方法是</p> <p>A. 抗感染 B. 经会阴尿道断端吻合+引流尿外渗 C. 膀胱造瘘 D. 导尿 E. 应用止血药</p>	<p>小册子30页原文 尿道损伤病人首先导尿，应留置导尿1周以引流尿液并支撑尿道。 骑跨式外伤最易损伤尿道是球部，最有特征性的症状是尿道溢血 骨盆骨折易伤及膜部尿道</p>		原文押中
<p>92. 男，16岁。左胫腓骨闭合性骨折，管形石膏外固定，3小时后左小腿出现胀痛，并持续加重，足趾麻木，被动牵拉痛，对其首要的处理是</p> <p>A. 给予止痛药物、继续观察 B. 立即拆除石膏 C. 给予脱水药、继续观察 D. 给予抗生素治疗 E. 不需处理、继续观察</p>		压迫加重缺血缺氧加重，立刻拆除石膏	智商推理
<p>93. 女，48岁。2天前餐后突然出现右上腹阵发性绞痛，恶心，尿色呈浓茶样，以往有类似发作。查体：急性病容，巩膜黄染，腹部无肌紧张，右上腹深压痛，能的诊断是</p> <p>A. 胆总管结石 B. 胆道蛔虫病 C. 胆总管囊肿 D. 急性胰腺炎 E. 急性胆囊炎</p>	<p>小册子26页原文 急性梗阻性化脓性胆管炎除具有一般胆道感染的Charcot三联症（腹痛、寒战高热、黄疸）外，还可出现休克、中枢神经系统受抑制表现，即REynolds五联征</p>		原文押中
<p>94. 女，31岁。腹痛、寒战、高热、黄疸反复发作3年。1天来上腹部持续性疼痛，伴阵发性绞痛，恶心，无呕吐。查体：T 38.6℃，巩膜黄染，右上腹压痛（+），无反跳痛，胆囊大，Murphy征（+）。最佳处理措施是</p> <p>A. 胆总管奥狄氏括约肌切开术 B. 胆囊造瘘术 C. 单纯胆囊切除术 D. 胆囊切除+胆总管探查T管引流术 E. 胆囊切除+胆总管十二指肠吻合术</p>	<p>治疗急性梗阻性化脓性胆管炎最常用的有效手术方式是胆总管切开、T管引流术</p>		原文押中

<p>95. 男, 13 岁。剧烈运动后右膝关节前方疼痛 1 周。查体: 右胫骨结节处有明显隆起, 压痛阳性。X 线片示胫骨结节骨骺增大、碎裂。最合适的处理方法是</p> <p>A. 局部封闭 B. 钻孔植骨 C. 膝关节短期制动 D. 穿刺活检 E. 切除活检</p>			<p>智商推理</p>
<p>96. 男, 35 岁。车祸致腰背部受伤, 腰部活动明显受限, 双下肢出现迟缓性瘫痪, 大小便失禁。伤后 1 小时双下肢感觉、运动功能好转。最可能的诊断是</p> <p>A. 马尾神经损伤 B. 脊髓挫伤 C. 脊髓受压 D. 脊髓震荡 E. 脊髓出血</p>	<p>小册子 29 页原文 脊髓震荡是指脊髓暂时性功能抑制</p>		<p>原文押中</p>
<p>97. 女, 54 岁。腹痛、腹胀、乏力 3 个月。腹部隐痛阵发性发作。查体: 贫血貌, 浅表淋巴结无肿大, 巩膜无黄染, 腹软, 未见肠型, 右下腹可触及一活动性包块。实验室检查: HB 90g/L, WBC $9.5 \times 10^9/L$, 肝功能正常, CEA 20ug/L。粪隐血试验阳性。最可能的诊断是</p> <p>A. 回盲部套叠 B. 回盲部结核 C. 溃疡性结肠炎 D. 回盲部肿瘤 E. 克罗恩病</p>		<p>消化科漫画大串讲 年纪大出血考虑癌症</p>	<p>讲解押中</p>
<p>98. 男, 60 岁。因慢性肾功能不全入院。血生化检查: $K^+ 6.5 \text{ mmol/L}$, $Na^+ 136 \text{ mmol/L}$, $Ca^{2+} 2.1 \text{ mmol/L}$, $CO_2CP 25 \text{ mmol/L}$。心电图示 T 波高尖。下列处理不正确的是</p> <p>A. 静滴碳酸氢钠溶液 B. 应用氨苯蝶啶快速利尿 C. 静注葡萄糖酸钙 D. 停用含钾药物 E. 静滴葡萄糖和胰岛素</p>	<p>小册子 29 页原文 中效利尿药: 噻嗪类, 以氢氯噻嗪为代表 低效利尿药: 螺内酯 (安体舒通, 男子乳房女性化和妇女多毛症), 氨苯蝶啶 → 高血钾症</p>		<p>原文押中</p>
<p>99. 男, 40 岁。慢性肾衰竭患者, 饮食控制欠佳。突发抽搐, 意识丧失, 心跳骤停。死亡原因最可能是</p> <p>A. 代谢性酸中毒 B. 高血压 C. 心功能不全 D. 高钾血症 E. 尿毒症脑病</p>	<p>小册子 11 页原文 高钾血症是急性肾功能衰竭少尿期的重要致死原因, 透析疗法是治疗高钾血症最有效的方法。</p>		<p>原文押中</p>
<p>100. 男, 35 岁。腰背部疼痛 3 个月, 伴有乏力、盗汗。查体: 双下肢感觉、运动功能正常。X 线显示 L2-3 椎间隙狭窄, 腰大</p>	<p>小册子 30 页原文</p>	<p>典型腰椎结核</p>	<p>原文押中</p>

<p>肌影增宽。最适宜的治疗方法是</p> <p>A. 抗结核药物治疗 B. 局部注射抗炎药物</p> <p>C. 腰背部理疗按摩 D. 加强腰背肌锻炼</p> <p>E. 立即行病灶清除手术</p>	<p>腰椎结核发病率最高，最常见的发生部位是椎体，拾物试验阳性</p>		
<p>101. 女，59岁。因高热、腹泻静脉点滴庆大霉素治疗，5天后出现恶心、呕吐、伴少尿。查血白细胞总数及分类正常，尿比重1.010，蛋白(+)，红细胞0~2/HP，白细胞3~5/HP。血肌酐320umol/L，尿素氮17mmol/L，尿钠100mmol/L。该患者肾衰最可能的原因是</p> <p>A. 急性肾小管坏死 B. 急性间质性肾炎</p> <p>C. 急进性肾小球肾炎 D. 肾前性氮质血症</p> <p>E. 急性肾小球肾炎</p>	<p>小册子9页原文</p> <p>肾小管性蛋白尿 这是肾小管对正常滤过蛋白质重吸收障碍所致。主要组成为 β_2微球蛋白等，见于各种肾小管损伤，尤其是受到抗生素或重金属损伤时产生。</p>		<p>原文押中</p>
<p>102. 女，40岁。头痛3个月，加重伴间断性呕吐、抽搐、视物模糊1个月。查体：右上肢可见2个活动良好的椭圆形结节，眼底检查有视神经乳头水肿。最可能的诊断是</p> <p>A. 癫痫 B. 隐球菌性脑膜炎 C. 脑肿瘤</p> <p>D. 囊尾蚴病 E. 结核性脑膜炎</p>	<p>小册子20页原文</p> <p>囊虫病是猪肉绦虫的囊尾蚴寄生于人体所致的疾病。人因误食猪肉绦虫卵而感染猪囊尾蚴主要寄生在皮下组织肌肉和中枢神经系统，以寄生在脑组织者最为严重，药物阿苯达唑（绦虫及蛲虫）</p>		<p>原文押中</p>
<p>103. 男，20岁。右前臂被炸伤4小时，最大伤口长5Cm，出血多，伤及肌肉，X线检查无骨折、未见金属异物，其伤口最佳处理是</p> <p>A. 清创后二期缝合 B. 加压包扎止血、观察</p> <p>C. 清洗伤口后包扎 D. 包扎，石膏固定患肢</p> <p>E. 清创后一期缝合</p>	<p>小册子22页原文</p> <p>清创术应争取在8小时内进行，一般不得超过24小时</p> <p>伤口超过12小时或火器伤，应按感染伤口处理，即清创换药，不予一期缝合，可行延期缝合</p>		<p>原文押中</p>
<p>104. 男，56岁。因吞咽、饮水困难2周，现有乏力、尿少、极度口渴来诊。查体：血压正常，唇干，眼窝凹陷，烦躁不安，出现躁狂、幻觉，有时昏迷。该患者应考虑为</p> <p>A. 中度低渗性缺水 B. 中度等渗性缺水</p> <p>C. 重度等渗性缺水 D. 中度高渗性缺水</p> <p>E. 重度高渗性缺水</p>		<p>尿极少、明显凹陷=重度</p> <p>等渗性缺水=急性缺水=不渴=平衡盐=最常见</p> <p>低渗性缺水=慢性缺水=不渴</p> <p>高渗性缺水=原发性缺水=口渴</p>	<p>讲解押中</p>

<p>105. 女, 20 岁。右腕部被刀割伤 3 小时。查体: 右手小指掌背侧及环指尺侧感觉障碍。损伤的神经是 A. 腋神经 B. 桡神经 C. 正中神经 D. 肌皮神经 E. 尺神经</p>		<p>尺神经桡神经分布范围 记忆动作</p>	<p>讲解押中</p>
<p>106. 男, 16 岁。腹痛、腹泻、消瘦 3 年。腹部阵发性疼痛, 大便 3~4 次/日, 伴黏液和血。有家族性结肠息肉病史。查体: 营养不良, 贫血貌, 腹平软, 下腹部有轻压痛。结肠镜检查见结肠内全部布满息肉, 直肠病变轻。最佳手术方式是 A. 单腔回肠造瘘术 B. 结肠次全切除 C. 全结肠切除、末端回肠直肠吻合术 D. 电灼摘除息肉 E. 经腹会阴联合全结直肠切除术</p>		<p>家族性肠息肉病 是指在肠道广泛出现数目多于 100 颗的息肉, 接近 100%癌变</p>	<p>讲解押中</p>
<p>107. 男, 26 岁。右小腿受伤 12 小时。查体: 右小腿中段前方皮肤有一 10Cm 长创口, 软组织挫伤严重, 胫骨断端外露, 双侧足背动脉搏动对称, 感觉正常。彻底清创最适宜的进一步治疗方法是 A. 螺丝钉固定 B. 髓内钉固定 C. 石膏固定 D. 钢板固定 E. 外固定架固定</p>	<p>小册子 28 页原文 外固定架固定治疗新鲜胫骨骨折具有愈合快、并发症少、功能恢复好等优点</p>		<p>原文押中</p>
<p>108. 男, 68 岁。因胃溃疡出血行毕 I 式胃大部切除术。术后第 6 天, 有肛门排气, 开始进流质饮食, 进食后腹胀并呕吐, 呕吐物中含胆汁。腹部可见胃型, 无蠕动波, X 线平片示残胃内大量胃液潴留。产生此症状的最可能原因是 A. 近端空肠返流 B. 远端空肠返流 C. 残胃蠕动功能障碍 D. 吻合口水肿 E. 吻合口不全梗阻</p>			<p>智商推理题</p>
<p>(109~110 题共用题干) 男, 12 岁。发热 2 天, 伴头痛、神志不清 1 天, 8 月中旬来诊。查体: T39. 5C, 神志不清, 克氏征、布氏征 (+)。实验室检查: 血 WBC 16 x 10⁹/L。 109. 最可能的诊断是 A. 疟疾 B. 钩端螺旋体病 C. 流行性乙型脑炎 D. 流行性脑脊髓膜炎 E. 中毒型菌痢</p>	<p>小册子 19、41 页原文 乙型脑炎(简称乙脑)的主要传染源是 猪 人畜共患 蚊虫叮咬, 早期诊断的实验室检查是 特异性 IgM 抗体检测 三带喙库蚊</p>	<p>化脓性脑膜炎脑膜刺激征显著, 皮肤常有瘀点。脑脊液混浊, 中性粒细胞占 90%以上, 周围血象白细胞可达 20~30 x 10⁹/L, 中性粒细胞多在 90%以上, 早期难以鉴别, 需复查脑脊液</p>	<p>智商推理题</p>

<p>110. 为确诊应进行的检查是</p> <p>A. 钩体显凝试验 B. 血涂片找疟原虫</p> <p>C. 血培养 D. 脑脊液常规及培养</p> <p>E. 血清特异性 IgM 抗体</p>	<p>化脑:高热, 有颅高压症状(呕吐、两眼凝视、前凶隆起), 皮肤出血点、淤斑</p> <p>化脑合并硬膜下积液 长期发热迁延不断 肺炎链球菌 流感嗜血杆菌</p>		
<p>(111~112 题共用题干)</p> <p>男, 54 岁。20 天内呕血 2 次, 每次约 100ml 之后大便发黑。乙肝病史 30 年, 贫血貌, 浅表淋巴结未触及, 皮肤蜘蛛痣和出血点。腹软, 肝未触及, 腹水征 (+)。肾功能正常。胃镜检查见食管静脉曲张。</p> <p>111. 最适宜的治疗方法是</p> <p>A. 远端脾肾静脉分流术</p> <p>B. 脾切除、胃底食管下端周围血管离断术</p> <p>C. 脾切除、脾肾静脉分流术</p> <p>D. 门腔静脉侧吻合分流术</p> <p>E. 经颈静脉肝内门体分流术</p> <p>112. 如果治疗后又发生大出血, 最易发生的并发症是</p> <p>A. 肝性脑病</p> <p>B. 急性左心衰竭</p> <p>C. 重度腹水</p> <p>D. 急性肾衰竭</p> <p>E. 急性肝坏死</p>	<p>小册子 8、26 页原文</p> <p>贲门周围血管离断术需离断的血管中不包括胃网膜右静脉(注入肠系膜上静脉, 位置靠下)</p> <p>肝性脑病最有意义的体征扑翼样震颤</p> <p>肝昏迷病人清洁肠道时应禁用肥皂水: 碱性有利于氨的吸收</p> <p>精氨酸在人体内参与鸟氨酸循环, 促进尿素的形成, 使人体内产生的氨经鸟氨酸循环变成无毒的尿素, 通过尿液排出, 从而降低血氨浓度, 可引起酸中毒, 酸中毒禁用【精氨酸】</p>	<p>考试套路: 肝硬化→门脉高压→食道静脉曲张→血管断离术→肝性脑病</p>	<p>原文押中</p>
<p>(113~114 题共用题干)</p> <p>男, 33 岁。因急性坏疽性阑尾炎行阑尾切除, 术后第 10 天出现发热, 体温 39. 2℃, 腹胀、恶心, 肛门有下坠感, 里急后重, 曾排便 4 次, 为黏液样便。</p> <p>113. 此时首先应选用的检查是</p> <p>A. 大便培养 B. 腹部 X 线平片 C. 血常规</p> <p>D. 腹部 C 超 E. 直肠指诊</p> <p>114. 诊断明确后, 除抗感染和支持疗法外, 以下处理措施应首选的是</p> <p>A. 经下腹正中切口进入腹腔引流</p> <p>B. 经直肠穿刺抽液定位后切开引流</p>	<p>小册子 25 页原文</p> <p>【老年小孩差异 术后血管神经损伤+感染+粘连性肠梗阻+膈下脓肿、盆腔脓肿】</p>	<p>临床常用: 肛门直肠前壁套管针穿刺引+理疗</p>	<p>原文押中</p>


<p>C. 经原麦氏切口进入腹腔引流 D. 腹腔透热理疗 E. 温盐水加甲硝唑保留灌肠</p>			
<p>(115~116 题共用题干) 男, 32 岁。反复腰部胀痛 1 年余。B 超见右肾盂结石, 大小 1. 5Cmx 1. 0Cm; 左肾积水左输尿管上段结石, 大小 1. 0Cm x 0. 8Cm。尿常规: RBC5~10/HP, WBC16~20/HP。总肾功能正常。 115. 要了解该患者肾功能首选的检查方法是 A. CT 平扫 B. 复查 B 超 C. KUB D. MRI E. IVU 116. 首选的治疗方法是 A. 左输尿管结石体外冲击波碎石 B. 右肾盂结石体外冲击波碎石 C. 左输尿管切开取石 D. 药物排石 E. 右肾盂切开取石</p>	<p>小册子 30 页原文 体外冲击波碎石: 最适宜于<2. 5Cm 的结石 保住肾功能为主 双侧结石的处理原则: 首先处理梗阻重、肾功能易于恢复、易于处理的一侧。双侧输尿管结石: 先处理梗阻重。一侧肾结石、一侧输尿管结石: 处理输尿管结石。双侧肾结石: 先处理易于取出</p>	<p>IVU 静脉肾盂造影: 功能(滤过)与形态检查</p>	<p>原文押中</p>
<p>(117~118 题共用题干) 男, 35 岁。发热、咳黄痰 10 天, 水肿伴恶心、呕吐、呼吸困难 1 周, 1 天前突发抽搐、昏迷。既往 IgA 肾病 5 年。查体: BP 180/110 mmHg, 贫血貌, 深大呼吸, 双中下肺野闻及湿罗音, 心率 120 次/分。双下肢水肿。HB68g/L, SCr 1325umol/L。 117. 患者意识障碍最可能的原因是 A. 高血压脑病 B. 低钙血症 C. 尿毒症脑病 D. 贫血 E. 脑血管病 118. 当前最有效的治疗措施是 A. 血液透析 B. 大剂量利尿剂 C. 输血 D. 降压 E. 抗感染</p>	<p>小册子 68 页原文 慢性肾衰竭按肾功能损害的程度可分为 1. 肾储备能力下降期, 血肌酐正常, 临床无症状; 2. 氮质血症期, 血肌酐<450umol/L; 3. 肾衰竭期: 血肌酐在 450-700umol/L 4. 尿毒症期: 血肌酐>700umol/L</p>		<p>原文押中</p>
<p>(119~120 题共用题干) 男, 42 岁。进油腻饮食后腹胀、腹痛 4 小时。持续性上腹痛, 伴有恶心、呕吐、发热、腰背部不适。查体: T38. 4C, P124 次/分, BP 90/60 mmHg, 急性痛苦貌, 巩膜无黄染, 腹饱满, 全腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 上腹为主, 肠鸣音消失。右下腹穿刺抽出淡红色血性液体。血 WBC 16. 2 x 10⁹/L, N 0. 9。血清淀</p>		<p>公开课, 导学课, 培训课程多次提到: 三秒见答案举例, 持续性上腹痛=急性胰腺炎</p>	<p>讲解押中</p>

<p>粉酶 6000U/L (Somogyi 法)。</p> <p>119. 出现这种病变的主要发病机制是</p> <p>A. 细菌侵入胰周围和胰腺内 B. 胰腺供血动脉栓塞引起供血障碍 C. 穿透性十二指肠溃疡导致胰腺炎性反应 D. 胆囊炎、胆囊结石堵塞胆囊管，梗阻 E. 胰腺中的消化酶被激活后导致胰腺自身消化</p> <p>120. 引起这种疾病常见因素不包括</p> <p>A. 腹部外伤 B. 暴饮暴食 C. 酗酒 D. 胆道感染 E. 胃食管反流</p>		<p>油腻食物→胆囊收缩→胆汁+胆结石排泄→胆总管+胰管交汇处阻塞→胰液排泄受阻→胰液自身消化→急性胰腺炎</p>	
<p>(121~122 题共用题干)</p> <p>女，33 岁。发现左乳房包块 10 天，无不适症状。查体：乳房视诊无异常，左乳房外上象限可触及 1.5Cm x 1.5 Cm 包块，质硬，不光滑，活动度良好，左腋窝未触及肿大淋巴结。钼靶 X 线片检查示 1.5Cm x 1Cm 密度增高影，周边有小毛刺，中央可见聚集细小钙化点。</p> <p>121. 准备手术治疗。以下可选择的术式中，必须在术后放疗的是</p> <p>A. 保留胸大、小肌的改良根治术 B. 全乳房切除术 C. 保留胸大肌的改良根治术 D. 乳腺癌根治术 E. 保留乳房的乳腺切除术</p> <p>122. 术后 10 天拟行综合治疗，决定是否可用靶向治疗（曲妥珠单抗）的肿瘤标记物是</p> <p>A. ER B. HER-2 C. P53 D. Ki67 E. PR</p>		<p>非根治手术后，追加放疗确保疗效</p> <p>赫赛汀：曲妥珠单抗，是抗 HER2 的单克隆抗体，它通过将自己附着在 HER2 上来阻止人体表皮生长因子在 HER2 上的附着，从而阻断癌细胞的生长，赫赛汀还可以刺激身体自身的免疫细胞去摧毁癌细胞。</p> <p>【HER2 她两乳腺】</p>	<p>121 题：智商推理</p>
<p>(123~124 题共用题干)</p> <p>男，1 岁。突然哭闹 4 小时，阵发性发作，不发作时如正常，发作时面色苍白伴呕吐，为所食牛奶，大便呈果酱样。</p> <p>123. 发作时查体，最可能的腹部体征是</p> <p>A. 全腹胀，可见肠型 B. 肝浊音界消失 C. 肠鸣音减弱或消失 D. 右腹部可扪及腊肠形肿物 E. 全腹肌紧张</p>	<p>小册子 25 页原文</p> <p>在鉴别单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻时，最有意义的化验检查项目是呕吐物隐血试验</p> <p>绞窄性肠梗阻时会出现固定点压痛和腹膜刺激征的出现</p> <p>绞窄性肠梗阻是指肠梗阻并伴有肠壁血运障碍</p>	<p>讲解原文</p> <p>421. 关于肠套叠的描述错误的是 A◆</p> <p>A. 属于单纯性肠梗阻 ◆ B. 好发于 2 岁以前男孩 ◆ C. 以腹痛、便血、腹部肿块为特征◆</p>	<p>原文押中</p>

<p>124. 常规首选的治疗方法是</p> <p>A. 急症剖腹探查 B. 低压空气灌肠</p> <p>C. 静脉滴注抗生素 D. 胃肠减压</p> <p>E. 镇静和止痛药物</p>	<p>肠套叠好发于2岁以前男孩，幼儿肠套叠48小时内者可试行空气灌肠复位，慢性复发性肠套叠为手术适应证之一</p>	<p>D. 幼儿肠套叠48小时内者可试行空气灌肠复位◆</p> <p>E. 慢性复发性肠套叠为手术适应证之一◆</p>	
<p>(125~126 题共用题干)</p> <p>男，60岁。发热伴寒战、心悸7天，体温最高39℃，头痛、咳嗽，右大腿肿痛，病情渐重入院。查体：T38℃，P100次/分，R24次/分，BP100/75mmHg。神志清楚，巩膜轻度黄染，双肺呼吸音粗，无啰音，心脏无异常，腹平软、无压痛，肝区无叩痛。右大腿中段红肿，范围约10cm，压痛明显，有波动感。血WBC20×10⁹/L，HB100g/L，多次血培养（一）。</p> <p>125. 该患者目前最可能的诊断是</p> <p>A. 脓毒症 B. 肝脓肿 C. 菌血症</p> <p>D. 急性肺炎 E. 感染性休克</p> <p>126. 对该患者，最恰当的处理是</p> <p>A. 应用针对G-菌抗生素 B. 适当输注新鲜血</p> <p>C. 应用糖皮质激素 D. 抗休克治疗</p> <p>E. 切开引流</p>	<p>小册子22、26页原文</p> <p>导管性脓毒症→拔除中心静脉导管+用抗生素◆</p> <p>坐骨直肠间隙脓肿早期切开引流指征局部有波动</p>		<p>原文押中</p>
<p>(127~128 题共用题干)</p> <p>女，36岁。慢性肾衰竭4年。1周来水肿加重伴恶心、呕吐、胸痛、呼吸困难。查体：T38.1℃，BP180/100mmHg，心前区可闻及新报摩擦音。血红蛋白63g/L，血尿素氮28.6mmol/L，肌酐870.9μmol/L。</p> <p>127. 此患者病情危重的主要表现是</p> <p>A. 内分泌失调 B. 高血压</p> <p>C. 呼吸困难 D. 贫血 E. 水肿</p> <p>128. 目前治疗错误的是</p> <p>A. 血液透析 B. 利尿 C. 抗感染</p> <p>D. 快速补充血容量 E. 控制血压</p>	<p>小册子68页原文</p> <p>慢性肾衰竭按肾功能损害的程度可分为1. 肾储备能力下降期，血肌酐正常，临床无症状；2. 氮质血症期，血肌酐<450μmol/L；3. 肾衰竭期：血肌酐在450-700μmol/L 4. 尿毒症期：血肌酐>700μmol/L</p>	<p>全国最大恶性医疗事故 过渡输液死人 小马驹的故事</p>	<p>原文押中</p>
<p>(129~130 题共用题干)</p> <p>男，14岁。发热5天，伴乏力、纳差、恶心、尿黄1天。有不洁</p>	<p>小册子51、60页原文</p>	<p>急性=甲肝戊肝=消化道</p>	<p>原文押中</p>

<p>饮食史。查体：T 38C，巩膜黄染，肝肋下 1.5Cm，触叩痛(+)，脾肋下未触及。实验室检查：血 WBC 8.5 x 10⁹/L，N 0.54，L 0.46，ALT 1850U/L，TBil 96 umol/L，DBil 63 umol/L。</p> <p>129. 首先考虑的诊断是</p> <p>A. 急性病毒性肝炎 B. 沙门菌感染 C. 急性胆囊炎 D. 肾综合征出血热 E. 伤寒</p> <p>130. 为明确诊断首选的检查是</p> <p>A. 血培养 B. 肥达反应 C. 粪便培养 D. 出血热抗体检测 E. 血清肝炎病毒标志物</p>	<p>急性肝炎：起病急，相关表现，如过去无肝炎病史者，应首先考虑为甲型或戊型肝炎的诊断。普通型点状坏死/气球样变重重大块坏死</p> <p>消化道传播→甲肝戊肝 输血传播→乙丙丁肝</p>		
<p>(131~132 题共用题干)</p> <p>男，18 岁。反复左侧腰部胀痛 3 年余。B 超见左肾重度积水，左输尿管显示不清。总肾功能正常，尿常规：RBC(—)，WBC5~10/HP。IVU 检查示左肾显影不清晰，右肾正常。</p> <p>131. 为明确病变的部位，最常用的检查方法是</p> <p>A. KUB B. 放射性核素肾显像 C. B 超 D. 逆行肾盂造影 E. CT 平扫</p> <p>132. 有效的治疗方法是</p> <p>A. 抗感染治疗 B. 肾盂输尿管成形 C. 继续观察 D. 放置输尿管支架引流 E. 左肾造瘘</p>		<p>病理检查、微生物检查、形态学检查通常是确诊的首选，是考试潜规则，是常见套路</p>	<p>讲解押中 智商推理</p>
<p>(133~134 题共用题干)</p> <p>男，45 岁。发现颈部肿物 3 个月，无不适，无结核病史。查体：左颈部外侧中部有肿块，2.5 Cm 大小，活动，无压痛，甲状腺未触及结节。</p> <p>133. 对该患者确诊最有意义的检查是</p> <p>A. MRI 检查 B. PPD 试验 C. B 超检查 D. CT 检查 E. 细针穿刺细胞学检查</p> <p>134. 若以上的检查方法未能明确诊断，而肿块仍在增大，其进一步的检查是</p> <p>A. 用抗生素治疗、观察 B. 肿瘤标记物检查 C. 肿块切除活检 D. 复查 MRI E. 同位素扫描</p>		<p>病理检查、微生物检查、形态学检查通常是确诊的首选，是考试潜规则，是常见套路</p>	<p>讲解押中 智商推理</p>

<p>(135~136 题共用备选答案)</p> <p>A. 微小病变肾病 B. 新月体性肾小球肾炎 C. IgA 肾病 D. 毛细血管内增生性肾小球肾炎 E. 膜性肾病</p> <p>135. 链球菌感染后急性肾小球肾炎的病理类型为 D 136. 儿童原发性肾病综合征最常见的类型为 A</p>	<p>小册子 52 页原文</p> <p>【急性（血管内/大红） 急进性（大白） 肾病综合症/隐匿性（系膜增生）】</p> <p>【肾病综合症 大白肾（膜性肾炎/钉状突起）系膜增生/膜性增生(分层双轨)/ 局灶性节段性肾小球硬化/微小病变性肾小球肾炎】</p>		<p>原文押中</p>
<p>(137~138 题共用备选答案)</p> <p>A. 食管胃底静脉曲张破裂 B. 急性胃黏膜病变出血 C. 胃癌出血 D. 胃溃疡出血 E. 十二指肠出血</p> <p>137. 女，32 岁。大量呕血 1 天。伴恶心，之后出现黑便。既往有饥饿性上腹痛，伴烧心、反酸，进食后可缓解。最可能的诊断是 E 138. 男，36 岁。车祸致胸腹复合伤 4 天，呕血 1 天，共 3 次，每次约 50~100ml。呕血前无不适症状。既往无腹痛史。呕血的原因是 B</p>	<p>小册子 7 页原文</p> <p>急性糜烂出血性胃炎的常见病因包括非甾体抗炎药（抑制前列腺素合成）、应激等</p>	<p>上午十点的故事</p>	<p>讲解押中 原文押中</p>
<p>(139~140 题共用备选答案)</p> <p>A. 链霉素 B. 青霉素 C. 氯霉素 D. 环丙沙星 E. 四环素</p> <p>139. 伤寒治疗首选 D 140. 钩端螺旋体病治疗首选 B</p>	<p>小册子 19 页原文</p> <p>【喹诺酮类+稽留热+再燃+血培养+肝脾肥大+ TO +WBC 低+玫瑰疹+肠出血穿孔=伤寒】</p> <p>【腓肠肌疼痛+青霉素+赫氏反应+显凝试验=钩端螺旋体】</p>		<p>原文押中</p>
<p>(141~142 题共用备选答案)</p> <p>A. 小肠肿瘤 B. 克罗恩病 C. 溃疡性结肠炎 D. 降结肠癌 E. 升结肠癌</p> <p>141. 男，62 岁。腹胀、右下腹部隐痛 6 个月。阵发性隐痛，乏力，消瘦，近 3 个月贫血，首先应考虑的诊断是 E 142. 女，24 岁。腹痛、腹泻，便秘交替 2 年。便无脓血和黏液。近 1 年来消瘦、乏力、贫血。下午有时低热。首先考虑的诊断是 B</p>		<p>141 老年人胃肠道原因出血、贫血首先考虑肿瘤</p> <p>142 漫画讲解</p>	<p>讲解押中</p>
<p>(143~144 题共用备选答案)</p> <p>A. 动脉硬化性闭塞症</p>	<p>小册子 35、68 页原文</p>	<p>深静脉血栓</p>	<p>原文押中</p>

<p>B. 雷诺综合征 C. 下肢深静脉血栓形成 D. 血栓闭塞性脉管炎 E. 单纯性下肢静脉曲张 143. 可通过高位结扎及剥脱术治疗的疾病是 E 144 可出现 HomAns 征阳性的疾病是 C</p>	<p>孕妇小腿深静脉血栓：霍曼氏征 (HomAns) 即直腿伸踝试验为阳性</p> <p>大隐静脉高位结扎加剥脱术后抬高患肢 30 度</p>		
<p>145~146 题共用备选答案) A. 膝关节 B. 肘关节 C. 前臂 D. 上臂 E. 大腿 145. 最容易发生骨筋膜室综合征的部位是 C 146. 最容易发生损伤性骨化的部位是 B</p>	<p>小册子 28 页原文 骨筋膜室综合征骨筋膜室内的肌肉、神经因急性缺血、缺氧而产生的一系列症状和体征。多见于前臂掌侧和小腿</p>	<p>创伤性骨化，多见在肘关节，由于骨膜剥离后，骨膜下血肿与软组织血肿相连，经机化、钙化、骨化，立即休息，停止被动性牵伸，在不痛的情况下允许作主动、轻缓活动锻炼，使活动范围逐渐恢复。</p>	<p>原文押中</p>
<p>(147~148 题共用备选答案)、 A. 睾丸鞘膜积液 B. 精索鞘膜积液 C. 交通性 鞘膜积液 D. 腹股沟斜疝 E. 睾丸肿瘤 147. 阴囊包块，透光试验阳性，平卧后消失，多见于 C 148. 阴囊包块，透光试验阴性，平卧后消失，多见于 D</p>	<p>小册子 24、31 页原文</p> <p>【睾丸积液：成人 婴儿型：精索部内环闭合 交通性/先天性：幼儿】</p> <p>鞘膜积液分型中睾丸鞘膜积液是最多见的一种：透光试验阳性可确定为积液，睾丸鞘膜积液阴囊内摸不到睾丸</p>	 <p>(1) 睾丸鞘膜积液 (2) 先天性鞘膜积液 (3) 婴儿型鞘膜积液 (4) 精索鞘膜积液</p>	<p>原文押中</p>
<p>(149~150 题共用备选答案) A. 苍白密螺旋体 B. 人乳头瘤病毒 C. 沙眼衣原体 D. 解脲支原体 E. 人免疫缺陷病毒 149. 梅毒的病原体是 A 150. 艾滋病的病原体是 E</p>		<p>原文 842 页 35. 能引起人畜共患病的病原体是 ◆ A. 梅毒螺旋体◆ 英文记忆 HIV: HumAn ImmunoDEfiCiEnCy Virus, 人免疫缺陷病毒</p>	<p>讲解押中</p>

2012 原文对照 第三单元

2012 原文对照 第三单元	中域 2012 年执业医师图书及押题命中详情		备注
	押题出处	考前视频讲解方法	
1. 临产后正常宫缩起自 A. 两侧宫角部 B. 两侧子宫侧壁 C. 宫颈部 D. 子宫下段 E. 宫底部		149. 处理不协调性子宫收缩乏力，正确的是。。。。 不协调性子宫收缩乏力（高张性子宫收缩乏力）：子宫收缩的极性倒置，宫缩不是起自两侧子宫角部	讲解押中
2. 导致新生儿胆红素生成过多的疾病是 A. 新生儿败血症 B. 先天性甲状腺功能减退症 C. 先天性胆道闭锁 D. 新生儿窒息 E. 胆汁粘稠综合征	小册子 1 页原文 以 结合胆红素增高 为主的黄疸：肝外胆管阻塞，肝内胆管阻塞， 肝内胆汁淤积 未结合胆红素生成过多：大量红细胞破坏，超过了肝细胞的处理能力- 溶血性黄疸	血红素变成胆色素 败血症红细胞破坏增加	原文押中

<p>3. 枕先露行阴道助产时，确定胎位除注意凶门外，可作为依据的颅缝是</p> <p>A. 额缝 B. 矢状缝 C. 冠状缝 D. 人字缝 E. 颞缝</p>		 <p>通过矢状缝及凶门确定胎位</p>	<p>讲解押中</p>
<p>4. 卵巢纤维瘤伴胸腹水形成称为</p> <p>A. MEniErE B. Down C. MEigs D. CusHing E. 类癌综合征</p>	<p>小册子3页原文 良性卵巢纤维瘤：伴有腹水或胸腔积液，称梅格斯综合征</p>		<p>原文押中</p>
<p>5. 婴幼儿时外界刺激不易在大脑皮层形成明确兴奋灶的原因是</p> <p>A. 树突、轴突少 B. 神经髓鞘形成和发育不完善 C. 神经元少 D. 神经元体积小 E. 树突轴突短</p>		<p>出生时神经细胞数目已与成人接近，但其树突和轴突少而短。神经髓鞘形成不完善，因没有髓鞘的隔离，兴奋可传入邻近的神经纤维，不易形成兴奋灶；无髓鞘的神经传导速度也较缓慢，故易疲劳而进入睡眠状态</p>	<p>智商推理题</p>
<p>6. 成年患者输注1单位红细胞估计可提高的血红蛋白数量是</p> <p>A. 3 B. 1 C. 10 D. 7 E. 5</p>		<p>以人体正常男性血红蛋白为120g/L，那么每输1个单位悬浮红细胞（200ml）/袋，血红蛋白上升5 g/L $120 \times (200/4000) = 6g$- 代谢掉的红细胞$\approx 5$</p>	<p>智商推理题</p>
<p>7. 用口服葡萄糖耐量试验诊断糖尿病标准，其2小时血糖应</p> <p>A. 11. 1 B. 12. 1 C. 10. 1 D. 7. 8 E. 7.</p>	<p>小册子16页原文 典型糖尿病症状：空腹血糖$\geq 7. 0$ mmol/L / 随机血糖$\geq 11. 1$ mmol/L / 2H OGTT$\geq 11. 1$ mmol/L；糖化血红蛋白A1C水平$\geq 6. 5\%$</p>		<p>原文押中</p>
<p>8. 最易并发维生素A缺乏症的是</p> <p>A. 幼儿急疹 B. 麻疹</p>		<p>麻疹发病与维生素A的缺乏有重要关系</p>	

C. 川崎病 D. 风疹 E. 咽结合膜热		胡萝卜炖脂肪肝的故事	
9 在治疗希恩综合征的过程中，单独使用可诱发垂体危象的是 A. 雌激素 B. 孕激素 C. 氢化可的松 D. 生长激素 E. 左旋甲状腺素钠	小册子 45 页原文 席汉氏综合征 ：子宫萎缩，继发闭经，出现最早产后 无乳汁分泌 。	产后大出血导致产后席汉综合征，垂体前叶功能萎缩，机体代谢降低 应激及药物可诱发垂体危象：高热型；低温型；低血糖型；低血压、循环虚脱型；水中毒型；混合型。	智商推理题
10. 用于类风湿关节炎治疗的改变病情抗风湿药联合治疗方案是 A. 甲氨蝶呤+来氟米特 B. 双氯芬酸钠+来氟米特 C. 甲氨蝶呤+硫酸氨基葡萄糖 D. 对乙酰氨基酚+硫酸氨基葡萄糖 E. 双氯芬酸黄+强的松	小册子 18 页原文 类风湿首选 慢作用药加 NSAID 慢作用抗风湿药 目前主张诊断明确 RA 后 尽早选用本类药物，常用药物有甲氨蝶呤 (MTX) 非甾体抗炎药：阿司匹林、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、布洛芬	来氟米特通过影响活化 淋巴细胞 的嘧啶合成，具有抗炎作用。	原文押中
11. 不属于风湿热诊断标准中主要表现的 A. 关节痛 B. 舞蹈病 C. 皮下小结 D. 环形红斑 E. 心脏炎	小册子 39 页原文 表格+记忆方法 【阿 (A 组) 姨 (乙型) 主要会跳舞有形体 (态) 变化，会发言 (炎)】		原文押中
12 不属于中毒型细菌性痢疾临床特征的是 A. 起病时肠道症状可不明显 B. 迅速发生休克与呼吸衰竭 C. 均有脑膜刺激征 D. 多见于 2-7 岁儿童 E. 急起高热，反复惊厥	小册子 39 页原文 中毒型菌痢 多见于 2~7 岁儿童，病死率高，我国以福氏志贺菌多见	儿童疾病表现不典型，如阑尾炎和菌痢 儿童高烧昏迷要想到中毒性菌痢 绝对的通常不对	原文押中
13 子宫内膜癌的高危因素不包括 A. 不孕症 B. 卵巢早衰 C. 肥胖 D. 无排卵性功能失调性子宫出血 E. 血糖尿病	小册子 36 页原文 月经量过多：子宫肌瘤，子宫内膜异位症，黄体萎缩不全，排卵/无排卵性功血 停经后流血：葡萄胎，绒癌 绝经后出血：子宫内膜癌	雌激素依赖型子宫内膜癌 (I 型) 的发病可能与 无孕激素 拮抗致子宫内膜增生有关。 肥胖、糖尿病与高血压常并存称“子宫内膜癌三联征” 非雌激素依赖型 (II 型)	原文押中
14. 衡量一个国家医疗卫生水平的重要指标是 A. 胎儿期死亡率 B. 围生期死亡率 C. 新生儿期死亡率 D. 婴儿死亡率	小册子 37 页原文 围产期产后 1 周 (龄满 28 周) (体重		原文押中

E. 幼儿期死亡率	≥1000g) 死亡率高		
15. 用药物可能治愈的先天性心脏病是 A. 法洛四联症 B. 动脉导管未闭 C. 房间隔缺损 D. 室间隔缺损 E. 大血管部分转位		早产儿动脉导管未闭, 可用消炎痛或阿斯匹林, 以抑制前列腺素合成, 使导管闭合。	讲解押中
16. 支持重型再生障碍性贫血诊断的是 A. 网织红细胞绝对值 18*10 ⁹ B. 血小板计数 10*10 ⁹ C. 中性粒细胞计数 1.0*10 ⁹ D. 中性粒细胞碱性磷酸本科积分减低 E. 骨髓全片见巨核细胞 8 个	小册子 12 页原文 急性再障发病急 , 常伴有 严重感染及内脏出血, 病情重 , 进展迅速。 三系减少, 尤其是巨核细胞系, 其数量一定是减少的		原文押中
17. 希恩综合征属于 A. 下丘脑性闭经 B. 精神性闭经 C. 子宫性闭经 D. 卵巢性闭经 E. 垂体性闭经	小册子 45 页原文 席汉氏综合征 : 子宫萎缩, 继发闭经, 出现 最早产后无乳汁分泌 。	产后大出血导致产后席汉综合症, 垂体前叶功能萎缩, 机体代谢降低	原文押中
18. 产后出血最常见的原因是 A. 胎盘植入 B. 血小板减少 C. 子宫收缩乏力 D. 胎盘嵌顿 E. 胎盘粘连	小册子 35 页原文 引起产后出血最常见的原因是 子宫收缩乏力		原文押中
19. 关于风湿性疾病的概念, 说法正确的是 A. 风湿性疾病就是自身免疫性疾病 B. 风湿性疾病就是指风湿性关切和类风湿性关节炎 C. 结缔组织病是风湿性疾病的一部分 D. 风湿性疾病是结缔组织病的一部分 E. 风湿性疾病就是结缔组织病	小册子 35 页原文 风湿性疾病 是一组肌肉骨骼系统疾病, 分为: ① ConnECTivE TissuE DisEAsE CTD② 脊柱关节病如: 强直性脊柱炎(AS)、 REiTEr 综合征 。。。。		原文押中



<p>20. 第一产程活跃期的减速期是指宫口扩张</p> <p>A. 8-10 B. 3-10 C. 7-10 D. 5-10 E. 9-10</p>	<p>小册子 35 页原图</p>		<p>原文押中</p>
<p>21. 女性垂体泌乳素瘤的典型临床表现是</p> <p>A. 持续泌乳及头痛 B. 视野缺损和视力下降 C. 月经稀发 D. 体重增加并糖耐量减低 E. 闭经泌乳</p>	<p>小册子 45 页原文</p> <p>溴隐亭治疗泌乳素瘤及肢端肥大症，赛庚啶和酮康唑治疗皮质醇增多症等【定康】</p>	<p>女性内分泌失调常表现为闭经</p>	<p>讲解押中</p>
<p>22. 不支持慢性粒细胞白血病加速期的血常规检查结果是</p> <p>A. 外周血嗜碱性粒细胞大于 20% B. 血小板进行性减少 C. 血小板增高 D. 血红蛋白逐渐下降 E. 外周血原始粒细胞 < 10%</p>	<p>小册子 13 页原文</p> <p>加速期：嗜碱粒细胞数 > 20%，血或骨髓原粒加早幼粒细胞 > 10%</p>		<p>原文押中</p>
<p>23. 苯丙酮尿症主要的神经系统危害是</p> <p>A. 智能发育落后 B. 肌痉挛 C. 癫痫小发作 D. 行为落后 E. 多动</p>	<p>小册子 39 页原文</p> <p>【笨笨+皮肤细腻，通贯掌=三体笨笨+鼠尿=苯丙酮尿症 笨笨+皮肤粗糙=甲低】</p>		<p>原文押中</p>
<p>25. 过期妊娠需立即终止妊娠的指征是</p> <p>A. 尿雌激素/肌酐比值为 16 B. B 超显示羊水指数 6Cm C. 三度羊水粪染 D. 无应激试验为反应型 E. 12 小时胎动为 15 次</p>	<p>小册子 33、35 页原文</p> <p>B 超检查：羊水平段正常范围是 30-70mm，低于 30mm 为羊水过少</p> <p>羊水污染程度分 III 度，I 度羊水浅绿色，II 度羊水深绿色或黄绿色，III 度羊水棕黄色、稠厚。</p>	<p>12 小时内胎动累计数少于 10 尿雌三醇与肌酐(E/C) < 10</p>	<p>原文押中</p>
<p>26. 最常见的女性不孕因素是</p> <p>A. 宫体因素 B. 精神因素 C. 阴道因素 D. 输卵管因素 E. 宫颈因素</p>		<p>卵子拱拱拱的故事</p>	<p>讲解押中</p>
<p>27. 与散发性先天性甲状腺功能减低症病因无关的是</p>		<p>先天性甲状腺功能减低主要包</p>	<p>智商推理</p>

<p>A. 促甲状腺激素不足 B. 甲状腺发育不全 C. 甲状腺激素合成障碍 D. 甲状腺异位 E. 碘缺乏</p>		<p>括：散发性先天性甲低和地方性先天性甲低</p>																																			
<p>28. 诊断胎儿遗传性疾病，准确性较差的产前诊断技术是 A. 孕妇血提取胎儿细胞 B. 羊水穿刺 C. 胎儿镜下活检 D. 经皮脐血穿刺技术 E. 绒毛穿刺取样</p>			<p>智商推理</p>																																		
<p>29. 初产妇第一产程活跃期延长是指活跃期超过 A. 8小时 B. 12小时 C. 10小时 D. 4小时 E. 6小时</p>	<p>小册子 34 页原文 潜伏期延长：宫口临产到 3Cm, >16 小时。活跃期延长：宫口>3Cm, >8 小时 活跃期停滞：不扩>2 小时</p>		<p>原文押中</p>																																		
<p>30. 臀先露孕妇于妊娠 26 周来院就诊，应采取的处理措施是 A. 内转胎位术 B. 暂不需处理 C. 左侧卧位 D. 外转胎位术 E. 胸膝卧位</p>		<p>妊娠 30 周以前，臀先露较多见，妊娠 30 周以后多能自然转成头先露。 若妊娠 30 周后仍为臀先露应予以矫正(1)胸膝卧位(2)外转胎位术</p>	<p>讲解押中</p>																																		
<p>31. BisHop 宫颈成熟度评分得 2 分的是 A. 宫口开大 4 厘米 B. 先露位置-2 C. 宫颈管消退 80% D. 宫口位置后方 E. 宫颈中等硬度</p>	<p style="text-align: center;">表1 Bishop 宫颈成熟度评分法</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">指 标</th> <th colspan="4">评 分</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宫口开大(cm)</td> <td>0</td> <td>1~2</td> <td>3~4</td> <td>5~6</td> </tr> <tr> <td>宫颈管消退(%)</td> <td>0~30</td> <td>40~50</td> <td>60~70</td> <td>80~100</td> </tr> <tr> <td>先露位置(坐骨棘水平=0)</td> <td>-3</td> <td>-2</td> <td>-1~0</td> <td>+1~+2</td> </tr> <tr> <td>宫颈硬度</td> <td>硬</td> <td>中</td> <td>软</td> <td></td> </tr> <tr> <td>宫口位置</td> <td>后</td> <td>中</td> <td>前</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			指 标	评 分				0	1	2	3	宫口开大(cm)	0	1~2	3~4	5~6	宫颈管消退(%)	0~30	40~50	60~70	80~100	先露位置(坐骨棘水平=0)	-3	-2	-1~0	+1~+2	宫颈硬度	硬	中	软		宫口位置	后	中	前	
指 标	评 分																																				
	0	1	2	3																																	
宫口开大(cm)	0	1~2	3~4	5~6																																	
宫颈管消退(%)	0~30	40~50	60~70	80~100																																	
先露位置(坐骨棘水平=0)	-3	-2	-1~0	+1~+2																																	
宫颈硬度	硬	中	软																																		
宫口位置	后	中	前																																		
<p>32. 新生儿寒冷损伤综合征患儿复温后，维持正常体温的治疗关键是 A. 补充热卡 B. 抗感染治疗 C. 改善微循环 D. 正压通气给氧 E. 纠正代谢紊乱</p>	<p>小册子 34 页原文 新生儿硬肿症，体温<35℃，重度<30℃ 硬肿小腿→大腿→整个下肢→臀部→面颊→上肢→全身。重度肤硬肿范围>50%</p>	<p>寒冷损伤后，渐近复温，补充热量 饥寒交迫</p>	<p>智商推理</p>																																		

<p>33. 重症一氧化碳中毒患者的最有效的治疗措施是</p> <p>A. 鼻导管间断低流量吸氧 B. 高压氧舱治疗</p> <p>C. 吸入纯氧鼻导管 D. 持续低流量</p> <p>E. 吸氧面罩吸氧</p>	<p>内科 1258. 治疗重度一氧化碳中毒首选的氧疗是◆</p> <p>A. 鼻导管吸氧◆ B. 呼吸新鲜空气</p> <p>C. 人工呼吸◆ D. 面罩吸氧</p> <p>E. 高压氧舱◆答案: E◆</p>		<p>原题押中</p>
<p>34. 绒毛膜癌常见的转移部位依次是</p> <p>A. 肺、盆腔、肝、脑、阴道</p> <p>B. 肺、阴道、盆腔、肝、脑</p> <p>C. 肺、脑、盆腔、肝、阴道</p> <p>D. 阴道、肺、盆腔、肝、脑</p> <p>E. 肺、肝、阴道、盆腔、脑</p>	<p>小册子 36 页原文</p> <p>绒毛膜癌, 约 50%发生于葡萄胎后。绒癌无绒毛, 常见肺转移 绒癌常继发于葡萄胎后半年以上, 转移广, 潜伏期长, 来源广, 无绒毛+无间质细胞</p>	<p>血转移: 进入静脉体循环跑到肺</p> <p>邻近组织转移排第二</p>	<p>智商推理题</p>
<p>35. 结核性脑膜炎, 抗结核强化治疗治疗阶段应选择</p> <p>A. 异烟肼+利福平+吡嗪酰胺</p> <p>B. 异烟肼+利福平+乙胺丁醇</p> <p>C. 异烟肼+利福平+链霉素</p> <p>D. 异烟肼+利福平+链霉素+吡嗪酰胺</p> <p>E. 异烟肼+利福平+链霉素+乙胺丁醇</p>	<p>小册子 3 页原文</p> <p>杀菌药: 异烟肼(DNA) 和利福平(RNA), 链霉素(蛋白质) 和吡嗪酰胺(细胞内)</p> <p>短程化疗, 联用 INH、RFP、PZA 为基础 全部为杀菌药</p>		<p>原文押中</p>
<p>36. 子宫内膜癌已累及宫颈间质, 其分期应为</p> <p>A. I B 期</p> <p>B. III 期</p> <p>C. I A 期</p> <p>D. II 期</p> <p>E. IV 期</p>	<p>小册子 35 页原文</p> <p>子宫内膜癌腺癌最常见 老年: 不规则流血 I 期肌层 II 期宫颈 III 期近处 IV 期远处转移</p> <p>II A 期是指累及宫颈粘膜腺体 II B 期是 侵犯宫颈间质</p>		<p>原文押中</p>
<p>37. 高白细胞性白血病的白细胞数量最低限是</p> <p>A. $150 \times 10^9/L$</p> <p>B. $80 \times 10^9/L$</p> <p>C. $200 \times 10^9/L$</p> <p>D. $100 \times 10^9/L$</p> <p>E. $50 \times 10^9/L$</p>		<p>高白细胞性白血病是血液科急危重症。指在少数急性白血病出诊或者慢性粒细胞白血病急变时, 外周血白细胞计数大于 $100 \times 10^9/升$。</p>	
<p>38. 血管壁异常所致出血的特点是</p> <p>A. 内脏出血 B. 迟发出血</p> <p>C. 皮肤黏膜出血 D. 关节腔出血 E. 肌肉出血</p>	<p>小册子 35 页原文</p> <p>【过敏性=束臂试验+血管壁功能异常+略高出皮面+激素】</p>		<p>原文押中</p>

<p>39. 疑为维生素 D 缺乏性手足搐搦症做陶瑟征检查时, 袖带的压力应维持在</p> <p>A. 舒张压以下 B. 收缩压与舒张压之间 C. 收缩压以下 D. 舒张压以上 E. 收缩压以上</p>	<p>小册子 38 页原文 陶瑟征(Trousseau 征): 以血压计袖带包裹上臂, 使血压维持在收缩压与舒张压之间, 5 分钟内该手出现痉挛为阳性</p>		<p>原文押中</p>
<p>40. 肾性与中枢性尿崩症的鉴别方法是</p> <p>A. 禁水(禁饮)试验 B. 测定尿渗透压和血钠 C. 测定尿渗透压和比重 D. 测定血浆和尿渗透压 E. 加压素试验</p>	<p>小册子 15 页原文 尿渗透压降低常见于中枢性尿崩症, 禁水试验不能将低尿渗透压和尿比重升高</p>	<p>该题选加压实验, 如果是说与饮水性多尿就选禁水 肾性尿崩症: 肾小管对水重吸收功能障碍的疾病, 表现为多尿、烦渴及持续性低张尿, 病因可为遗传性和继发性</p>	<p>原文押中</p>
<p>41. 为预防营养性维生素 D 缺乏佝偻病, 小儿每日口服维生素 D 的课题是</p> <p>A. 1600-2000IU B. 400-800 C. 1300-1500 D. 200-300 E. 900-1200</p>	<p>小册子 38 页原文 四个八四, 生后 2 周维生素 D 800U 和 400U, 皮下脂肪厚度 0.8~0.4cm</p>		<p>原文押中</p>
<p>42. 先天性巨结肠最常见的并发症是</p> <p>A. 肠梗阻 B. 败血症 C. 营养不良 D. 小肠结肠炎 E. 肠穿孔</p>		<p>先天性巨结肠(无神经节细胞症), 以便秘为特点, 病变肠段神经节细胞缺失 流水不腐</p>	<p>智商推理题</p>
<p>43. 小儿重症肺炎出现严重腹胀, 最可能的原因是</p> <p>A. 低钙血症 B. 消化不良 C. 低钾血症 D. 低钠血症 E. 中毒性肠麻痹</p>	<p>小册子 40 页原文 常小于 6 月: 支气管肺炎: 婴幼儿极高发, 肺炎链球菌, 常合并心衰, 中毒性脑病、肠麻痹</p>		<p>原文押中</p>
<p>44. 巨大胎儿经阴道分娩的常见并发症不包括</p> <p>A. 产程延长 B. 产后出血 C. 肩难产 D. 头盆不称 E. 羊水栓塞</p>	<p>小册子 50 页原文 栓塞伴 DIC——羊水栓塞</p>	<p>羊水栓塞多发生在产时或破膜时, 多见于足月产, 宫缩过强+胎膜破裂时, 多有胎膜早破史; 胎盘早期、前置胎盘</p>	<p>智商推理题</p>
<p>45. 腺病毒肺炎最易出现的并发症是</p> <p>A. 张力性气胸 B. 心力衰竭 C. 肺脓肿 D. 肺大泡 E. 脓气胸, 脓胸</p>	<p>小册子 40 页原文 喘憋、上感, 腺病毒除引起上呼吸道感染外, 还可引致小儿肺炎, 多见于 6 个月至 2 岁的婴幼儿, 尤以北方各</p>		<p>原文押中</p>

	省多见，高烧，憋喘，常合并心衰		
46. 外阴鳞状上皮增生局部治疗的主要药物是 A. 雌激素 B. 糖皮质激素 C. 抗病毒药物 D. 雄激素 E. 抗生素		鳞状上皮细胞增生是以外阴瘙痒为主要症状但病因不明的外阴疾病 皮肤病药物基本都含激素	智商推理题
47. 维持阴道正常酸性环境的主要菌群是 A. 葡萄球菌 B. 肠球菌 C. 大肠埃希菌 D. 乳杆菌 E. 棒状杆菌	小册子 35 页原文 细菌性阴道病：乳酸杆菌减少；加德纳尔菌等增加		原文押中
48. 婴儿百白破的基础免疫时间为产后 A. 第 3、4、5 个月 B. 第 4、5、6 个月 C. 第 5、6、7 个月 D. 第 2、3、4 个月 E. 第 1、2、3 个月	小册子 37 页原文 1238（麻疹） 12310（骨化中心） 123（小儿哮喘打分）	1238（麻疹） 一个月：乙肝与结核 2 个月，两个字，糖丸 3 个月，三个字，百白破、 8 个月，麻疹	原文押中
49. 有助于确定新生儿缺氧缺血性脑病损害严重程度和判断预后的检首选 A. 脑氢质子磁共振波谱 B. 头颅 CT C. 头颅 MRI D. 脑电图 E. 颅脑超声检查		脑电图主要用于 癫痫、脑外伤、脑肿瘤 等疾病的诊断。 脑血管病 的脑电图，尽管无特异性改变，但对 诊断和预后 的判断，以及与脑肿瘤的鉴别仍十分有意义	
50. 小儿肾病综合征最常见的并发症是 A. 低钠血症 B. 感染 C. 低钾血症 D. 肾静脉血栓形成 E 低钙血症	小册子 10 页原文 肾病综合征最常见的并发症为 呼吸道感染		原文押中
51. 经产妇，足月活胎可经阴道娩出的胎位是 A. 枕右后位 B. 肩左后位 C. 肩右后位 D. 颞左后位 E. 颞右后位	小册子 34 页原图		原图押中

		
<p>52. 女, 24 岁, 月经稀发 2 年, 闭经半年, 溢乳 3 个月, 对诊断最有价值的测定项目是</p> <p>A. HCG B. 雄激素 C. 雌激素 D. 孕激素 E. PRL</p>	<p>小册子 45 页原文 溴隐亭治疗泌乳素瘤及肢端肥大症, 赛庚啶和酮康唑治疗皮质醇增多症等【定康】</p>	<p>女性内分泌失调常表现为泌乳闭经</p> <p>讲解押中</p>
<p>53. 女, 13 岁, 因水肿 3 天, 剧烈头痛, 呕吐 2 天入院。2 周前曾发热, 咽痛, 查体: P110, BP170/120, 双肺无异常, HB110, 尿常规: 蛋白(++), RBC30-50/HP, 尿比重 1.020, 血尿素氮 9.4, 最可能的诊断是</p> <p>A. 急性肾小球肾炎并严重循环充血 B. 急进性肾小球肾炎 C. 急性肾小球肾炎并高血压脑病 D. 急性肾小球肾炎并急性肾功能不全 E. 急性肾小球肾炎</p>	<p>小册子 9 页原文</p> <p>急性肾小球肾炎多发于儿童, 严重症状通常于前驱感染后 1~2 周内发生, 轻者呈亚临床型(仅有尿常规及血清 C3 异常), 重者可发生急性肾衰竭。本病大多有自愈倾向。几乎所有患者均有肾小球源性血尿, 镜下血尿, 蛋白尿。</p>	<p>血尿素氮正常 <7, >10 代表失代偿期, >20 为肾衰</p> <p>原文押中</p>
<p>54. 小儿诊断为易位型 21-三体综合征, 其母亲为 D/G 平衡易位, 则第二胎的风险率为</p> <p>A. 10% B. 20% C. 15% D. 100% E. 50%</p>	<p>小册子 38 页原文 标准型 47, XX(或 XY), +21. 易位型: D / G 易位, 最常见: 46, XX(或 XY), -14, +T(14q 21q) 讲解: 平衡易位携带者: 如母方为 D / G 易位每胎都 10% 风险, 父方为 3-5% 男女概率不是 50%</p>	 <p>原文押中</p>

<p>55. 女, 18 岁, 下腹疼痛 2 个月, 盆腔盆腔 B 超检查子宫大小正常, 左侧宫旁探及 6*5*3 厘米大小肿物, 边界清, 血清 AFP 900ug/L, 最可能的诊断是</p> <p>A. 卵巢畸胎瘤 B. 卵巢内胚窦瘤</p> <p>C. 卵巢颗粒细胞瘤 D. 卵巢卵泡膜细胞瘤</p> <p>E. 卵巢无性细胞瘤</p>	<p>小册子 38 页原文</p> <p>生殖细胞: 未分化无性细胞瘤 (放疗效果好)、畸胎瘤 (皮样囊肿, 易发生卵巢蒂扭转) 未成熟者恶性倾向; 胚外分化内胚窦瘤 (少女, 豆蔻年华)</p>		<p>原文押中</p>
<p>56. 男, 20 天, 面色苍白 7 天就诊, 血常规: HB50G/L。该患儿属于</p> <p>A. 中度贫血 B. 极重度贫血 C. 重度贫血</p> <p>D. 正常 E. 轻度贫血</p>	<p>小册子 67 页原文</p> <p>重度贫血 <60</p>	<p><30 属于极重度, 30-60 属于重度, 60-90 属于中度, 90-110 属于轻度。</p>	<p>原文押中</p>
<p>57. 女, 26 岁, 妊娠 8 周, 阵发性下腹痛 2 天, 阴道少量流血 5 小时, 为决定是否继续妊娠, 最有价值的辅助检查是</p> <p>A. 检测血清甲胎蛋白值 B. 尿妊娠试验</p> <p>C. 检测血清雌三醇值 D. B 超检查</p> <p>E. 检测血清雌二醇值</p>		<p>通过 B 超确定胚胎是否正常</p>	<p>智商推理题</p>
<p>58. 男, 10 岁, 因发热 7 天, 抗生素治疗无效入院, 查体: 球结膜充血, 口唇皲裂, 杨梅舌, 颈部淋巴结肿大, 全身可见多形性红斑。临床治愈出院 2 个月猝死于家中, 其最可能的死因是</p> <p>A. 心肌炎</p> <p>B. 脑栓塞</p> <p>C. 脑出血</p> <p>D. 心包炎</p> <p>E. 冠状动脉瘤破裂</p>		<p>儿童 川崎病 是一种血管炎综合症, 是小儿冠状动脉病变的主要原因, 表现多多样无特异, 患者可伴有持续高热, 一般 5 天以上, 咽炎手足脱皮, 多发性的红斑和颈部 淋巴结肿大, 双侧 结膜炎 等。</p>	
<p>59. 女, 66 岁, 手关节痛伴晨僵 3 年。查体: 双手近端和远端指间关节压痛, 无软组织肿胀, 远端指间关节变形, 可见多个 HEBErDEn 结节。化验: ESR22mm/H, 类风湿因子 22U/L (正常), 抗 CCP 抗体阴性。X 线片示远端指间关节半脱位。最可能的诊断是</p> <p>A. 强直性脊柱炎</p> <p>B. 骨关节炎</p> <p>C. 类风湿关节炎</p> <p>D. 风湿性关节炎</p>	<p>小册子 18 页原文</p> <p>骨性关节炎(OA) 进行性关节软骨变性、破坏, 年龄一般较大, 多在 40 岁后发病, 不能耐重。多数病例的病变限于膝关节; 髌关节, 远端指间关节, 关节活动弹响(骨摩擦音), 大关节为主。双手远端指间关节可见 HEBErDEn 结节、近端指间关节可</p>		<p>原文押中</p>

E. 银屑病关节炎	见 BounCHARd 结节。		
60. 女, 27 岁。发热 1 个月, 伴关节肿痛, 脱发和口腔溃疡。化验: 尿蛋白 (+++), 红细胞 20-30/HP。血 ANA (+)。最可能的诊断是 A. 系统性红斑狼疮 B. 类风湿关节炎 C. 干燥综合征 D. 风湿热 E. 成人斯蒂尔病	小册子 18 页原文 SLE 以青年女性生育龄妇女占病人的 90%~95% 因肾脏损伤造成尿毒症死亡是 SLE 的常见原因 1. ANA 95%(+), 但特异性低	斯蒂尔病是一种血清阴性的多关节炎, 为幼年类风湿关节炎的一种。	原文押中
61. 女, 25 天, 不明原因反复惊厥发作 3 次, 首选的止惊药物是 A. 地西洋 B. 苯巴比妥 C. 苯妥英钠 D. 异丙嗪 E. 硫喷妥钠	小册子 38 页原文 惊厥首选苯巴比妥钠		原文押中
62. 男, 40 岁, 发作性心悸, 头痛, 大汗, 发作时血压 230/130, 平素血压不高, 对诊断最有帮助的是发作时测定尿 A. 儿茶酚胺 B. 蛋白 C. 钾钠氯 D. 钙磷 E. 游离皮质醇	小册子 14 页原文 肾上腺髓质→嗜铬细胞瘤→分泌大量儿茶酚胺→继发性恶性高血压(视乳头水肿+舒张压大于 130)→哌唑嗪→阻滞外周血管 α1 受体	间隙性、反复性、阵发性高血压	原文押中
63. 女, 43 岁, 乏力, 厌食, 嗜睡 5 年, 逐渐加重 2 年, 20 年前产后大出血休克, 昏迷 7 小时, 产后闭经至今。具体治疗不详, 近 3 年多中断治疗。首选的治疗药物是 A. 雌激素 B. 血管加压素 C. 左旋甲状腺素钠 D. 肾上腺皮质激素 E. 孕激素	小册子 45 页原文 席汉氏综合征: 子宫萎缩, 继发闭经, 出现最早产后无乳汁分泌。	产后大出血导致产后席汉综合症, 垂体前叶功能萎缩, 机体代谢降低 激素替代治疗: 根据所缺乏的激素种类, 应用 甲状腺素 , 肾上腺皮质激素 , 雌激素 , 孕激素 等作为各种激素的替代	智商推理
64. 初产妇, 25 岁, 足月顺产后第 3 天, 纯母乳喂养。乳房胀痛, 无红肿, 乳汁排出不畅, 体温 37.6 度。恰当的处理方法是 A. 生麦芽煎服 B. 少喝水 C. 让新生儿吸吮双乳 D. 抗生素治疗		急性乳腺炎根本原因是涨奶, 考试反而常考放射样切口, 实际很少用, 主要是专业排乳师, 吸奶器或小儿把乳汁吸出就 OK 芒硝外敷主治: 实热积滞; 腹	讲解押中

E. 芒硝外敷用		胀便秘；丹毒；痈肿	
65. 男，6个月，患法洛三联症，因2天反复于哭闹时突然四肢抽搐，青紫加重，神智不清，呼吸急促，持续时间约2-3分钟，主要原因是 A. 脑栓塞 B. 肺动脉梗阻 C. 心力衰竭 D. 脑炎 E. 心包炎	小册子41页原文 【主动脉骑跨→肺动脉狭窄→右心室肥大→室间隔缺损→左心室肥大（靴型型）】	如何记忆四联症及五联症的故事	原文押中
66. 男，35岁，体重75KG，因外伤性股骨颈骨折第2次入院手术，患者一般状况良好，BP125/80，HB150G/L，血型鉴定为A型，抗体筛查发现存在多种红细胞抗体，交叉配血试验无法配上相容性血液。若需输血，应考虑输血策略是 A. 输注其亲属的全血 B. 输注O型红细胞 C. 输注洗涤红细胞 D. 贮存式自身输血 E. 输注RH阴性红细胞			智商推理
67. 男，2岁，发热，流涕、咳嗽3天，今晨前额及耳后出现浅红色斑丘疹，球结膜充血，口腔黏膜粗糙，声音嘶哑，精神萎靡，两肺呼吸音粗，最可能的诊断是 A. 川崎病 B. 风疹 C. 猩红热 D. 幼儿急疹 E. 麻疹	小册子41页原文 麻疹病后的第2~3天，于第二磨牙相对应的颊黏膜处，可见麻疹黏膜斑（Koplik斑），为麻疹前驱期的特异性体征， 耳后-发际-颈部-额面-躯干-四肢		原文押中
68. 女，10岁。因发热15天，皮肤出现红斑，并伴有肝膝关节游走性疼痛入院。辅助检查：ASO长高。治愈，为防止复发，应至少肌内注射长效青霉素到 A. 15岁 B. 12 C. 11 D. 14 E. 13	小册子41页原文 对患过风湿热或已有风心病的患儿，应肌内注射长效青霉素 期限至少5年 ，最好持续至25岁，进行继发性预防。有风湿性心脏病者，宜作终身药物预防， 心肌炎时应早期使用肾上腺皮质激素		原文押中
69. 初孕妇，29岁，妊娠37周，今晨喷射性呕吐1次，1小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体：BP180/120，尿蛋白(+++)，该患者最可能的诊断是 A. 子痫 B. 脑出血 C. 癔症 D. 癫痫 E. 脑血栓形成		硫酸镁的故事	讲解押中

<p>70. 男, 5 个月, 母乳喂养, 腹泻 2 个月, 大便 5-6 次/天, 最可能的诊断是</p> <p>A. 迁徙性腹泻 B. 过敏性腹泻 C. 饮食性腹泻 D. 生理性腹泻 E. 感染性腹泻</p>	<p>小册子 41 页原文 小于 6 月生理性腹泻 小儿腹泻 发病率高的年龄组是 6 个月~2 岁</p>		原文押中
<p>71. 女, 22 岁, 头晕、呕吐伴流涎半小时。1 小时前曾少量饮酒并进食较多凉拌蔬菜。查体: P55 次/分, BP100/70, 神智清晰, 皮肤潮湿, 双瞳孔针尖样大小, 双下肺可闻及湿啰音。最可能的诊断是</p> <p>A. 亚硝酸盐中毒 B. 杀鼠药中毒 C. 吗啡中毒 D. 有机磷农药中毒 E. 乙醇中毒</p>		M 样作用、N 样作用的故事	讲解押中
<p>72. 女, 30 岁。乏力、头晕伴月经过多半年, 化验: HB60g/l, RBC3.1*10¹²/L, WBC 7.3*10⁹/L, 红细胞中心淡染区扩大, 该患者最可能的化验结果是</p> <p>A. 血清铁降低, 总铁结合力降低, 红细胞游离原卟啉降低 B. 血清铁降低, 总铁结合力降低, 红细胞游离原卟啉增高 C. 血清铁降低, 总铁结合力增高, 红细胞游离原卟啉增高 D. 血清铁增高, 总铁结合力增高, 红细胞游离原卟啉降低 E. 血清铁降低, 总铁结合力增高, 红细胞游离原卟啉降低</p>	<p>小册子 12 页原文 【库存铁=铁蛋白和含铁血黄素 快速铁=总铁结合力-转铁蛋白】 缺铁性贫血最常见的病因是慢性失血 红细胞中央淡染区大</p>	<p>快递的故事 快递和卟啉增高可增加铁の利用度</p>	原文押中
<p>73. 男, 1 个月, 出生体重 3.5KG, 呕吐 1 周, 生后 3 周左右开始溢乳, 逐日加重呈喷射性呕吐, 奶法带凝块, 不含胆汁。查体: 体重 3.5KG, 皮肤轻度黄染, 前囟稍凹, 心肺无异常, 上腹部蠕动波, 右季肋下肿块, 质较硬, 光滑, 移动, 最可能的原因是</p> <p>A. 喂养不当 B. 胃食管反流 C. 幽门痉挛 D. 先天性肥厚性幽门狭窄 E. 胃扭转</p>			智商推理题
<p>75. 女 25 岁。间断牙龈出血、皮肤瘀斑 2 个月, 反复发生口腔溃疡。查体: 双下肢和腹部散在瘀斑, 浅表淋巴结无肿大, 巩膜无黄染, 腹软, 肝肋下未及, 脾肋下刚可触及。化验: HB121g/l, WBC4.5*10⁹, PLT25*10⁹, 为除外继发免疫性血小板减少性紫癜, 最重要的检查是</p> <p>A. 血小板功能 B. 血小板抗体 C. 抗核抗体谱 D. 腹部 B 超 E. 胸部 X 线片</p>	<p>小册子 18 页原文 SLE 以青年女性生育龄妇女占病人的 90%~95% 因肾脏损伤造成尿毒症死亡是 SLE 的常见原因 1. ANA 95%(+), 但特异性低</p>	多系统损伤	原文押中
<p>76. 初孕妇, 26 岁, 妊娠 36 周, 恶心、呕吐进行性加重 5 天,</p>		早产是指妊娠不满 37 周分娩	智商推理题

<p>血丙氨酸氨基转移酶及血清胆红素明显增高，乙肝表面抗原(+) 该患者最佳的处理措施是</p> <p>A. 卧床休息，口服保肝药物，继续妊娠 B. 隔离，保肝治疗，继续妊娠，密切观察 C. 立即行剖宫产 D. 治疗1周，肝功能无明显好转终止妊娠 E. 积极治疗24小时后终止妊娠</p>		胎儿28周产出通常存活	
<p>77. 男，8岁，肾病综合征初治，体重25KG，泼尼松每次25MG，每天2次，治疗2周后，水肿消失，4周时尿蛋白转阴，此时判断该患儿疗效为</p> <p>A. 激素部分敏感 B. 激素依赖 C. 激素不耐受 D. 激素敏感 E. 激素耐药</p>	<p>小册子10页原文 糖皮质激素目前为止仍是首选药物，起始量要足，减撤药要慢，维持用药要久 糖皮质激素应用口服8周，必要时可延长至12周，缓慢减药，长期维持</p>		原文押中
<p>78. 已婚妇女，26岁，月经规律，停经60天，今晨出现一侧下腹部痛伴肛门坠胀感，血压90/60，该患者此时有诊断价值的体征是</p> <p>A. 子宫稍大变软 B. 腹肌紧张、 C. 宫颈举痛，后穹窿饱满 D. 双合诊黑加征(+) E. 腹部移动性浊音(-)</p>		<p>年轻女性突发下腹痛通常考异位妊娠和蒂扭转</p> <p>浙江主持人的故事</p> <p>胚胎组织流到盆腔子宫直肠窝</p>	讲解押中
<p>79. 女，40岁。肥胖、高血压、闭经2年。查体：BP160/90，向心性肥胖、脸圆。多血质外貌，腹部可见宽大紫纹，血糖11.8Mmol/l，该患者最可能的诊断是</p> <p>A. 库欣综合征 B. 糖尿病 C. 代谢综合征 D. 肥胖症 E. 高血压</p>	<p>小册子10页原文</p> <p>束状带→糖皮质激素→ACTH增多(最常见、Cushing病、低钾、两高一低+高糖、四多一少、大剂量地米试验)→Cushing综合征(小剂量地米试验不被抑制)</p>	鉴定肥胖的故事	原文押中
<p>80. 男1岁，发热、咳嗽3天，今日突然出现气促、呼吸困难，紫绀，面色苍白，心率增快达180次/分，两肺闻及粗湿啰音和哮鸣音，肝肋下3厘米。最可能合并的疾病是</p> <p>A. 急性心力衰竭 B. 艾森曼格综合征</p>		<p>小马驹及死人的故事</p> <p>Eisenmenger 艾森曼格综合征一词多用以指心室间隔缺损</p>	讲解押中

<p>C. 脓胸 D. 气胸 E. 心肌炎</p>		<p>合并肺动脉显著高压伴有右至左分流的病人</p>	
<p>81. 男, 40 岁。无痛性双侧颈部淋巴结进行性肿大伴发热半个月, 发病以来体温最高 37.5°C, 无盗汗, 体重无明显变化。查体: 双侧颈部各触及一个 2Cm×2Cm 大小淋巴结, 左腋窝一个 2Cm×2Cm 大小淋巴结, 活动, 无压痛。腹软, 肝脾肋下未触及: HB126g/L, WBC5.3×10⁹/L, 分类, P1T 155×10⁹/L。胸部 CT 未见淋巴大。右颈部淋巴结活检为弥漫性大 B 淋巴瘤。本例最可能的分期是</p> <p>A. I 期 A B. I 期 B C. II 期 A D. III 期 A E. II 期 B</p>	<p>小册子 10 页原文</p> <p>1 期: 一个淋巴结区 II 期: 横膈同一侧 III 期: 膈上下 IV 期: 累及肺、肝及骨髓 所有各期又可按患者有全身症状为 B 组, 无全身症状为 A 组</p>		<p>原文押中</p>
<p>82. 初孕妇, 32 岁, 妊娠 39 周, 规律宫缩 8 小时, 随后持续腹痛, 拒按, 无间歇期, 胎心音不清, 宫口开大 5 厘米, 胎头 S-1, 后囟位于 1 点处, 该患者最可能的诊断是</p> <p>A. 协调性宫缩乏力 B. 强直性子宫收缩 C. 先兆子宫破裂 D. 持续性枕后位 E. 宫颈扩张活跃期停滞</p>	<p>小册子 35 页原文</p> <p>不协调性宫缩乏力: 哌替啶(度冷丁)吗啡, 腹部持续疼痛、拒按 可出现胎儿宫内窘迫。</p>		<p>原文押中</p>
<p>83. 女, 60 岁, 阴道脱出物 3 个月。查体: 屏气用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外, 宫颈前唇有一溃疡。首选的治疗是</p> <p>A. 曼氏手术 B. 经阴道子宫全切术 C. 阴道纵隔形成术 D. 子宫托 E. 腹腔镜圆韧带缩短术</p>	<p>小册子 36 页原文</p> <p>子宫脱垂: I 度轻型为宫颈距处女膜缘 4Cm 内, 重型达膜缘 II 度轻型宫体仍在阴道内; 重型部分宫体脱出, III 度宫颈宫体全部脱出 子宫脱垂: 分娩损伤和产褥早期体力劳动为主因 MAnCHEsTEr 手术</p>	<p>MAnCHEsTEr 手术 (保留生育)</p>	<p>智商推理</p>
<p>84. 女, 25 岁, 活动后突然左下腹剧痛, 伴有恶心、呕吐, 月经规律, 末次月经为 8 天前, 妇科检查: 左侧附件区可触及拳头大小囊实性包块, 触痛, 推移后疼痛加剧, 首先考虑为</p> <p>A. 卵巢黄体破裂 B. 输卵管妊娠破裂 C. 急性盆腔炎 D. 急性阑尾炎 E. 卵巢囊肿蒂扭转</p>		<p>年轻女性突发下腹痛通常考异位妊娠和蒂扭转</p>	<p>讲解押中</p>
<p>85. 女, 48 岁。月经不规则 2 年余, 阴道不规则流血 20 天。查体: 中度贫血貌, 子宫略大, 稍软, 无压痛, 宫旁未触及异常,</p>	<p>小册子 36 页原文</p> <p>子宫颈癌 接触性出血</p>		<p>智商推理</p>

<p>为确定诊断，就首选的检查是</p> <p>A. 盆腔 CT 检查 B. 尿 HCG 测定 C. 分段诊刮 D. 盆腔 B 超 E. 阴道镜检查</p>	<p>月经量过多：子宫肌瘤，子宫内膜异位症，黄体萎缩不全，排卵/无排卵性功血 停经后流血：葡萄胎，绒癌 绝经后出血：子宫内膜癌 内膜癌分段刮宫确诊 I 期手术首选 晚期可【孕激素治疗】</p>		
<p>86. 女，1 岁，于 7 月就诊，腹泻，呕吐 3 天，大便每日 10 余次，量中等，蛋花汤样，有黏液，霉臭味。查体：精神稍萎靡，皮肤弹性差，哭泪少。粪常规检查发现少量白细胞。最可能的病原体是</p> <p>A. 致病性大肠埃希菌 B. 真菌 C. 铜绿假单胞菌 D. 轮状病毒 E. 痢疾杆菌</p>	<p>肠道致病性大肠埃希菌引起的中毒主要症状是发热、不适、呕吐、腹泻、粪便中有大量粘液但无血，有约 20% 患者由呼吸道症状，感染的症状通常比较严重。</p>	<p>儿科：163. 患儿，男，7 个月。因腹泻一天，发热 39℃ 于 9 月 13 日入院。查体：精神可，无明显脱水征，咽红，大便呈蛋花汤样，脂肪球 (+)。其引起腹泻的最可能病因是 ◆ ◆ C◎病毒性肠炎 ◆ 轮状病毒：秋冬季，水样或蛋花汤样，自限性</p>	<p>讲解押中</p>
<p>87. 女，40 岁。因患再生障碍性贫血入院治疗。既往曾多次输血。此时应考虑输注</p> <p>A. 浓缩红细胞 B. 去除白细胞的红细胞 C. 全血 D. 悬浮红细胞 E. 辐照红细胞</p>		<p>再障病程漫长，如长期多次输血，将对红细胞亚型、白细胞及血小板发生免疫反应，致使以后发生输血反应，并可增加感染疾病（特别是病毒性肝炎）的机会 成分输血较普遍，根据出血、感染等情况相应输血</p>	<p>智商推理</p>
<p>88. 小儿，体重 8KG，身高 68 厘米，会抬头，会独坐，会爬，不会站，萌牙 2 枚。为判断骨骼发育年龄，最有临床意义的 X 线拍片部位是</p> <p>A. 膝部 B. 左手指 C. 左手掌 D. 踝部</p>		<p>骨龄评估通常是对被测者的手部和腕部进行 X 光摄片，然后由医生根据拍得的 X 光片进行解读。测定骨龄的方法有简单计数法、图谱法、评分法和计算机骨龄评分系统等。 手腕骨发育图谱(G-P 图谱)</p>	

<p>E. 左手腕</p>		美国医考题	
<p>89. 女, 27 岁。妊娠 7 周行人工流产负压吸引术, 术者突觉“无底”感, 患者随即感觉下腹部剧烈疼痛, 伴恶心。心率 75 次/分。首先应考虑的诊断是</p> <p>A. 失血性休克 B. 流产不全 C. 羊水栓塞 D. 子宫穿孔 E. 人工流产综合反应</p>	<p>小册子 36 页原文</p> <p>人流并发症: 子宫穿孔 宫腔深度 14Cm 已超过子宫大小, 吸宫不全 人工流产综合征: 迷走牵张兴奋心率减慢, 静注阿托品</p>		原文押中
<p>90. 男, 3 岁。因发热 1 周伴手足硬性水肿住院。查体: 球结膜充血, 皮疹, 颈部淋巴结肿大。给予阿司匹林后体温正常, 后续阿司匹林治疗方案是</p> <p>A. 热退后 7 天开始逐渐减量, 维持 4 周 B. 热退后 15 天停药 C. 热退后 7 天停药 D. 热退后 3 天停药 E. 热退后 3 天开始逐渐减量, 维持 4 周</p>	<p>阿司匹林: 30-50mg/kg. D, 分 2-3 次服用, 热退后 3 天逐渐减量, 约两周左右减至每日 3-5mg/kg, 维持 6-8 周。如有冠状动脉病变, 应延长用药时间, 直至冠状动脉恢复正常。</p>	<p>儿童川崎病是一种血管炎综合症, 是小儿冠状动脉病变的主要原因, 表现多种多样无特异, 患者可伴有持续高热, 一般 5 天以上, 咽炎手足脱皮, 多发性的红斑和颈部淋巴结肿大, 双侧结膜炎等。</p>	
<p>91. 初孕妇, 25 岁, 妊娠 40 周, 规律宫缩 8 小时, 宫缩 45-50 秒/4-5 分, 心率 140, 枕左前位, 胎头双顶径 10 厘米, 先露 0, 宫口开大 2 厘米, 坐骨棘间径 9Cm, 该患者正确的处理是</p> <p>A. 剖宫产 B. 肌注哌替啶 C. 静脉滴注缩宫素 D. 继续观察产程进展 E. 静注 5%葡萄糖注射液</p>	<p>小册子 33 页原文</p> <p>出口横径: 坐骨结节间径 9CM 10 出口后矢状径: 坐骨结节间径中点至骶尖 8~9Cm 10 总和>15 正常 入口前后 (真结合径): 对角径 11CM, 骶耻外径 18~20 10/20 入口横径: 髂棘间 23~26 髂嵴间 25~28Cm。 25 双顶径>对角径坐骨棘间径: 剖宫产</p>	<p>中骨盆横径 坐骨棘间径正常值为 10Cm 坐骨切迹宽度: 中骨盆后矢状径, 其宽度是坐骨棘与骶骨下部间的距离, 正常 5Cm</p>	原文押中
<p>92. 男, 35 岁, 因胃癌入院手术, 输注红细胞 2 单位, 新鲜冰冻血浆, 在输血开始后 4 小时, 患者突然气急, 呼吸困难, 迅速出现呼吸困难, 迅速出现呼吸衰竭, T37° C, P98 次/分, R 28 次/分, 血压 120/70mmHg, 该患者出现的输血反应最可能的是</p> <p>A. 循环超负荷 B. 细菌性反应 C. 急性溶血反应</p>		<p>输血相关性急性肺损伤 (TRALI) 是临床输血并发的急性呼吸窘迫综合症, 描述为“过敏反应”、“变应性肺水肿”, 死亡率达 5%~25%。</p>	智商推理题

<p>D. 过敏反应 E. 输血相关急性肺损伤</p>			
<p>93. 女, 25 岁。3 个月来全身乏力伴四肢关节痛、脱发, 1Cm。化验: HB70g/L, N0. 72, L0. 25, M0. 03, PlT 135×10⁹/L。网织红细胞 0. 10, 尿蛋白(++), 血肌酐 93 μmol/L, 酸溶血试验阴性, 骨髓检查示增生明显活跃, 粒红比例倒置。最可能的诊断是</p> <p>A. 自身免疫性溶血性贫血 B. 骨髓增生异常综合征 C. 脾功能亢进 D. 肾性贫血 E. 阵发性睡眠性血红蛋白尿</p>	<p>小册子 12 页原文</p> <p>蔗糖水溶血试验、酸溶血试验(HAm 试验)及蛇毒因子溶血试验 是诊断阵发性睡眠性血红蛋白尿的重要依据。</p>	<p>MDS≈再障 是一组克隆性造血干细胞疾病, 其特征为血细胞减少, 髓系细胞一系或多系病态造血, 无效造血及高风险向白血病转化。HB<100g/L, 中性粒细胞绝对值(ANC)<1. 8×10⁹/L, 血小板(PLT)<100×10⁹/L</p>	<p>原文押中</p>
<p>94. 初产妇, 26 岁。妊娠 40 周, 规律宫缩 13 小时, 已破膜。产科检查: 枕左前位, 胎心率 92 次/分。宫口开全, 胎头 S+3。该患者正确的处理措施是</p> <p>A. 会阴侧切后产钳助娩 B. 吸氧、备血 C. 等待自然分娩 D. 会阴侧切后自然分娩 E. 行剖宫产</p>		<p>S+3/4, 胎心>120, 宫口开全: 产钳助娩 S+3/4, 胎心<120, 宫口开全: 剖宫产 S+3/4, 胎心<120, 宫口未开全: 剖宫产 S+3/4, 胎心>120, 宫口未开全: 继续观察</p>	<p>讲解押中</p>
<p>(95-97 题共用题干)</p> <p>男, 45 岁。体检发现空腹血糖 8mmol/L, 餐后 2H 血糖 13mmol/L, 血清甘油三酯 3. 5mmol/L, 低密度脂蛋白 3. 6mmol/L。无明显不适, 半年体重下降 10kg。查体: BP 160/100mmHg, BMI 28, 心肺腹查体无阳性发现</p> <p>95. 首选的降血糖药物是</p> <p>A. 阿卡波糖 B. 瑞格列奈 C. 罗格列酮 D. 二甲双胍 E. 格列苯脲</p> <p>96. 降血压首选的治疗药物是</p> <p>A. α 受体阻滞剂 B. 血管紧张素转换酶抑制剂</p>	<p>小册子 16、17 页原文</p> <p>糖尿病肾病 早期肾病应用血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)可减轻白蛋白尿</p> <p>双胍类药物 此类药物通过抑制肠道对葡萄糖吸收, 减少肝糖原异生, 促进糖的无氧酵解, 增加肌肉等外周组织对葡萄糖的摄取和利用而改善糖代谢。主要适用于肥胖或超重的 2 型糖尿病病人</p>	<p>高血症包括高胆固醇血症(>6)、高甘油三酯血症(>1. 7)及复合性高脂血症, 及低高密度脂蛋白血症(HDL-C<0. 91)【6 16 1】</p> <p>他汀类: 高胆固醇血症及冠心病</p> <p>贝特类: TG</p> <p>烟酸类, 多烯酸乙酯: 降低血清甘油三酯和总胆固醇</p>	<p>95、96 原文押中</p>

<p>C. 钙通道阻滞剂 D. 利尿剂 E. β 受体阻滞剂</p> <p>97. 该患者首选的调脂药物是 A. 他汀类 B. 多烯酸乙酯 C. 贝特类 D. 维生素E E. 烟酸类</p>			
<p>(98-99 题共用题干) 男, 25 岁。右膝关节和左足跟肿痛 4 周。曾有以下半夜腰痛病史 4 年。查体: 右膝肿胀压痛, 浮髌征阳性, 左侧“4”字征阳性, 左侧骶髂关节压痛, 左侧足跟肿胀压痛。</p> <p>98. 对诊断最有价值的检查是 A. 类风湿因子 B. 骶髂关节 X 线片 C. 抗 CCP 抗体 D. 右膝关节 X 线片 E. HLA-B27</p> <p>99. 化验回报: 类风湿因子和抗 CCP 抗体阴性, HLA-B27 阳性。右膝 X 线片正常; 骶髂关节 X 线片显示双侧髂骨边缘虫蚀样破坏。可采取的治疗措施是 A. 碳酸氢钠+苯溴马龙 B. 柳氮磺吡啶+关节内注射倍他米松 C. 氨基葡萄糖+双醋瑞因 D. 青霉素+甲氨蝶呤 E. 青霉素+阿奇霉素</p>	<p>小册子 17 页原文</p> <p>强直性脊柱炎 多见于青壮年男性, 以非对称性下肢大关节炎为主, 骶髂关节炎具典型的 X 线改变, 后期脊柱呈竹节样变。有家族史, 90% 以上患者 HLA—B27(+)。血清 RF 阴性。</p> <p>柳氮磺胺吡啶【氨基水杨酸制剂: 类风湿与克隆病、强柱】</p>		原文押中
<p>(100-102 题共用题干) 女, 8 岁。3 周前曾患脓疱病。水肿、少尿、肉眼血尿 3 天, BP 150/105mmHg。尿常规: 蛋白(+), 大量红细胞, 管型 1-2/HP。ASO 升高, 血沉增快, 血补体 C3 下降。</p> <p>100. 首选的降压药是 A. 卡托普利 B. 二氮嗪 C. 硝苯地平 D. 哌唑嗪 E. 硝普钠</p> <p>101. 应限制钠摄入量直到 A. 血沉正常 B. 尿常规正常 C. 水肿消退, 血压正常 D. 补体恢复正常</p>	<p>小册子 9 页原文</p> <p>急性肾小球肾炎多发于儿童, 严重症状通常于前驱感染后 1~2 周内发生,轻者呈亚临床型(仅有尿常规及血清 C3 异常), 重者可发生急性肾衰竭。本病大多有自愈倾向。几乎所有患者均有肾小球源性血尿, 镜下血尿, 蛋</p>	富贵病降压用 ACEI 类	原文押中

<p>E. 肉眼血尿消失</p> <p>102. 血补体 C3 恢复正常的时间多为起病后</p> <p>A. 12-24 周 B. 4-8 周 C. 8-12 周</p> <p>D. 2-4 周 E. 1-2 周</p>	<p>白尿。血补体 C3 以及总补体在发病初期下降，8 周内渐恢复正常</p>		
<p>(103-105 题共用题干)</p> <p>女，17 岁。疲乏无力、心烦易怒、怕热多汗多年。易饿，体重下降 11kg。月经量减少，经期仅 1-2 天。查体：P 108 次/分，BP 140/70mmHg，皮肤微潮，手有细颤，轻微突眼，甲状腺 I 度弥漫性肿大，质软，无触痛</p> <p>103. 该患者最可能的诊断是</p> <p>A. 亚急性甲状腺炎 B. 糖尿病</p> <p>C. 单纯性甲状腺肿 D. 自主神经功能紊乱</p> <p>E. GrAvEs 病</p> <p>104. 明确诊断的主要检查是</p> <p>A. 甲状腺放射性核素扫描 B. 垂体功能测定</p> <p>C. 血甲状腺激素水平 D. 口服葡萄糖耐量试验</p> <p>E. 甲状腺摄 131 I 率</p> <p>105. 最可能的检查结果是</p> <p>A. FT3 及 FT4 升高 B. TSH 升高</p> <p>C. 甲状腺摄 131 I 率降低</p> <p>D. 继发性垂体功能降低 E. 血糖升高</p>	<p>小册子 14、15 页原文</p> <p>TRH (兴奋试验最敏感：甲亢时老二不听老大 停药) → TSH (更敏感) → T3 (为主) 来自 T4 (TRAB 阴性停药) 【甲亢时老二听老三 正常时老二听老大 老三出问题】</p> <p>甲亢在各种原因中，GrAvEs (弥漫性甲状腺肿) 病最常见</p>		<p>原文押中</p>
<p>(106-109 题共用题干)</p> <p>女，8 个月。因发热 2 天。抽搐 2 次，伴呕吐，吃奶量减少，喜哭，易怒就诊。母乳喂养。查体：精神差，前囟饱满，心腹无异常发现，肌张力增高。脑脊液检查：外观混浊，白细胞 1000 × 106/L，中性粒细胞为主，糖 1mmol/L，氯化物 107mmol/L，蛋白质 2.0g/L。</p> <p>106. 最可能的诊断是</p> <p>A. 病毒性脑膜炎 B. 结核性脑膜炎</p> <p>C. 隐球菌性脑膜炎 D. 化脓性脑膜炎 E. 中毒性脑病</p>	<p>小册子 41、55 页原文</p> <p>化脑：高热，有颅高压症状（呕吐、两眼凝视、前囟隆起），皮肤出血点、淤斑</p> <p>化脑合并硬膜下积液 长期发热迁延不断 肺炎链球菌 流感嗜血杆菌</p>	<p>抗利尿激素分泌异常综合征因抗利尿激素(ADH, 即 AVP)或类似抗利尿激素样物质分泌过多，致使体内水分储留、尿钠排出增加，低钠血症为突出表现。</p> <p>尿崩症与之相反</p>	<p>106、107 原文押中</p> <p>108、109 智商推理题</p>

<p>107. 针对病因, 首选的治疗药物是 A. 阿昔洛韦 B. 异烟肼 C. 甘露醇 D. 头孢曲松 E. 氟康唑</p> <p>108. 如合并硬膜下积液, 积液量较大, 颅内压明显增高, 应选择硬膜下穿刺放出积液, 每次每侧放液最宜 A. 21-25ml B. 31-50ml C. 小于 15ml D. 15-20ml E. 26-30ml</p> <p>109. 治疗期间, 若出现抗利尿激素异常分泌综合征, 开始宜选用静脉滴注氯化钠的浓度为 A. 2% B. 0. 9% C. 0. 45% D. 1. 5% E. 3%</p>	<p>β-内酰胺类抗生素: 青霉素类, 头孢菌素, 三代头孢对革兰阴性菌有较强的作用 螺旋体感染首选苜青霉素 抗绿脓杆菌头孢拉定→抗绿脓, 他一定能搞定+妥布霉素 TOUTUO 三代: 头孢噻肟 头孢曲松(菌必治 B) 头孢他定 头孢哌酮(先锋必素 B) 通过 BBB</p>		
<p>(110-112 题共用题干) 女, 25 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。查体: T38. 5° C, 双肢和腹部有多处瘀斑, 双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大, 活动无压痛, 最大者为 2Cm×2. 5Cm, 胸骨压痛(+), 腹软, 肝肋下 1. 5Cm, 脾肋下 2Cm。化验: HB78g/L, WBC 18×10⁹/L, 分类可见原始和幼稚细胞, P1T 25×10⁹/L, 网织红细胞 0. 002。</p> <p>110. 该患者最可能的诊断是 A. 急性淋巴细胞白血病 B. 非霍奇金淋巴瘤 C. 急性粒细胞白血病 D. 霍奇金淋巴瘤 E. 系统性红斑狼疮</p> <p>111. 未明确诊断, 首选的检查是 A. 骨髓细胞学检查 B. 淋巴结活检 C. 骨髓活检 D. 腹部 B 超 E. ANA 谱</p> <p>112. 明确诊断后, 首选的治疗措施是 A. ABVD 方案化疗 B. VDLP 方案化疗 C. 给予大剂量糖皮质激素 D. DA 方案化疗 E. CHOP 方案化疗</p>	<p>小册子 13 页原文</p> <p>VP 方案(长春新碱 VinCrisTinE 加泼尼松)、VDP 方案(长春新碱、柔红霉素加泼尼松)或 VDLP 方案(长春新碱、柔红霉素、左旋门冬酰胺酶加泼尼松)等; 中枢白血病鞘内注射甲氨蝶呤(MTX) POX 阴性 激素治疗【四多一少】 肝大脾大 儿童急淋</p>	<p>漫画讲解</p> <p>5 天 急性</p>	<p>原文押中</p>
<p>(113-115 题共用题干) 男, 35 岁。腰痛伴右侧下肢放射性疼痛 个月, 无明显发热、盗</p>	<p>小册子 30 页原文</p>		<p>原文押中</p>

<p>汗。查体：右直腿抬高试验阳性，小腿外侧和足感觉减退，踝背伸肌力减退</p> <p>113. 最可能的诊断是</p> <p>A. 腰椎间盘突出症 B. 腰肌劳损</p> <p>C. 腰椎肿瘤 D. 腰椎结核 E. 强直性脊柱炎</p> <p>114. 最可能病变部位是</p> <p>A. L2-3 B. L3-4 C. L1-2 D. L4-5 E. L5-S1</p> <p>115. 最适合的治疗方法是</p> <p>A. 联合应用抗生素 B. 卧床休息，牵引理疗</p> <p>C. 抗结核药物治疗 D. 单纯椎板减压手术</p> <p>E. 髓核摘除术</p>	<p>L5~S1 椎间盘突出跟腱反射减弱或消失 L4~5 椎间盘突出则没有改变</p> <p>腰椎间盘突出症 直腿抬高试验和加强试验阳性，一般至少提高到 60-70°</p> <p>直腿抬高试验(LAsEguE)，为神经根受刺激的表现</p> <p>绝对卧床休息，3周后带腰围起床活动，3个月内不作弯腰拾物动作</p>		
<p>(116-118 题共用题干)</p> <p>男，4 岁。因反复低热、咳嗽和盗汗 15 天就诊。查体：T37.5° C，右眼球结膜充血，内部有一疱疹，咽部充血，右颈部可触及黄豆大小淋巴结，无明显压痛，心、肺无异常，肝肋下 1.5cm。血 WBC 5.6×10⁹/L。L 0.70。</p> <p>116. 最可能的诊断是</p> <p>A. 咳嗽变异性哮喘 B. 结核感染 C. 肺炎支原体感染</p> <p>D. 急性上呼吸道感染 E. 支气管异物</p> <p>117. 若胸部 X 线片示肺门有直径 3cm 的圆形致密阴影，其肺部病灶的病理改变应是</p> <p>A. 渗出、水肿、坏死 B. 充血、水肿、渗出</p> <p>C. 渗出、增殖、坏死 D. 充血、水肿、坏死</p> <p>E. 充血、水肿、增殖</p> <p>118. 宜采取的治疗措施是</p> <p>A. 应用大环内酯类抗生素 B. 糖皮质激素治疗</p> <p>C. 抗结核治疗 D. 抗病毒治疗 E. 支气管镜取异物</p>	<p>小册子 52 页原文</p> <p>结核 病变属于特殊性炎症，具有渗出、坏死和增生三种基本变化</p>	<p>结核基础知识</p>	<p>原文押中</p>
<p>(119-121 题共用题干)</p> <p>初孕妇，25 岁。妊娠 31 周。从妊娠 29 周起反复 3 次阴道流血，量少，无腹痛。再次阴道流血同月经量。查体：P88 次/分，BP</p>	<p>小册子 35 页原文</p>	<p>漫画讲解</p> <p>胎盘的正常附着处在子宫体部</p>	<p>原文押中</p>

<p>110/70mmHg。子宫软，无宫缩，枕左前位，胎头高浮，胎心率 144 次/分。</p> <p>119. 首先考虑的诊断是</p> <p>A. 低置性前置胎盘 B. 中央性前置胎盘</p> <p>C. 边缘性前置胎盘 D. 部分性前置胎盘</p> <p>E. 前置血管破裂</p> <p>120. 应进行的辅助检查是</p> <p>A. 测定血雌三醇值 B. 血常规及尿常规</p> <p>C. B 超检查 D. 肛查判断宫颈是否扩张</p> <p>E. 盆腔 X 线片</p> <p>121. 错误的处理方法是</p> <p>A. 出血停止可期待治疗 B. 卧床休息，应用宫缩抑制剂</p> <p>C. 直接阴道检查确定前置胎盘类型 D. 输液备血</p> <p>E. 继续流血，应行剖宫产术</p>	<p>前置胎盘时的阴道流血特征是无痛性阴道流血</p> <p>胎盘早剥：底蜕膜血肿 腹痛，子宫板状，一旦确诊，终止妊娠（内出血为主）</p>	<p>的后壁、前壁或侧壁。如果胎盘附着于子宫下段或覆盖在子宫颈内口处，位置低于胎儿的先露部，称为前置胎盘。</p> <p>中央性前置胎盘就是子宫颈内口全部被胎盘组织覆盖。对胎儿及大人均有影响。很容易出现大出血、胎儿早产及胎儿死亡，以中央性最重。</p> <p>边缘性前置胎盘，胎盘边缘附着于子宫下段，不超越宫颈内口。</p> <p>部分性前置胎盘介于两者之间</p>	
<p>(122-124 题共用题干)</p> <p>女，48 岁。接触性出血 3 个月。妇科检查：宫颈呈糜烂状。工体正常大小，活动好，双侧附件区无异常。三合诊(一)。阴道镜下活检病理示鳞状细胞癌，间质浸润深度 6mm</p> <p>122. 该患者的临床分期是</p> <p>A. 宫颈原位癌 B. 宫颈癌 I A2 期</p> <p>C. 宫颈癌 I B2 期 D. 宫颈癌 I A1 期</p> <p>E. 宫颈癌 I B1 期</p> <p>123. 最适宜的手术方式是</p> <p>A. 筋膜内子宫全切除术加盆腔淋巴结切除术</p> <p>B. 改良广泛子宫切除术加盆腔淋巴结切除术</p> <p>C. 宫颈锥切术加盆腔淋巴结切除术</p> <p>D. 广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术</p> <p>E. 筋膜外子宫全切除术加盆腔淋巴结切除术</p> <p>124. 术后常规病理：各切缘阴性，中分化鳞癌，无淋巴结转移及脉管浸润，应给予</p>	<p>小册子 36 页原文</p> <p>子宫颈癌最早出现的症状是 接触性出血</p> <p>0 期：原位癌，I 期宫颈内；II 期阴道未达下 1 / 3 及盆壁；IV 期超出骨盆或浸润膀胱直肠</p> <p>A 期阴道为主 B 期宫旁为主</p> <p>【543】</p> <p>I A 肉眼未见癌灶 最深为 5mm</p> <p>I B 肉眼可见 I B 1 直径≤4Cm</p>		<p>原文押中</p>

<p>A. 随访观察 B. 放化疗 C. 放射治疗 D. 化学治疗 E. 物理治疗</p>			
<p>(125-127 题共用题干) 女, 4 个月。双胎之小, 单纯母乳喂养。面色苍白、食欲减退 2 个月。查体: 肤色苍白, 肝肋下 3.5cm, 脾肋下 1.5cm。血 HB80g/L, RBC3.3×10¹²/L, MCV 60fl, MCH 24pg, MCHC 25%, P1T、WBC 正常。 125. 最可能的诊断是 A. 再生障碍性贫血 B. 营养性巨幼细胞贫血 C. 感染性贫血 D. 混合性贫血 E. 缺铁性贫血 126. 经有效治疗后, 首先出现的变化是 A. 血红蛋白上升 B. 红细胞上升 C. 细胞内含铁酶活性开始恢复 D. 红细胞游离原卟啉上升 E. 网织红细胞上升 127. 若 HB 恢复正常, 还需继续药物治疗的时间是 A. 3-4 周 B. 1-2 周 C. 9-12 周 D. 13-18 周 E. 6-8 周</p>	<p>小册子 12、41 页原文 补铁治疗后网织红细胞首先上升, 7 天达高峰。(网织红细胞→血红蛋白→铁蛋白) 营养性缺铁性贫血的外周血象: 呈小细胞低色素性贫血; 外周血涂片可见红细胞大小不等, 以小细胞为多, 中央淡染区扩大 血清铁蛋白: 灵敏 早期最可靠 血清铁、总铁结合力 确诊首选 总铁结合力是指血清中转铁蛋白与铁结合的总量, 实际反映转铁蛋白的水平 【库存铁=铁蛋白和含铁血黄素 快速递铁=总铁结合力=转铁蛋白】 早产 2 个月开始铁剂预防 正常后补充 2 个月 早期有效指标: 网织红细胞上升 继续用药 3-6 个月以补充铁的贮存量</p>	<p>小白与小黄的故事 讲义 655 页: 370. 铁剂治疗营养性缺铁性贫血, 血红蛋白达正常后继续用药的时间是 A. 1 周 B. 2 周 C. 4 周 D. 6 周 E. 8 周 ♦ 答案: E 早期有效指标: 网织红细胞上升 继续用药 3-6 个月以补充铁的贮存量。♦ (细胞内含铁酶活性开始恢复--网织红细胞 3-6 个月→血红蛋白 6-8 周→铁蛋白) 补充铁剂 12~24 小时后, 细胞内含铁酶开始恢复, 网织红细胞于服药 2~3 天后开始上升, 5~7 日达高峰, 2~3 周后下降至正常。治疗 1~2 周后血红蛋白逐渐上升, 通常于治疗 3~4 周达到正常。血红蛋白恢复正常后再继续服用铁剂 6~8 周, 以增加铁储存。</p>	<p>原文押中</p>
<p>(128-129 题共用题干) 女, 28 岁。葡萄胎清宫术后阴道持续少量流血 3 个月。妇科检查: 子宫如妊娠 50 天大小, 质软, 双侧附件均可触及囊性肿物, 大小约 5cm×4cm, 活动好。尿 HCG 阳性。盆腔超声示子宫肌层有一 4cm×3cm 不均质回声, 血流信号丰富, 两侧附件区有</p>	<p>小册子 36 页原文 停经后流血: 葡萄胎, 绒癌</p>	<p>详解绒癌与恶性葡萄胎差别</p>	<p>原文押中</p>

<p>囊性低回声包块</p> <p>128. 该患者最可能的诊断是</p> <p>A. 子宫腺肌病合并卵巢囊肿 B. 不全流产</p> <p>C. 早孕合并卵巢囊肿 D. 绒毛膜癌</p> <p>E. 侵蚀性葡萄胎</p> <p>129. 首选的治疗是</p> <p>A. 卵巢囊肿切除术 B. 放射治疗</p> <p>C. 子宫病灶切除术 D. 清宫术 E. 化学治疗</p>	<p><u>绒毛膜癌，约 50%发生于葡萄胎后。</u></p> <p><u>绒癌无绒毛，常见肺转移 绒癌常继</u></p> <p><u>发于葡萄胎后半年以上，转移广，潜</u></p> <p><u>伏期长，来源广，无绒毛+无间质细</u></p> <p><u>胞</u></p>		
<p>(130-132 题共用题干)</p> <p>初孕妇，26 岁。妊娠 38 周，自觉胎动减少 10 小时入院。</p> <p>130. 应立即采取的措施不包括</p> <p>A. 胎儿电子监护</p> <p>B. 间歇吸氧</p> <p>C. 左侧卧位</p> <p>D. 胎儿生物物理评分</p> <p>E. 立即停止妊娠</p> <p>131. 入院后 B 超检查提示羊水平段 5Cm, 无应激试验反应型，此时正确的处理措施是</p> <p>A. 人工破膜</p> <p>B. 间歇吸氧并严密观察</p> <p>C. 复查无应激试验</p> <p>D. 静脉滴注缩宫素</p> <p>E. 米索前列醇引产</p> <p>132. 5 小时后，产程发动，听诊胎心率 100 次/分，此时最恰当的处理措施是</p> <p>A. 加压给氧</p> <p>B. 产钳助产</p> <p>C. 给予宫缩抑制剂</p> <p>D. 继续观察</p> <p>E. 剖宫产</p>		<p>S+3/4, 胎心>120, 宫口开全: 产钳助娩</p> <p>S+3/4, 胎心<120, 宫口开全: 剖宫产</p> <p>S+3/4, 胎心<120, 宫口未开全: 剖宫产</p> <p>S+3/4, 胎心>120, 宫口未开全: 继续观察</p> <p>BisHop 提出用宫颈成熟度评分在 3 分及 3 分以下不可行人工破膜</p> <p>小剂量静脉滴注缩宫素为安全常用的引产方法，但在宫颈不成熟时，引产效果不好。</p> <p>用人工的方法使胎膜破裂，引起前列腺素和缩宫素释放，诱发宫缩。适用于宫颈成熟的孕妇。缺点是有可能引起脐带脱垂或受压、母婴感染、前置血管、破裂和胎儿损伤。</p>	<p>讲解押中</p>

<p>(133-134 题共用题干)</p> <p>女, 30 岁。进行性痛经 8 年, 婚后 5 年未孕。妇科检查: 子宫大小正常, 后位, 固定, 盆底可触及多个痛性结节, 右侧附件区触及直径约 6cm 的囊性包块, 不活动。左侧附件区组织略增厚。</p> <p>133. 首先考虑的诊断是</p> <p>A. 盆腔结核 B. 原发性痛经 C. 慢性盆腔炎</p> <p>D. 子宫内膜异位症 E. 卵巢肿瘤</p> <p>134. 首选的治疗方案是</p> <p>A. 孕激素治疗 B. 手术治疗 C. 抗炎治疗</p> <p>D. 抗结核治疗 E. 镇痛治疗</p>	<p>小册子 35、37 页原文</p> <p>子宫内膜异位症: 月经过多, 经期长, 痛经</p> <p>内膜癌分段刮宫确诊 I 期手术首选晚期可孕激素治疗</p> <p>子宫内膜异位症目前在治疗上仍沿用假孕疗法及假绝经疗法。应用药物模拟孕期变化, 使异位的内膜出现蜕膜样变、局限性坏死或腺体萎缩消退, 一般不用化疗。</p>		<p>原文押中</p>
<p>A. 肝素 B. 输新鲜血浆</p> <p>C. 输新鲜全血 D. 氨基己酸</p> <p>E. 输浓缩血小板</p> <p>135. DIC 纤溶亢进期治疗时禁用 A</p> <p>136. DIC 消耗性低凝期首选 B</p>	<p>小册子 13 页原文</p> <p>【豆子与肝】</p>	<p>肝内活化的讲解</p> <p>氨基己酸: 抗纤维蛋白溶解药, 止血药。</p>	<p>讲解押中</p>
<p>A. 柯萨奇病毒 B. 带状疱疹病毒 C. 腺病毒</p> <p>D. 人类疱疹病毒 6 型 E. 呼吸道合胞病毒</p> <p>137. 幼儿急疹的病原是 D</p> <p>138. 疱疹性咽峡炎的病原是 A</p> <p>139. 咽结合膜热的病原是 C</p>	<p>小册子 39、40 页原文</p> <p>幼儿急疹•高烧, 人疱疹病毒 6 型</p> <p>疱疹性咽峡炎的病原体为柯萨奇病毒</p> <p>咽结合膜热: 腺病毒</p>		<p>原文押中</p>
<p>A. 第二产程停滞 B. 第二产程延长</p> <p>C. 活跃期停滞 D. 活跃期延长 E. 潜伏期延长</p> <p>140. 初产妇, 24 岁, 宫口开全 2 小时 10 分钟尚未分娩, 此时的诊断是 B</p> <p>141. 初产妇, 24 岁, 妊娠 38, 凌晨 3 时出现规律宫缩, 19 时 30 分宫口开大 2 厘米, 此时的诊断是 E</p>	<p>小册子 34 页原文</p> <p>潜伏期延长: 宫口临产到 3cm, >16 小时。活跃期延长: 宫口>3cm, >8 小时</p> <p>活跃期停滞: 不扩>2 小时</p>		<p>原文押中</p>

<p>A. 月经 5-6 日刮宫子宫内膜呈增生期和分泌期并存 B. 月经 5-6 日刮宫子宫内膜呈分泌型 C. 经前诊断性刮宫子宫内膜呈增生型 D. 经前诊断性刮宫子宫内膜呈蜕膜反应 E. 经前诊断性刮宫子宫内膜呈分泌不良</p> <p>142. 无排卵性功能失调性子宫出血子宫内膜的表现是 C 143. 卵巢黄体功能不全子宫内膜的表现是 E</p>	 <p>小册子 32 页原图</p>	<p>雌激素：内膜增生期 孕激素：分泌期</p>	<p>讲解押中</p>
<p>A. 罗格列酮 B. 吡格列酮 C. 阿卡波糖 D. 格列齐特 E. 二甲双胍</p> <p>144. 促进胰岛素分泌的药物是 D 145. 延缓肠道碳水化合物吸收的药物是 C</p>	<p>小册子 17 页原文</p> <p>磺脲类药物 磺脲类药物通过作用在胰岛 B 细胞表面的受体促进胰岛素释放 A-葡萄糖苷酶抑制剂 阿卡波糖，商品名为拜糖平 适用于餐后高血糖为主要表现的病人。常见不良反应为胃肠反应</p>	<p>格列齐特属于磺脲类</p> <p>阿卡波糖在肠道内竞争性抑制葡萄糖甙水解酶，降低多糖及蔗糖分解成葡萄糖，使糖的吸收相应减缓，因此可具有使饭后血糖降低的作用。</p>	<p>讲解押中</p>
<p>A. 60-90ml/kg B. 150-180ml/kg C. 50-60ml/kg D. 90-120ml/kg E. 120-150ml/kg</p> <p>146. 重度窒息新生儿推迟喂养，第 1 天静脉补液的量是 C 147. 小儿腹泻，中度脱水，第 1 天静脉补液的量是 E 148. 小儿腹泻，重度脱水，第 1 天静脉补液的量是 B</p>	<p>小册子 39 页原文</p> <p>135±30</p>	<p>一般极低体重儿 (<1500g) 出生后头 2 天予 60 ~ 100ml/(kg·D), 低出生体重儿 (1500~2500g) 头 2 天分别给予 50 ~ 60ml/(kg·D)</p>	<p>147、148 原文押中</p>
<p>A. 雌激素 B. 孕激素 C. 雄激素 D. 甲硝唑</p>	<p>小册子 35、36 页原文</p> <p>泡沫状 滴虫象泡泡 甲硝唑 治愈标准是连续 3 次月经后检查滴虫阴性</p>	<p>克霉唑：抗真菌药</p>	<p>原文押中</p>

E. 克霉唑 149. 治疗外阴阴道念珠菌病宜选用 E 150. 治疗滴虫性阴道炎宜选用 D	豆渣样白带 念珠像豆子 糖尿病或长期口服避孕药→假丝酵母菌病/白色念珠菌→痒→2~4%碳酸氢钠阴道灌洗+制霉菌素栓剂		
--	---	--	--

2012 原文对照 第四单元

2012 原文对照 第四单元	中域 2012 年执业医师图书及押题命中详情		备注
	押题出处	考前视频讲解方法	
1、严重心力衰竭时，治疗频发室性期前收缩首选的药物是： A. 胺碘酮 B. 索他洛尔 C. 多巴酚丁胺 D. 氟卡胺 E. 普罗帕酮	小册子 54 页原文 I C 钠通道 阻滞速度缓慢，如氟卡因、 普罗帕酮（心律平）（预激+室上速） 。	考试基本考胺碘酮和普罗帕酮这两个药物 普罗帕酮 预防房颤复发的作用肯定，但疗效低于 胺碘酮 ；	原文押中

	房颤)		
2、抢救大咯血患者时，最不宜采取的体位是： A. 右侧卧位 B. 仰卧位 C. 俯卧位 D. 头低足高位 E. 左侧卧位		防止淤血范围扩大	智商推理题
3、典型的 食管癌 症状特点是： A. 持续性胸骨后异物感 B. 渐进加重的吞咽困难 C. 间断吞咽困难伴呕吐 D. 胸痛 E. 反酸、烧心伴吞咽困难	小册子 28 页原文 食管癌好发部位，是 胸部食管中段 髓质型， 狭窄型：又称硬化型，梗阻较早 ，蕈伞型，溃疡型 一厚一窄；一突出一凹陷 进行性吞咽困难		原文押中
4、健康体检时，胸部 X 线片发现肺内靠近胸膜的孤立性小结节，此时应 首先 进行的检查是： A. 定期复查胸部 X 线片 B. 支气管镜 C. 痰细胞学 D. 胸部 CT E. 经皮穿刺活检			智商推理题
5. 最容易引起窦房传导阻滞的是： A. 高钾血症 B. 饮茶 C. 甲状腺功能亢进症 D. 交感神经张力过高 E. 贫血		心律失常的实质 钾离子的故事	讲解押中
6、颅底 骨折 通常的诊断依据是： A. 脑脊液鼻、耳漏 B. 头痛 伴呕吐 C. 偏瘫 D. 头皮血肿 E. 昏迷	外科原题 947. 单独作为诊断颅底骨折的依据中，错误的是◆ A. 脑脊液漏◆ B. 迟发性乳突部皮下淤血斑◆ C. CT 显示神经管骨折◆ D. 单纯鼻出血◆ E. “熊猫眼”征◆答案：D◆ 颅前窝骨折常累及额骨眶板和筛骨，引起的出血经前鼻孔流出；或流进眶内，眶周皮下及球结合膜下形成瘀血斑，称之“ 熊猫”眼征 。		原题押中
7、诊断反流性食管炎最可靠的方法是： A. 胃镜 B. 食管滴酸试验 C. 食管钡剂 X 线检查 D. 食管测压 E. 24 小时食管 p H 值监测	小册子 7 页原文 内镜检查 是诊断反流性食管炎 最准确（首选） 的方法。 24 小时食管 pH 监测 是诊断胃食管反流病的重要方法，可提供食管是否存在过度酸反流的客观证据		原文押中
8、 脑膜瘤 复发的重要因素是：		脑膜瘤切除彻底，不在复发，	智商推理题

<p>A. 年龄 B. 组织类型 C. 肿瘤部位 D. 性别 E. 术后肿瘤残余</p>		<p>但对于颅底以及脑膜不好切除的部分约 50%无法全切，复发率很高。恶性程度越，其术后复发率越高</p>	
<p>9、诊断抑郁发作的必要条件是： A. 早醒 B. 自杀观念 C. 思维迟缓 D. 动作减少 E. 心境低落</p>			<p>智商智商题</p>
<p>10、肛裂“三联征”是指： A. 肛裂、前哨痔、肛乳头肥大 B. 肛裂、疼痛、前哨痔 C. 肛裂、出血、肛乳头肥大 D. 疼痛、出血、前哨痔 E. 疼痛、便秘、出血</p>	<p>小册子最后一页 CHArCoT 三联症，即腹痛、寒战高热和黄疸。 胆囊炎无黄疸</p>		<p>原文押中</p>
<p>11、下列疾病中，持续性干咳而胸部 X 线片正常的情况最常见于： A. 支气管哮喘 B. 慢性支气管炎 C. 心力衰竭 D. 支气管扩张 E. 支气管结核</p>		<p>免疫性功能反应无形态学变化</p>	<p>智商推理题</p>
<p>12、胰头癌伴梗阻性黄疸时，查体的特点是： A. 胆囊表面光滑，伴局部肌紧张 B. MurpHy 征阳性 C. 胆囊表面不平，压痛明显 D. 胆囊表面不平，无压痛 E. 胆囊表面光滑，无压痛</p>	<p>小册子 26 页原文 下部胆管癌、胰头癌、壶腹癌和十二指肠肠癌，则 CourvoisiEr 征可为阳性（梗阻性黄疸同时可触及肿大而无触痛的胆囊）</p>		<p>原文押中</p>
<p>13、提示重症胰腺炎的体征是： A. CourvoisiEr 征阳性 B. 肝浊音界消失 C. GrEy-TurnEr 征阳性 D. MurpHy 征阳性 E. 肝区叩击痛阳性</p>	<p>小册子 27 页原文 低于 1. 87mmol / L 常提示病情严重 ←→NAHC03 浓度 1. 87</p>		<p>原文押中</p>
<p>14、下列疾病可表现为肠鸣音活跃的是： A. 上消化道出血 B. 肠系膜上动脉栓塞 C. 麻痹性肠梗阻 D. 急性胰腺炎 E. 上消化道穿孔</p>		<p>心梗锤一下的故事 自己给自己锤一下（晚期重症例外）</p>	<p>讲解押中</p>

<p>15、抗精神病药物的抗精神病作用的主要通路是：</p> <p>A. 锥体外系统 B. 结节-漏斗系统 C. 网状上行系统 D. 中脑-边缘系统 E. 黑质-纹状体系统</p>		<p>结节漏斗系统：下丘脑对腺垂体调节 抗精神病药物阻断中脑边缘系统 D2 受体，同时阻断了黑质纹状体的 D2 受体，引发锥体外系反应如类帕金森症状</p>	
<p>16、导致动脉炎症性脑血栓的常见病原体是：</p> <p>A. 梅毒螺旋体 B. 隐球菌 C. 回归热螺旋体 D. 伯氏螺旋体 E. 曲霉菌</p>	<p>小册子 35 页原文 I 期梅毒硬下疳，II 期梅毒疹，III 心血管梅毒</p>		<p>原文押中</p>
<p>17、支气管哮喘患者出现气流受限的原因不包括：</p> <p>A. 腺体分泌亢进及黏液清除障碍 B. 气道壁炎性细胞浸润 C. 肺泡弹性回缩力下降及肺泡壁破坏 D. 气道平滑肌痉挛 E. 气道黏膜水肿</p>	<p>小册子 2 页原文 支气管哮喘：反复发作性咳嗽、喘息、经支气管扩张剂治疗后可缓解或自行缓解，为气道变应性炎症，支气管平滑肌可逆性痉挛</p>	<p>哮喘→呼吸性呼吸困难→肺泡变大→弹性回缩力↑ 肺泡弹性回缩力下降：老年性肺气肿 肺泡壁破坏：炎症</p>	<p>讲解押中</p>
<p>18、迷走神经的耳廓凹面躯体感觉纤维中枢支终止于：</p> <p>A. 下涎核 B. 迷走神经背核 C. 三叉神经脊束核 D. 疑核 E. 孤束核</p>	 <p>脑神经核模式图（背面观）</p>	<p>迷走神经：躯体感觉纤维分布于外耳道及耳廓凹面的一部分皮肤（耳支），终止于三叉神经脊束核；内脏感觉纤维分布于胸腹腔内诸内脏，终止于孤束核；运动纤维分布于软腭、咽及喉部诸肌；起自迷走神经背核的纤维分布于胸腹腔内诸脏器，支配其副交感功能。舌咽神经和迷走神经彼此邻近，二者感觉的中枢支皆止于延髓的孤束核，运动支都起自疑核</p>	
<p>19、心房颤动时 f 波的频率为：</p> <p>A. 350 次-600 次/分 B. <150 次/分 C. 150 次-200 次/分 D. >600 次/分 E. 250 次-300 次/分</p>	<p>—</p> <p>心房颤动无正常P波，代之以大小不等形状各异的f波（纤颤波），心房f波的频率为350~600次/分，心室律绝对不规则</p>	<p>实践技能课讲解</p>	<p>讲解押中</p>


<p>20、重叠奔马律常见于：</p> <p>A. 病态窦房结综合征</p> <p>B. 房性期前收缩</p> <p>C. 心力衰竭伴心动过速</p> <p>D. 肥厚型心肌病</p> <p>E. 三度房室传导阻滞</p>		<p>奔马律常见于心衰</p> <p>火车头奔马律常见于心肌病、左心或右心衰竭伴心动过速患者</p>	<p>讲解押中</p>
<p>21、糖尿病合并高血压的患者，血压控制目标值应小于：</p> <p>A. 130/80mmHg B. 150/90mmHg</p> <p>C. 140/80mmHg D. 130/90mmHg</p> <p>E. 140/90mmHg</p>	<p>小册子 5 页原文</p> <p>高血压合并糖尿病或慢性肾脏疾病者应<130/80mmHg 要求高些</p>		<p>原文押中</p>
<p>22、不适用于连枷胸的处理措施是：</p> <p>A. 气管插管吸痰，给氧辅助呼吸 B. 浮动胸壁牵引</p> <p>C. 胸壁加压，包扎固定 D. 胸腔镜骨折固定</p> <p>E. 开胸骨折固定</p>	<p>连枷胸：多根多处肋骨骨折，使局部胸壁失去肋骨支撑而软化，并出现反常呼吸，固定胸壁。</p> <p>多发肋骨骨折+反常呼吸+连枷胸+固定胸壁</p>	<p>加压导致骨折不能复位</p> <p>固定肋骨→固定胸廓≠胸廓加压</p>	<p>智商推理</p>
<p>23、S4 产生机制是：</p> <p>A. 二尖瓣突然关闭 B. 三尖瓣突然关闭</p> <p>C. 血流冲击心室壁 D. 心房收缩</p> <p>E. 主动脉瓣突然关闭</p>	<p>小册子 1 页原文</p> <p>第四心音：S4 的产生与心房收缩有关</p>	<p>漫画讲解</p> <p>背后踹一脚</p>	<p>原文押中</p>
<p>24、痰呈铁锈色最常见于：</p> <p>A. 肺炎链球菌肺炎</p> <p>B. 肺炎支原体肺炎</p> <p>C. 葡萄球菌肺炎</p> <p>D. 肺炎克雷伯杆菌肺炎</p> <p>E. 病毒性肺炎</p>	<p>小册子 1 页原文</p> <p>肺炎球菌肺炎（或称肺炎链球菌）所引起大叶性肺炎（即典型肺炎）肺炎球菌为革兰阳性球菌，菌体外有荚膜，其毒力大小与荚膜中的多糖结构及含量有关，咳铁锈色痰，痊愈时</p>	<p>漫画讲解</p>	<p>原文押中</p>
<p>25 下列疾病中，较少发生大咯血的是：</p> <p>A. 二尖瓣狭窄</p> <p>B. 支气管扩张</p> <p>C. 肺脓肿</p> <p>D. 空洞型肺结核</p>	<p>常见病因依次为：①支气管扩张（约占 30%）；②肺癌（约占 20%）；③肺结核（约占 15%~20%）。</p> <p>急性血性播散型肺结核稍有咯血发生，毛细血管通透性增高，血液渗出，表现为痰中带血丝、血点或小血块</p>	<p>二尖瓣狭窄，突然发生大咯血是由于支气管静脉破裂。</p> <p>空洞壁肺动脉分支形成的小动脉瘤破裂</p>	<p>智商推理</p>

<p>E. 粟粒型肺结核</p>			
<p>26、评估呼吸气流是否受限最常用的指标是： A. 残气量/肺总量（RV/TLC） B. FEV1%预计值 C. 峰流速（PEF） D. FEV1/FVC E. 用力肺活量（FVC）</p>	<p>小册子2页原文 频率依赖性肺顺应性和闭合容积(CV) 增加检查小气道功能 当大、小气道有明显阻塞时 FEV1 / FVC<70% RV/ TLC>40%确诊肺气肿</p>		<p>原文押中</p>
<p>27、对精神分裂症最具有诊断价值的症状是： A. 心因性幻听 B. 命令性幻听 C. 反射性幻听 D. 假性幻听 E. 功能性幻听</p>		<p>幻觉、精神分裂症与宗教迷信的故事 假性幻听的病人则会具体地说出声音不是来自外界，而是存在于他的脑子里或肚子</p>	<p>讲解押中</p>
<p>28、感觉过度是指： A. 轻微的刺激引起强烈的感觉 B. 刺激后经一潜伏期感到自发的异常感觉 C. 刺激后经一潜伏期感到对刺激的认识倒错 D. 刺激后经一潜伏期感到定位不明确的强烈不适 E. 轻微的刺激引起剧烈的疼痛</p>		<p>感觉过度：由于 刺激阈增高与反应时间延长，刺激必须达到很强的程度方有感觉，有刺激后，需经一潜伏期，才能感到强烈的、定位不明确的不适感觉，患者不能正确指出刺激部位，也不能判明刺激的性质与强度。有时病人尚感刺激点会向四周扩散，并有“后作用”，即持续一段时间后才消失。【后知后觉】</p>	
<p>29、确定患者重型颅脑损伤深昏迷最有价值的体征是： A. 肠鸣音消失 B. 三凹征阳性 C. 深浅反射消失 D. 眼球固定 E. 呼之不应</p>			<p>智商推理</p>
<p>30、一般头皮裂伤清创的时限不应超过： A. 24小时 B. 72小时 C. 8小时 D. 48小时 E. 12小时</p>	<p>小册子22页原文 清创术应争取在8小时内进行，一般不得超过24小时 伤口超过12小时，应按感染伤口处理，即清创换药，不予一期缝合，可行延期缝合</p>		<p>原文押中</p>
<p>31、急性呼吸窘迫综合症最重要的临床特征是： A. 双肺渗出性病变翳学教育网整理 B. 呼吸困难和体位无关</p>	<p>小册子3页原文 急性呼吸窘迫综合征（ARDS），继发急性渗透性肺水肿和进行性缺氧性</p>		<p>原文押中</p>

<p>C. 呼吸频率显著增加 D. 顽固性低氧血症 E. 混合型呼吸困难</p>	<p>呼吸衰竭。临床表现为急性呼吸窘迫，难治性低氧血症。 <u>溺水常考</u> 氧合指数（动脉血氧分压/吸入气O2浓度，PAO2/FiO2）<300</p>		
<p>32、乳头肌断裂致急性二尖瓣关闭不全时，下列描述正确的是： A. 左心室大小无明显变化 B. 可无症状 C. 左心房明显扩大 D. 胸部X线片示肺纹理稀疏 E. 心电图示 Sv1+Rv5>4. 0mV</p>		<p>小可全无敌!!! 临床表现取决于起病缓急、二尖瓣反流量及原发病。逐渐发生的轻度乳头肌功能不全，因对血流动力学影响小，可无症状。</p>	<p>讲解押中</p>
<p>33、慢性胃炎的临床表现一般不包括： A. 恶心、呕吐 B. 反酸、烧心 C. 贫血 D. 右季肋部痛 E. 上腹部痛</p>	<p>解剖学基础知识：胃部靠左，不是靠右!!</p> 		<p>智商推理</p>
<p>34、诊断急性心肌梗死特异性最高的心肌坏死标志物是： A. 肌酸磷酸激酶 B. 天门冬氨酸氨基转移酶 C. 肌红蛋白 D. 肌钙蛋白 E. 乳酸脱氢酶</p>	<p>小册子6页原文 恢复时间长短：肌红蛋白→CK-MB→CK→AST→LDH、肌钙蛋白I (CTnI) 升高开始时间顺序：肌红蛋白→肌钙蛋白I (CTnI).... 记忆方法： 特异性最强和持续时间最长：肌钙蛋白</p>		<p>原文押中</p>
<p>35、心尖搏动点向左下移位常见于： A. 右心房增大 B. 心包积液 C. 右心室增大 D. 左心室增大 E. 左心房增大</p>		<p>左室肥厚——心尖区抬举性搏动。室间隔缺损——心前区抬举性搏动。 右室肥厚——胸骨左下缘收缩期抬举性搏动。</p>	<p>讲解押中</p>

<p>36、能增加左心室后负荷的临床情况是：</p> <p>A. 二尖瓣反流</p> <p>B. 高血压</p> <p>C. 房间隔缺损</p> <p>D. 主动脉瓣反流</p> <p>E. 室间隔缺损</p>	<p>小册子 4 页原文</p> <p>后负荷：心室后压力负荷 主动脉压和肺动脉压</p> <p>前负荷：心室前容量负荷 舒张末期，心室所承受的容量负荷或压力</p>		<p>原文押中</p>
<p>37、溃疡性结肠炎患者最典型的症状是：</p> <p>A. 腹泻、腹痛、脓血便</p> <p>B. 排便困难伴腹痛，无便血</p> <p>C. 腹泻与便秘交替伴发热</p> <p>D. 硬结便带血，便与血不混</p> <p>E. 腹痛，便后可缓解，无便血</p>	<p>小册子 9 页原文</p> <p>黏液血便是本病活动期的重要表现。</p> <p>腹痛-便意-便后缓解（肠易激惹）</p>	<p>漫画讲解</p> <p>出血：溃疡</p> <p>粘液：缓解疼痛</p>	<p>原文押中</p>
<p>38、急性糜烂出血性胃炎最常见的原因是：</p> <p>A. 不洁饮食</p> <p>B. 剧烈呕吐</p> <p>C. 刺激性食物</p> <p>D. 口服抗生素</p> <p>E. 口服非甾体抗炎药</p>	<p>小册子 7 页原文</p> <p>急性糜烂出血性胃炎的常见病因包括非甾体抗炎药（抑制前列腺素合成）、应激等</p> <p>慢性活动性胃炎最主要的病因是幽门螺杆菌感染</p>	<p>漫画讲解</p>	<p>原文押中</p>
<p>39、支气管柱状扩张的典型 X 线表现为：</p> <p>A. 蜂窝肺</p> <p>B. 鼠尾征</p> <p>C. 残根征</p> <p>D. 树芽征</p> <p>E. 轨道征</p>	<p>小册子 2 页原文</p> <p>支气管扩张症慢性咳嗽伴大量脓痰和（或）反复咯血，好发于下叶基底段，固定的局限性湿罗音，杵状指无发烧</p> <p>实践技能讲解：增粗或轨道征</p>		<p>讲解押中</p>
<p>40、患者无心力衰竭的症状和（或）体征，但已出现心脏结构的改变，其心功能分期是：</p> <p>A. C 期</p> <p>B. 不能分期</p> <p>C. A 期</p> <p>D. B 期</p>	<p>心衰分期（ACC/AHA）：</p> <p>A 期，心力衰竭高危但没有器质性心脏病或心力衰竭症状；</p> <p>B 期，有器质性心脏病，但没有心力衰竭症状；</p> <p>C 期，器质性心脏病并且既往或目前有心力衰竭症状；</p> <p>D 期，需要特殊干预治疗的难治性心力衰竭。</p>	<p>讲解押中</p>	

E. D 期			
41、下列疾病出现咯血时，最常表现为持续痰中带血的疾病是： A. 心力衰竭 B. 肺 血栓栓塞 症 C. 肺炎 D. 肺癌 E. 支气管扩张	小册子 2 页原文 支气管扩张症 慢性咳嗽伴大量脓痰和（或）反复咯血，好发于下叶基底段，固定的局限性湿罗音，杵状指无发烧		原文押中
42、一般不会出现 意识障碍 的情况是： A. 躁狂状态 B. 抑郁状态 C. 分离状态 D. 痴呆 状态 E. 应激状态		抑郁→严重时自杀倾向→意识清醒，错误的意识	智商智商
43、触诊 主动脉瓣狭窄 患者心前区震颤的最佳部位是： A. 胸骨左缘 3、4 肋间 B. 心尖部 C. 胸骨左缘第 2 肋间 D. 剑突下 E. 胸骨右缘第 2 肋间		实践技能讲解	讲解押中
44、二尖瓣关闭不全的典型特征是： A. 心尖部粗糙的收缩期杂音 B. 心尖部 AusTin-FlinT 杂音 C. 心尖部 S1 亢进 D. A2 增强 E. 心界呈梨形	小册子 6 页原文 心梗时因 乳头肌缺血、坏死造成二尖瓣脱垂并关闭不全 ，出现心前区收缩 中晚期喀喇音及收缩期杂音	详细讲解第一第二心音的机理，及 AusTin-FlinT 杂音的记忆方法	原文押中
45、 癫痫持续状态 首选的治疗药物是： A. 苯妥英钠 B. 地西泮 C. 水合氯醛 D. 异戊巴比妥 E. 苯巴比妥钠	小册子 53 页原文 卡马西平大发作和部分性发作的首选药， 小发作： 乙琥胺；丙戊酸钠 对各型的癫痫都行一定疗效； 安定 治疗癫痫持续状态	DiAzEpAm 的记忆方法	原文押中
46、下列机制所致的低氧血症中，通过氧疗最难纠正的是： A. 弥散功能障碍 B. 肺泡通气量下降 C. 通气/血流比例失衡 D. 肺内分流 E. 氧耗量增加		肺内分流→血液不经过肺→肺内氧气增加无效	智商推理
47、机体对慢性 II 型 呼吸衰竭 所进行的代偿性反应是：	小册子 53 页原文	漫画讲解：	原文押中

<p>A. 血钾增加 B. 阴离子间隙增加 C. 肾脏回吸收碳酸氢根增加 D. 呼吸频率增加 E. 潮气量增加</p>	<p>【II型呼衰+呼酸合并代酸+慢阻肺+通气障碍+ P02 <60+C02 潴留+细小支气管狭窄+CV↑+呼气性呼吸困难+持续低浓度给氧】</p>	<p>呼吸三部曲酸中毒→把酸排出去，把碱留下来→肾脏回吸收碳酸氢根增加</p>	
<p>48、既往身体健康的成年人，社区获得性肺炎的常见病原不包括： A. 铜绿假单胞菌 B. 肺炎支原体 C. 肺炎衣原体 D. 流感嗜血杆菌 E. 肺炎链球菌</p>	<p>内科学原题： 180 社区获得性肺炎中最常见的革兰阴性菌是 A. 大肠杆菌 B. 不动杆菌 C. 铜绿假单胞菌 D. 流感嗜血杆菌 E. 肺炎克雷伯菌 答案：D 社区获得性肺炎，即医院外感染，致病菌仍以肺炎球菌最为常见，约占40%。其次为流感嗜血杆菌、肺炎支原体、葡萄球菌、肺炎克雷白杆菌、肺炎军团菌等 绿脓杆菌=铜绿假单胞菌</p>		<p>原题押中</p>
<p>49、病理性焦虑和恐惧症状的主要区别在于有无： A. 运动不安 B. 失眠 C. 惊恐发作 D. 自主神经功能紊乱 E. 明确的指向对象</p>		<p>精神病、宗教迷信、幻觉，天才与疯子的同质</p>	<p>智商推理题</p>
<p>50、阻塞性肺不张时不会出现的体征是： A. 病变部位呼吸音减弱 B. 病变部位叩诊呈浊音 C. 病变部位触觉震颤增强 D. 气管向患侧移位 E. 胸廓可有塌陷</p>	<p>小册子1页原文 胸膜腔含空气积液语音震颤减弱 肺中含空气积液语音震颤增强</p>	 <p>漫画讲解</p>	<p>原文押中</p>

Dr. Nee