



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2436—2015

贴梗海棠育苗技术规程

Technical regulations for seedling of
Chaenomeles speciosa

2015-01-27 发布

2015-05-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
贴梗海棠育苗技术规程
LY/T 2436—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年4月第一版

*

书号: 155066·2-28553

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位：山东农业大学、泰安市泰山林业科学研究院、山东省中新木瓜合作研究中心。

本标准主要起草人：王建华、王迎、房信胜、孙印石、赵进红、孔令刚、宋承东、杜辉、周光锋、李圣波。

贴梗海棠育苗技术规程

1 范围

本标准规定了贴梗海棠[*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai]的播种育苗、扦插育苗、嫁接育苗等环节的技术要求以及苗木出圃和苗木质量分级指标。

本标准适用于贴梗海棠[*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai]的育苗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2772 林木种子检验规程

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 6001—1985 育苗技术规程

3 采穗圃建立

见 GB/T 6001—1985 的 7.1,采穗圃用于采集扦插用枝条和采集嫁接用接穗。

4 播种育苗

4.1 种子采集

选择五年生以上,生长良好、发育健壮、无病虫害的母树。果实成熟时采收,用刀剖开木瓜果实后取种子。切割时,先在果实中间部位纵切一刀约 1/3 深,再在相对位置纵切第 2 刀,深度相近,然后用刀撬开或用手掰开果实,即可取种子。种子检验依照 GB 2772 规定进行。

4.2 种子处理

一般需除去木瓜种皮上的果胶物胶,方法有以下两种:

- a) 将种子放入网袋中,网眼大小以种子不漏出为宜,放在清水中浸泡并反复揉搓,使黏液物质从网袋中挤出,再在清水中淘洗,至黏液物质洗净为止。去掉漂浮的空粒、瘪粒及夹杂物。
- b) 将刚取出的木瓜种子趁鲜与草木灰混合揉搓,也可去除大部分胶质,然后用清水漂洗干净。去掉漂浮的空粒、瘪粒及夹杂物。

4.3 种子贮存

种子不要曝晒,阴干,置阴凉通风处备用。

4.4 播种时间

秋播不催芽,10月至12月初播种,种子可随采随播。

春播需催芽,砂藏催芽翌年春3月下旬,有约 1/3 的种子裂嘴或露白时播种。