

E.1200ml, 55ml

598. 女性，24岁，突然发热，1天后出现肉眼血尿，无尿频尿痛，化验尿常规：蛋白（+），红细胞30~40个/HP，白细胞10~20个/HP。应考虑用何种检查诊断
- A. 尿细菌培养
 - B. 血常规检查
 - C. 尿蛋白定性
 - D. 膀胱镜
 - E. 肾盂造影

599. 胸痛的性质可提示某种疾病，下列哪项正确
- A. 绞窄性痛 - 肺梗死
 - B. 阵痛 - 肺癌
 - C. 撕裂痛 - 带状疱疹
 - D. 刀割样痛 - 干性胸膜炎
 - E. 尖锐刺痛 - 心绞痛

·263·

·264·

压180/120mmHg，中度昏迷，双瞳孔2mm，对光反射存在，右侧鼻唇沟浅。右上、下肢肌力2级，右侧膝反射低下，右侧病理征阳性。考虑诊断

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑栓塞
- E. 脑膜炎

595. 男，32岁，突然呼吸困难，右侧胸痛，查体：发绀，大汗。既往肺结核史，该患者最可能的诊断是
- A. 结核性纤维素性胸膜炎
 - B. 急性左心衰竭
 - C. 自发性气胸
 - D. 急性心肌梗死
 - E. 支气管哮喘

600. 纠正中度脱水，补充累积损失的量应为

- A. 10~20ml/kg
- B. 20~40ml/kg
- C. 40~60ml/kg
- D. 50~100ml/kg
- E. 100~120ml/kg

596. 患者胸部受伤，急诊入院。经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀，休克。查体：左胸饱满，气管向右移位，左侧可触及骨擦音，叩之鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显。处理原则是
- A. 升压药抗休克
 - B. 立即剖胸探查
 - C. 肋骨固定，胸腔排气
 - D. 呼吸机加压呼吸
 - E. 快速输血输液

597. 1岁小儿腹泻，重度脱水伴重度酸中毒，此患儿累计损失的液量及首次补充5%碳酸氢钠的量分别约是
- A. 800ml, 35ml
 - B. 1400ml, 65ml
 - C. 1000ml, 45ml
 - D. 600ml, 25ml

·261·

·262·

- C. 强心剂
- D. 胸腔穿刺引流
- E. 利尿剂

591. 女性，55岁，半年内出现3次突然不能言语，每次持续30分钟左右，第3次伴右侧肢体麻木，既往有房颤病史，神经系统检查正常，最可能诊断是

- A. 癫痫小发作
- B. 偏头痛
- C. 颈椎病
- D. 短暂性脑缺血发作（TIA）
- E. 顶叶肿瘤

592.1岁小儿，血常规检查结果如下：Hb80g/L，MCV98fl，MCH33pg，MCHC32%。最适宜的治疗是

- A. 口服铁剂
- B. 口服维生素C

- C. 脾切除
- D. 输血
- E. 肌注维生素B₁₂

593. 男性，75岁，心绞痛发作持续4小时，含硝酸甘油无效。心电图示：Ⅱ、Ⅲ、aVF导联呈弓背样抬高0.6mV，V₁～V₃导联ST段水平样压低0.4mV，偶发室性期前收缩1次，诊断为急性心肌梗死。最合适的处理是

- A. 溶栓治疗
- B. 心电监护
- C. 静注吗啡
- D. 静滴利多卡因
- E. 静滴极化液

594. 女性，57岁，高血压病6年。6小时前因生气突发头痛，呕吐，右侧肢体不能动，20分钟后出现意识不清。血

587. 胎龄为36周的新生儿，生后6小时皮肤出现黄染，生后3天出现抽搐，体检：一般状态差，前囟平，皮肤及巩膜重度黄染，心肺正常，腹软，四肢张力增强，血胆红素342μmol/L，血钙2.0mmol/L，此患儿最可能是

- A. 核黄疸
- B. 化脓
- C. 低钙
- D. 低血糖
- E. 癫痫

588. 5个月男婴，生后反复患支气管肺炎和心力衰竭，平时常有吃奶或哭闹后口唇发绀，生长缓慢，已确诊为室间隔缺损，缺损直径为12mm。以下说法中正确的是

- A. 患儿已合并有肺动脉高压
- B. 1岁后再行手术治疗

- C. 应尽早进行手术治疗
- D. 患儿已失去手术机会
- E. 容易并发脑脓肿

589. 一腹泻患儿体重9kg，中度脱水，该患儿体液丢失量约为

- A. 1200ml
- B. 800ml
- C. 400ml
- D. 200ml
- E. 100ml

590. 3岁小儿，突然高热伴咳嗽5天，经红霉素治疗无效，体温仍高，烦躁不安，呼吸52次/分，心率160次/分，胸片示：有圆形密度增高阴影，伴气胸（非液气胸）。应立即给予的治疗是

- A. 退热药
- B. 镇静药

- D. 子宫小于停经月份可排除葡萄胎
E. 完全性葡萄胎的组织学特征之一是绒毛间质内胎源性血管消失
583. 新婚夫妇欲婚后 1 年生孩子，最恰当的避孕方法是
A. 安全期避孕法
B. 口服避孕药
C. 放置宫内节育器
D. 皮下埋植 Norplant II
E. 阴茎套
584. 患者妊娠 38 周，早晨醒来时发现躺在血泊中，急诊入院。查：血压 90/60mmHg，脉搏 118 次/分，神清，宫高 36cm，臀先露、高浮、胎心 160 次/分，骨盆正常，阴道少量活动性流血。最适当的处理是
A. 输血输液同时行剖宫产
- A. 阴道内诊检查
B. X 线腹部平片
C. 下腹部听诊胎盘杂音
D. B 型超声检查
E. 放射性核素扫描
579. 关于子宫肌瘤的叙述，错误的是
A. 子宫肌瘤是女性生殖系统最常见的良性肿瘤
B. 多见于育龄期妇女，绝经后一般停止生长
C. 仅有压迫症状的浆膜下肌瘤无需手术治疗
D. 子宫大于 2 个半月妊娠大小时需手术治疗
E. 治疗需根据年龄、生育要求、症状、肌瘤大小综合考虑
- B. 人工破膜
C. 期待疗法
D. 脐位牵引
E. 催产素滴注引产
585. 小儿生理性贫血发生于生后
A. 1 ~ 2 周
B. 2 ~ 3 周
C. 1 ~ 2 个月
D. 2 ~ 3 个月
E. 6 个月
586. 1 岁以上甲低患者 X 光骨龄摄片的部位应是
A. 腕部
B. 膝部
C. 踝部
D. 髋部
E. 肘部
580. 子宫内膜癌，首选治疗方法是
A. 激素治疗
B. 放射治疗
C. 化学治疗
D. 手术治疗
E. 中药治疗
581. 子宫颈癌最早出现的症状是
A. 尿频尿急
B. 接触性出血
C. 进行性下肢肿痛
D. 大量米汤样恶臭白带
E. 绝经后长期阴道流血
582. 关于葡萄胎的概念，正确的是
A. 葡萄胎的发生与卵子无关
B. 完全性葡萄胎核型为二倍体，均来自母系
C. 部分性葡萄胎核型多为四倍体

- B. 孕期严重缺钙
- C. 生出低体重儿
- D. 胎儿神经管畸形
- E. 伴有严重锌缺乏

574. 子宫内膜异位症最常见的发病部位是

- A. 直肠
- B. 膀胱
- C. 卵巢
- D. 输卵管
- E. 阴道

575. 初产妇，26岁。妊娠38周，不完全臀先露，胎心良好，胎膜未破，估计胎儿体重大于 $> 3800\text{g}$ ，最恰当的处理方法是

- A. 等待自然分娩
- B. 阴道镜检查
- C. 缩宫素静脉滴注
- D. 人工破膜

- E. 行剖宫产术

576. 初产妇第一产程潜伏期延长是指潜伏期超过

- A. 8h
- B. 10h
- C. 12h
- D. 14h
- E. 16h

577. 阴道分泌物呈稀薄、黄绿色、脓性泡沫状，最常见于

- A. 慢性宫颈炎
- B. 老年性阴道炎
- C. 滴虫性阴道炎
- D. 细菌性阴道病
- E. 外阴阴道假丝酵母菌病

578. 前置胎盘最安全可靠的诊断方法是

568. 下列哪项与羊水过多无关

- A. 糖尿病
- B. 多胎妊娠
- C. 胎儿消化道畸形
- D. 胎儿泌尿道畸形
- E. 重度母儿血型不合

569. 死胎的常见原因不包括

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. IUGR
- D. 头盆不称
- E. 妊高症

570. 妊高症最常见的产科并发症是

- A. 胎盘早期剥离
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 妊高症性心脏病
- D. 视网膜剥离

- E. HELLP综合征

571. 绘制妊娠图的项目不包括

- A. 血压
- B. 腹围
- C. 胎心率
- D. 孕妇心率
- E. 胎头双顶径

572. 与前置胎盘的病因无关的是

- A. 子宫内膜炎
- B. 子痫前期
- C. 多胎
- D. 受精卵滋养层发育迟缓
- E. 副胎盘

573. 叶酸是体内重要的维生素，孕妇体内水平过低最严重的潜在危害是

- A. 妊娠高血压疾病

563. 关于子痫前期，错误的是
- A. 与遗传因素有关
 - B. 基本病理生理变化是全身小血管痉挛
 - C. 近来研究发现低胰岛素血症与发生高血压疾病可能有关
 - D. 部分子痫前期可出现肝功能异常，甚至肝包膜下血肿
 - E. 妊娠中期开始补充维生素E和维生素C可降低其发生率

564. 下列哪项不符合前置胎盘的表现
- A. 先露下降受阻
 - B. 无痛性阴道流血
 - C. 子宫下段闻及胎盘血流音
 - D. 子宫张力较高，胎心音不易闻及
 - E. 宫底高度与孕周相符

565. 属于孕激素生理作用的是
- A. 使阴道上皮细胞脱落加快

- B. 使宫颈黏液变稀薄
- C. 使子宫肌层增厚
- D. 使子宫内膜增生
- E. 使血循环中胆固醇水平降低

566. 关于女性青春期的生理特点，正确的是
- A. 月经初潮
 - B. 卵巢体积无明显变化
 - C. 乳房发育一般在月经初潮之后
 - D. 肾上腺功能无明显变化
 - E. 性腺轴功能已成熟

567. 产生人绒毛膜促性腺激素的部位是
- A. 底蜕膜细胞
 - B. 包蜕膜细胞
 - C. 真蜕膜细胞
 - D. 胎盘细胞滋养细胞
 - E. 胎盘合体滋养细胞

- 247·
559. 妊娠合并尖锐湿疣，下列哪项不正确
- A. 孕期尖锐湿疣数目多、病灶大、多形态
 - B. 大多数感染发生在下生殖道
 - C. 以病灶局部治疗为主
 - D. 可发生母儿垂直传播
 - E. 以全身用药治疗为主
560. 前置胎盘行剖宫产手术前，做B超最主要目的是
- A. 估计胎儿大小
 - B. 检查胎盘成熟度
 - C. 检查羊水量

- D. 判断是否需要新生儿保胎
- E. 判定胎盘位置

561. 异位妊娠时，以下哪项适合化疗
- A. 异位妊娠包块≤6cm
 - B. 血β-HCG<2000U/L
 - C. 间质部妊娠
 - D. 患者已休克
 - E. 腹痛剧烈

562. 子痫前期重度患者，血细胞比容0.41，心率86次/分，血红蛋白98g/L，白蛋白21g/L，血钾、钠、氯正常，扩容剂应选
- A. 右旋糖酐
 - B. 全血
 - C. 白蛋白
 - D. 林格液
 - E. 10%葡萄糖液

553. 正常恶露一般持续时间为

- A. 1 ~ 3 周
- B. 2 ~ 4 周
- C. 3 ~ 5 周
- D. 4 ~ 6 周
- E. 5 ~ 7 周

554. 产后血容量恢复至未孕状态的时间是

- A. 1 ~ 2 周
- B. 1 ~ 4 周
- C. 3 ~ 4 周
- D. 2 ~ 5 周
- E. 2 ~ 3 周

555. 关于子宫峡部，下列哪项是错误的

- A. 峡部上端为解剖学内口
- B. 峡部下端为组织学内口
- C. 峡部下端为解剖学内口
- D. 子宫体与子宫颈之间最狭窄部分

E. 子宫峡部于妊娠晚期伸展为子宫下段

556. 淋病孕妇经阴道分娩的新生儿不会发生

- A. 结膜炎
- B. 角膜溃疡
- C. 肺炎
- D. 败血症
- E. 耳聋

557. 关于子宫，正确的是

- A. 成年的子宫长 7 ~ 8cm，宽 4 ~ 5cm，厚 4 ~ 5cm
- B. 子宫体与子宫颈的比例，成年人为 1:2
- C. 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分为子宫峡部
- D. 子宫峡部的上端是组织学内口
- E. 产妇的子宫颈外口是圆形

558. 目前世界上发病率最高的性传播疾病是

·243· 549. 由子宫颈到骨盆侧壁的韧带是

- A. 圆韧带
- B. 卵巢固有韧带
- C. 骨盆漏斗韧带
- D. 子宫骶骨韧带
- E. 主韧带

550. 属于产褥感染的项目，正确的是

- A. 产褥期病原体侵入全身任何组织、器官和系统，造成的局部和全身炎性改变的疾病
- B. 产褥期病原菌侵入生殖道，引起局部或全身炎症改变的疾病
- C. 产褥期病原体侵入生殖道和乳腺组织，造成的局部和全身炎性改变的疾病
- D. 产褥感染病原体侵入的范围仅局限于盆腹腔及女性生殖道
- E. 产褥期病原菌侵入生殖道，造成局部

炎性改变的疾病

551. 属于晚期产后出血的项目，正确的是

- A. 分娩 24 小时后，在产褥期内发生的阴道大量出血
- B. 分娩 24 小时后，在产褥期内发生的子宫出血
- C. 分娩 24 小时后，在产褥期内发生的子宫大量出血
- D. 分娩 24 小时后发生的子宫大量出血
- E. 产褥期内发生的子宫大量出血

552. 卵巢的形态学特征，正确的是

- A. 成年妇女卵巢重约 5 ~ 6g
- B. 卵巢表面有腹膜覆盖
- C. 卵巢白膜是一层平滑肌组织
- D. 髓质内含数以万计的原始卵泡
- E. 卵巢内侧以骨盆漏斗韧带与子宫相连

E. 种植转移

545. 卵巢囊肿发生蒂扭转时，其蒂的组成是
- A. 骨盆漏斗韧带，输卵管，卵巢固有韧带，圆韧带
 - B. 骨盆漏斗韧带，输卵管，卵巢固有韧带
 - C. 骨盆漏斗韧带，卵巢韧带，圆韧带
 - D. 骨盆漏斗韧带，输卵管，圆韧带
 - E. 输卵管，卵巢韧带

546. 关于神经管缺陷，下列说法正确的是

- A. 神经管缺陷可通过中孕期血清学筛查得到诊断
- B. 神经管缺陷的诊断主要通过羊水穿刺测定甲胎蛋白
- C. 孕3个月后补充叶酸可有效预防神经管缺陷

D. 神经管缺陷主要通过高分辨率超声诊断

E. 孕前及早孕期补充叶酸可预防唇腭裂，但对神经管缺陷的发生率没有影响

547. 维持子宫前倾位置的主要韧带是

- A. 阔韧带
- B. 子宫圆韧带
- C. 卵巢固有韧带
- D. 主韧带
- E. 子宫骶骨韧带

548. 胎儿NT增厚的原因不包括

- A. 21-三体综合征
- B. 特纳综合征
- C. 18-三体综合征
- D. 先天性心脏病
- E. 先天性代谢病

D. 结石

E. 先天性肾盂输尿管连接部狭窄

540. 强心甙治疗心房纤颤的机制主要是

- A. 缩短心房有效不应期
- B. 减慢房室传导
- C. 抑制窦房结
- D. 直接抑制心房纤颤
- E. 延长心房不应期

541. 心房颤动患者服用华法林，凝血酶原时间的国际标准化率（INR）应控制在

- A. 1.1
- B. 2.2
- C. 3.3
- D. 3.4
- E. > 4

542. 心房颤动最常见于

A. 冠心病

B. 风心病二尖瓣狭窄

C. 高心病

D. 甲状腺心脏病

E. 缩窄性心包炎

543. 无尿为24小时尿量少于多少

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

544. 原发性肝癌最主要的播散途径是

- A. 肝内门静脉系统
- B. 血液系统
- C. 淋巴系统
- D. 直接转移

535. 女性，43岁，在行上下眼睑成形术后出现复视、向上外活动力弱，下列哪块肌肉最可能受到了损伤

- A. 下斜肌
- B. 上斜肌
- C. 下直肌
- D. 外直肌
- E. 上直肌

536. 前列腺增生症合并急性尿潴留，并有明显肾功能不全，首选应如何处理

- A. 留置导尿管，积极纠正水电解质和酸碱平衡失调
- B. 膀胱穿刺抽尿
- C. 膀胱造瘘
- D. 雌激素治疗
- E. 前列腺切除

537. 患者右侧腰背痛，初次就诊发现右输尿

管结石一枚，1cm大小，右肾轻度积水，一般情况好，宜先作何处理

- A. 输尿管镜气压弹道碎石
- B. 立即输尿管切开取石
- C. 体外震波碎石
- D. 保守治疗
- E. 不处理

538. 多尿是指24小时尿量超过多少

- A. 2000ml
- B. 2500ml
- C. 3000ml
- D. 3500ml
- E. 4000ml

539. 引起输尿管梗阻最常见的病因为

- A. 炎症
- B. 肿瘤
- C. 结核

531. 男性，19岁。寒战、发热，咳脓痰3天。体温40℃，X线胸片示：右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。体格检查中不应该有的体征是

- A. 气管移向健侧
- B. 右胸叩诊浊音
- C. 右胸活动度小
- D. 右胸肋间隙变窄
- E. 右肺呼吸音减弱

532. 男性，29岁。刺激性咳嗽1个月，头痛10天。胸片显示：左肺门块状阴影，颅脑CT发现颅内占位性病变。考虑肺癌脑转移，肺内原发癌最可能的病理类型是

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌

E. 细支气管肺泡癌

533. 以下关于增生性瘢痕与瘢痕疙瘩，不正确的是

- A. 二者的好发部位一致
- B. 瘢痕疙瘩无自然消退的倾向
- C. 增生性瘢痕范围不超过原病损区
- D. 二者组织中I型胶原成分均超过Ⅲ型胶原
- E. 瘢痕疙瘩切除后易复发

534. 伴有骨外露的胫前部溃疡，首选治疗措施为

- A. 局部清创
- B. 游离皮肤移植
- C. 肌瓣或肌皮瓣移植
- D. 截肢
- E. 延期皮片移植

527. 男性患者，因外伤致股骨内外髁骨折，关节面不平，相差 0.8cm，虽经治疗，骨折移位未见改变，最可能出现的晚期并发症是

- A. 骨化性肌炎
- B. 膝疮
- C. 膝关节创伤性关节炎
- D. 膝关节僵硬
- E. 膝关节外翻畸形

528. 胫腓骨中 1/3 骨折患者，复位后，用长腿石膏管固定，4 个月骨折愈合拆除石膏后，发现膝关节功能发生障碍，其原因是

- A. 肌肉萎缩
- B. 关节僵硬
- C. 关节强直
- D. 骨折复位不理想
- E. 骨折畸形愈合

529. 进行性血胸特点不包括

- A. 反常呼吸运动
- B. 胸腔内压进行性增高
- C. 静脉压升高，心搏微弱、动脉压降低
- D. 呼吸时的纵隔扑动
- E. 胸腔引流血量 > 200ml/h，连续 3h

530. 女性，23 岁。寒战、高热，咳脓痰 2 天。

查体：体温 39.2℃，左肺闻及湿啰音，X 线胸片示：左肺下叶大片状致密影，给予抗生素治疗。2 天后症状加重，胸痛并呼吸困难，左胸呼吸音降低，胸片示：左胸腔积液。治疗中的错误方法是

- A. 胸膜腔穿刺
- B. 全身支持治疗
- C. 应用广谱抗生素
- D. 胸膜腔闭式引流
- E. 胸膜腔开放引流

切开筋膜减压

522. 腹部反跳痛的发生机制是

- A. 肠腔胀气
- B. 内脏肿大、充血
- C. 肿瘤淋巴结转移
- D. 炎症波及腹膜壁层
- E. 胆管结石并梗阻

523. 骨折后最易发生骨缺血性坏死的部位是

- A. 股骨头
- B. 肱骨头
- C. 桡骨远端
- D. 锁骨远端
- E. 胫骨内髁

524. 腹泻至少超过多长时间称为慢性腹泻

- A. 5 个月
- B. 4 个月

C. 3 个月

D. 2 个月

E. 1 个月

525. 股骨干骨转移瘤合并病理性骨折时，为减轻骨折的症状，应采用

- A. 皮牵引
- B. 患肢抬高，置下肢外展屈曲位
- C. 髓内针固定
- D. 石膏外固定
- E. 夹板固定

526. 胃肠粘膜分泌过多液体引起的腹泻称为

- A. 动力性腹泻
- B. 吸收不良性腹泻
- C. 渗出性腹泻
- D. 渗透性腹泻
- E. 分泌性腹泻

感抗生素后，实验室检查结果均未改善，下一步应采取哪种方法处理

- A. 病毒检查
- B. 结核菌培养
- C. 高渗培养
- D. 再次药敏试验，选择敏感抗生素
- E. 静脉肾孟造影了解是否肾脏结构改变

518. 根据骨折是否与外界相通，可把骨折分为

- A. 外伤性骨折和不稳定性骨折
- B. 压缩性骨折和横行骨折
- C. 稳定性骨折和不稳定性骨折
- D. 完全性骨折和不完全性骨折
- E. 开放性骨折和闭合性骨折

519. 仰卧位时腹痛明显，前倾位或俯卧位时减轻，提示何种疾病

- A. 十二指肠淤滞症

血小板 $30 \times 10^9/L$ 。血片破碎红细胞 2.2%，凝血酶原时间延长，纤维蛋白原含量减低，3P 试验阳性。该患者最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 敏感性紫癜
- C. 播散性血管内凝血
- D. 药物免疫性血小板减少性紫癜
- E. APL 合并播散性血管内凝血

515. 男，40岁，乏力、消瘦3个月，肝大，脾肋下 1.5cm，Hb80g/L，WBC $24.0 \times 10^9/L$ ，分类：原粒 1%，早幼粒 6%，中幼粒 12%，晚幼粒 13%，杆状核 28%，分叶核 26%，嗜酸晚幼粒 2%，嗜碱 5%，PLT $500 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞碱性磷酸酶积分 0 分，骨髓有核细胞增生极度活跃，G/E=7:1，中幼粒比值增高，嗜酸、嗜碱

- B. 胰体癌
- C. 反流性食管炎
- D. 胃粘膜脱垂
- E. 胃溃疡

520. 最容易引起骨折不连接的移位是

- A. 成角移位
- B. 侧方移位
- C. 分离移位
- D. 旋转移位
- E. 嵌插移位

521. 骨筋膜室综合征最主要的治疗措施是

- A. 给予血管舒张剂，消除血管痉挛
- B. 抬高患肢，以利消肿
- C. 被动按摩，以利消肿
- D. 做臂位麻醉，解除血管痉挛
- E. 解除包扎固定物，经观察不见好转，

细胞高于正常，巨核细胞成堆易见，首先选择的治疗是

- A. 羟基脲
- B. 马利兰
- C. 白消安
- D. 瘤可宁
- E. 环磷酰胺

516. 中年患者，轻度贫血，脾大平脐，NAP 活力减低，最可能诊断为

- A. 慢性淋巴细胞白血病
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 淋巴瘤
- D. 原发性骨髓纤维化
- E. 脾功能亢进

517. 慢性肾盂肾炎患者，尿培养为变形杆菌，尿沉渣：白细胞 5~10 个 /HP，经严格内科治疗，症状可暂时缓解，但选用敏

- B. 支气管扩张
C. 慢性支气管炎
D. 重症肺结核
E. 尘肺
510. 诊断慢性支气管炎的主要依据是
A. 病史和症状
B. 阳性体征
C. 胸部X线检查
D. 心电图改变
E. 肺功能检查
511. 腹痛发生的三种基本机制是
A. 急性腹痛、慢性腹痛和牵涉痛
B. 腹腔内、腹腔外和全身性疾病
C. 内脏性腹痛、躯体性腹痛和牵涉痛
D. 内脏性腹痛、反射性腹痛和牵涉痛
E. 神经性腹痛、反射性腹痛和牵涉痛
512. 静息时，神经膜对离子的通透性表现为
A. 对钠通透性较大
B. 对氯通透性较大
C. 对钾通透性较大
D. 对钾通透性较小
E. 对钙通透性较大
513. 男性，30岁，阵发性心悸2年，每次突然发生，持续30分钟~1小时不等。查体：心率200次/分，律齐。ECG：QRS波形正常，P波不能明确查见。诊断为
A. 心房颤动
B. 窦性心动过速
C. 心房扑动
D. 室性心动过速
E. 阵发性室上性心动过速
514. 男性，38岁。确诊为急性早幼粒细胞白血病。化疗后牙龈出血，皮肤片状瘀斑。

- 223·
- A. 呈急性肾炎综合征
B. 肾功能急剧转坏
C. 早期出现少尿性急性肾功能衰竭
D. 数周至半年进展至尿毒症
E. 常无贫血表现
505. 心底部听诊最清晰的心音是
A. 第一心音
B. 第二心音
C. 第三心音
D. 第四心音
E. 第五心音
506. 临幊上对肾综合征出血热多尿期低血钾的监测有很多方法，下列哪项是错的
A. 心电
B. 胸透
C. 血钾
D. 入量
- E. 尿量
507. 高抬下肢可增强、坐位或立位可减弱或消失的心音是
A. 第一心音
B. 第二心音
C. 第三心音
D. 第四心音
E. 第五心音
508. 阻塞性肺气肿的病理分型是
A. 小叶中央型、全小叶型、周围型
B. 弥漫型、局限型、混合型
C. 间质型、代偿型、局灶型
D. 小叶中央型、全小叶型、混合型
E. 小叶中央型、全小叶型、旁间隔型
509. 阻塞性肺气肿最常见的病因是
A. 支气管哮喘
- 224·

499. 心脏触诊关于震颤的描述，哪项错误
- A. 震颤又称猫喘
 - B. 器质性心脏病不一定有震颤
 - C. 震颤肯定有器质性心脏病
 - D. 有震颤可一定能听到杂音
 - E. 听到杂音一定能触到震颤
500. 心脏瓣膜 Erb 听诊区又称
- A. 二尖瓣听诊区
 - B. 肺动脉瓣听诊区
 - C. 主动脉瓣听诊区
 - D. 主动脉瓣第二听诊区
 - E. 三尖瓣听诊区
501. 可区别膀胱炎和急性肾盂肾炎的是
- A. 发烧、畏寒、寒战等全身症状
 - B. 甲状腺激素增多
 - C. 运铁蛋白
 - D. 血磷升高
- E. 促红细胞生成素减少
502. 急进性肾炎临床表现最突出的是
- A. 水肿
 - B. 高血压
 - C. 少尿或无尿
 - D. 肾病综合征
 - E. 心包摩擦音
503. 慢性肾炎患者血压 21.2/13.3kPa，轻度浮肿，首选
- A. 肝苯达嗪
 - B. 利血平
 - C. 双氢克尿噻
 - D. 呃乙啶
 - E. 安体舒通
504. 下列哪项不支持急进性肾小球肾炎的诊断

494. 下列治疗白血病的措施，哪项是不对的
- A. 严重贫血时，输注成份血
 - B. 严重贫血可肌注 VitB、叶酸
 - C. 感染时可采用抗生素治疗
 - D. 化学药物治疗
 - E. 骨髓移植治疗
495. 急性淋巴细胞性白血病患者，下列首选的治疗是
- A. 长春新碱，强的松，左旋门冬酰胺酶
 - B. 阿糖胞苷，柔红霉素，三尖杉酯碱
 - C. 左旋门冬酰胺酶，长春新碱，三尖杉酯碱
 - D. 三尖杉酯碱，环磷酰胺，阿霉素
 - E. 阿霉素，三尖杉酯碱，阿糖胞苷
496. Auer 小体不见于下列哪种白血病
- A. 急性粒细胞白血病
 - B. 急性淋巴细胞白血病
497. 心脏触诊检查震颤，通用的正确手法是用
- A. 全手掌
 - B. 手掌尺侧
 - C. 手掌桡侧
 - D. 2 ~ 4 指指腹
 - E. 拇指指腹
498. 肺通气的原动力是
- A. 胸内压的变化
 - B. 肺主动舒缩
 - C. 外界环境与肺内压力差
 - D. 呼吸肌的舒缩
 - E. 肺泡表面活性物质的作用

E. 面神经

489. 继发性低颅压性头痛最常见原因是

- A. 脑室分流术后
- B. 硬膜或腰椎穿刺后
- C. 头颈部外伤后 CSF 外漏
- D. 低血压
- E. 脑膜脑炎

490. 正常人立位或坐位时，颈外静脉在锁骨上缘至下颌角间的充盈水平是

- A. 常不显露
- B. 下 2/3 以内
- C. 下 1/2 以内
- D. 下 1/3 以内
- E. 下 2/5 以内

491. 预防偏头痛的药物不包括

- A. 阿米替林

B. 奋乃静

- C. 丙戊酸钠
- D. 氟桂利嗪
- E. 普萘洛尔

492. 关于急性白血病发病与下列哪种因素最有关

- A. 输血
- B. 输白蛋白
- C. 患甲型肝炎
- D. 他巴唑
- E. 苯制剂

493. 颈外静脉怒张伴收缩期搏动见于

- A. 三尖瓣关闭不全
- B. 三尖瓣狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣关闭不全

484. 以下关于神经系统症状的说法，正确的是

- A. 许多神经系统症状可以由其他系统疾病引起
- B. 神经系统的疾病不会以其他系统或器官的症状作为主诉
- C. 昏迷基本上都是中枢神经系统疾病引起的
- D. 抽搐肯定是神经系统疾病引起的
- E. 病人出现烦躁不安等精神症状通常是由合并了神经系统疾病

485. 临床最常见的原发性头痛是

- A. 偏头痛
- B. 紧张型头痛
- C. 丛集性头痛
- D. 三叉自主神经头痛
- E. 其他原发性头痛

486. 丝虫病时，产生水肿的主要因素是

- A. 毛细血管滤过压增高
- B. 毛细血管通透性增高
- C. 钠与水的潴留
- D. 血浆胶体渗透压降低
- E. 淋巴液回流受阻

487. 偏头痛持续状态是指

- A. 偏头痛发作持续时间 ≥ 6 小时
- B. 偏头痛发作持续时间 ≥ 12 小时
- C. 偏头痛发作持续时间 ≥ 24 小时
- D. 偏头痛发作持续时间 ≥ 48 小时
- E. 偏头痛发作持续时间 ≥ 72 小时

488. 眼肌麻痹性偏头痛最常累及的神经是

- A. 视神经
- B. 外展神经
- C. 动眼神经
- D. 滑车神经

- C. 动态观察 CSF 变化以助判断病情、预后及指导治疗
D. 怀疑后颅窝存在占位性病变
E. 注入放射性核素行脑、脊髓扫描
480. 哪种不属于腰穿禁忌证
A. 颅内压明显升高，或已有脑疝迹象，特别是怀疑后颅窝存在占位性病变
B. 穿刺部位有感染灶、脊柱结核或开放性损伤
C. 明显出血倾向或病情危重不宜搬动
D. 脊髓压迫症的脊髓功能处于即将丧失的临界状态
E. 低颅压综合征
481. 防止低颅压综合征不适当的措施是
A. 使用细针穿刺
B. 放液量一般为 2~4ml，不超过 10ml
- E. 精神性
475. 完全性房室传导阻滞伴黑矇患者，最合适的长期治疗应选择
A. 硫酸阿托品
B. α 受体激动药
C. β 受体激动药
D. 抗血小板药物
E. 心脏起搏器
476. “水肿”这一术语不包括下列哪种情况
A. 阴囊积水
B. 腹腔积水
C. 心包积水
D. 胸腔积水
E. 脑水肿
477. 造成急性心肌梗死时出现窦性停搏的常见病变血管是
- C. 术后至少去枕平卧 4~6 小时
D. 熟练掌握穿刺技术
E. 术后即刻起床
482. 右心衰竭时，产生水肿的主要始动因素是
A. 毛细血管滤过压增高
B. 毛细血管通透性增高
C. 水与钠潴留
D. 血浆胶体渗透压降低
E. 淋巴液回流受阻
483. 脑脊液蛋白含量增高少见于
A. 化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎
B. 吉兰 - 巴雷综合征
C. 双侧基底节钙化
D. 脑出血、蛛网膜下腔出血
E. 椎管梗阻
- A. 右冠状动脉病变
B. 左冠状动脉主干病变
C. 左冠状动脉前间隔支
D. 左冠状动脉回旋支
E. 对角支
478. 原发性醛固酮增多症时，产生水肿的主要始动因素是
A. 毛细血管滤过压增高
B. 毛细血管通透性增高
C. 水与钠潴留
D. 血浆胶体渗透压降低
E. 淋巴液回流受阻
479. 哪种不属于腰穿适应证
A. 留取 CSF 做各种检查以助中枢神经系统疾病的诊断
B. 测量颅内压或行动力学试验以明确颅内压高低及脊髓腔、横窦通畅情况

- C. 肝不肿大
D. 双下肢水肿程度不一致
E. 下肢皮肤呈暗紫色
470. 目前认为下述哪种疾病与胃癌的发生关系密切
A. 浅表性胃炎
B. 糜烂性胃炎
C. 疣状胃炎
D. 萎缩性胃炎
E. 肥厚性胃炎
471. 早期胃癌的概念是指
A. 癌组织仅限于黏膜层
B. 胃的原位癌
C. 癌组织浸润限于黏膜层及黏膜下层
D. 癌组织浸润限于浅肌层
E. 无局部淋巴结转移
472. 引起日本血吸虫病最严重病变的是
A. 成虫和虫卵
B. 虫卵
C. 毛蚴
D. 尾蚴和成虫
E. 童虫
473. 心脏传导系统中，哪一部分传导最快
A. 结间束
B. 房室结
C. 希氏束
D. 左右束支
E. 浦肯野纤维
474. 按发生机制，双吸气见于哪类呼吸困难
A. 肺源性
B. 心源性
C. 中毒性
D. 呼吸中枢性

- 207 ·
- E. 增强机体应激性
466. 男，60岁，有肺气肿史。高热、咳嗽1周，伴气急发绀，痰为脓性带血，呈胶冻状。可能的诊断是
A. 支原体肺炎
B. 浸润型肺结核
C. 肺炎球菌肺炎
D. 肺炎杆菌肺炎
E. 军团菌肺炎
467. 小儿8个月，蜡黄，虚胖，手足颤抖，肝肋下2cm，红细胞 $2.1 \times 10^{12}/L$ (210万/mm³)，血红蛋白80g/L(8g/dl)，治疗应选择
A. 输血
B. 镇静剂
C. 维生素B₁₂肌注
D. 口服叶酸
- 208 ·
- E. 口服铁剂
468. 过期产儿，负压吸引助产，生后呼吸浅，不规则，有暂停，肌张力低下，最可能是
A. 新生儿吸入性肺炎
B. 小脑幕下出血
C. 小脑幕上出血
D. 新生儿化脓性脑膜炎
E. 新生儿低血糖症
469. 女，40岁，下肢水肿。查体：心尖区局限性舒张期隆隆样杂音，肺部听诊正常，肝大(-)，腹水(-)。双下肢水肿(+)，皮肤呈暗紫色，右侧重于左侧。月经期未检查尿。该患者排除心源性水肿的主要依据是
A. 无心尖区收缩期杂音
B. 肺听诊正常

- A. 响亮性湿啰音
B. 粗湿啰音
C. 中湿啰音
D. 细湿啰音
E. 痰鸣音
462. 钠离子由细胞内液进入细胞外的转运方式是
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 入胞作用
D. 被动转运
E. 主动转运
463. 女，20岁，心悸、气促、下肢水肿4年。查体：BP90/70mmHg，心音低弱。X线示：心影大小正常，左、右心缘变直，心包钙化。心脏超声可见到
A. Murphy征
- B. Grey-Turner征
C. Ewart征
D. Broadbent征
E. Cullen征
464. 诊断新生儿颅内出血，哪项是错误的
A. 窒息史
B. 产伤史
C. 脑性尖叫
D. 前囟紧张
E. 脑脊液检查正常可除外颅内出血
465. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是
A. 增强抗生素的抗菌作用
B. 增强机体防御能力
C. 拮抗抗生素的某些副作用
D. 用激素缓解症状，渡过危险期，用抗生素控制感染

- 203-
- B. 维持红细胞正常形态
C. 维持红细胞正常体积
D. 维持红细胞内外的水分布
E. 维持毛细血管内外的水分布
457. 能防止或逆转血管壁增厚和心肌肥大的抗高血压药是
A. 利尿药
B. β 受体阻断药
C. 血管紧张素转化酶抑制剂
D. 氯沙坦
E. 钙拮抗剂
458. 引起二氧化碳潴留的主要机制是
A. 动静脉分流
B. 通气不足
C. 无效腔通气
D. 通气/血流比例失调
E. 弥散障碍
459. 女性，40岁，参加婚宴后右上腹痛，呈剧烈绞痛，查体见表情痛苦不安。对该患者紧急又有价值的处置是
A. 镇痛药止痛
B. 抗生素消炎
C. 急查血常规
D. 行PTC检查
E. 紧急行腹部超声检查
460. 治疗立克次体感染应首选
A. 青霉素
B. 氯霉素
C. 四环素
D. 庆大霉素
E. 红霉素
461. 男，70岁，冬季咳嗽3~4年。2天前发热，咳嗽、咳痰，查体可见肺气肿体征，该患者可能听到的啰音是
- 204-

452. 女, 45岁, 反复咳嗽、咳脓痰20余年。支气管造影证实右下、左下叶支气管扩张。近1周发热, 痰量增多, 下列哪项处理是错误的

- A. 应用祛痰药
- B. 手术治疗
- C. 体位引流
- D. 选用敏感抗生素
- E. 痰细菌学检查

453. 男, 62岁, 10年前体检曾被告知患心脏病, 近1~2年来心前区不适、心悸逐渐加重。查体: BP160/60mmHg, 心浊音界增大, 呈靴型。该患者心脏靴型增大说明

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 动脉导管未闭
- C. 主动脉瘤
- D. 主动脉瓣关闭不全

E. 由简单到复杂

447. 使纤维蛋白(原)降解的物质是

- A. 纤溶酶原激活物
- B. 纤溶酶
- C. 凝血酶
- D. 凝血活酶
- E. 蛋白激酶

448. 胆汁中与消化有关的最重要物质是

- A. 消化酶
- B. 胆盐
- C. 卵磷脂
- D. 胆色素
- E. 脂肪酸

449. 运动单位是指

- A. 一个运动神经元
- B. 一组具有相同机能的运动神经元群

E. 陈旧性心肌梗死

454. 小儿复种卡介苗, 维持机体对结核菌的免疫力, 主要是通过

- A. 增强细胞免疫
- B. 增强体液免疫
- C. 促进白细胞的吞噬能力
- D. 提高 IgG 水平
- E. 促进干扰素的形成

455. 引起大叶性肺炎最常见病原菌为

- A. 葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 肺炎克雷伯杆菌
- E. 结核菌

456. 血浆胶体渗透压的主要生理作用是

- A. 决定血浆的总渗透压

C. 一组具有相同机能的肌群

- D. 一个 α 运动神经元及其所支配的全部肌纤维
- E. 一对具有相互拮抗机能的肌群

450. 小儿初次感染结核杆菌至产生变态反应的时间是

- A. 48~72小时
- B. 2~3周
- C. 4~8周
- D. 10~12周
- E. 3~4个月

451. 心肌的有效不应期指

- A. 从除极相开始到复极达 -55mV
- B. 从除极相开始到复极达 -60mV
- C. 从复极 -55mV 到 -60mV
- D. 从复极 -60mV 到 -80mV
- E. 从复极 -80mV 到 -90mV

- 振动
E. 心室收缩时，射入大动脉的血液冲击管壁所引起的振动
442. 动脉导管未闭脉压差增大的主要原因是
A. 心脏存在着异常的通道
B. 主动脉的血分流至肺动脉
C. 肺循环血流量的明显增多
D. 体循环血流量的明显减少
E. 收缩压的明显升高
443. 关于血管作用的描述，错误的是
A. 参与一期止血
B. 激活血小板
C. 促凝作用
D. 抗血栓
E. 不参与凝血的调节
444. 女性生殖器恶性肿瘤放疗效果最好的是

- A. 子宫肉瘤
B. 子宫内膜腺癌
C. 卵巢无性细胞瘤
D. 卵巢未成熟畸胎瘤
E. 绒毛膜癌
445. 评价肺通气功能，下列哪个指标较好
A. 潮气量
B. 时间肺活量
C. 深吸气量
D. 补呼气量
E. 肺活量

446. 不符合生长发育一般规律的是
A. 由下到上
B. 由近到远
C. 由粗到细
D. 由低级到高级

- E. 血氧含量与氧分压关系的曲线
437. 对造血细胞无正向调节作用的细胞因子是
A.EPO
B.TPO
C.IL
D.TGF- β
E.SCF
438. 不属于细菌基本结构的是
A.鞭毛
B.细胞质
C.细胞膜
D.核质（拟核）
E.细胞壁
439. 符合肺气肿 A 型表现的是
A.年龄较轻
- B.桶状胸不明显
C.PaO₂ 明显降低
D.全小叶型肺气肿
E.PaCO₂ 常明显升高
440. 骨骼肌能否发生强直收缩决定于
A.刺激时间
B.刺激频率
C.刺激强度变化率
D.刺激类型
E.刺激方式
441. 听诊时听到的第二心音主要是由下列哪一因素产生
A.心室收缩时，房室瓣突然开放所致的振动
B.心室收缩时，房室瓣关闭引起的振动
C.心室舒张时，动脉瓣关闭引起的振动
D.心室舒张时，动脉瓣突然开放引起的

- A. 主动转运
B. 被动扩散
C. 滤过
D. 易化扩散
E. 胞饮
433. 关于排卵，正确的是
A. 排卵多发生在下次月经来潮前 14 天左右
B. 妇女自青春期开始周期性规律排卵
C. 在 FSH 作用下黄体形成
D. 每一月经周期，每个卵巢排出一个卵子
E. 卵巢排出卵子直接进入输卵管
434. 机体对外毒素免疫作用是依靠抗毒素的
A. 调理作用
B. 粘附作用
C. 中和作用
D. 灭活作用
E. 清除作用
435. 新生儿溶血症可能发生在
A. Rh 阳性母亲所生 Rh 阴性婴儿
B. Rh 阳性母亲所生 Rh 阳性婴儿
C. Rh 阴性母亲所生 Rh 阳性婴儿
D. Rh 阴性母亲所生 Rh 阴性婴儿
E. 以上都不是
436. 氧离曲线是表示
A. 血红蛋白氧饱和度与氧含量关系的曲线
B. 血红蛋白氧饱和度与氧分压关系的曲线
C. 血氧含量与血氧容量关系的曲线
D. 血氧容量与氧分压关系的曲线
E. 以乙型肝炎病毒、风疹病毒等为多见
437. 口服避孕药后不规则出血，正确的处理方法是
A. 加服少量雌激素
B. 需立即停药
C. 加服少量孕激素
D. 加服少量雄性激素
E. 加倍服药
438. 窦房结能成为心脏正常起搏点的原因是
A. 阈电位为 -40mV
B. 静息电位仅为 -70mV
C. 0 期去极速度快
D. 4 期电位自动去极速率快
E. 动作电位没有明显的平台期
439. 关于垂直感染，以下哪项不正确
A. 感染传播途径是产道或胎盘
B. 感染方式是亲代直接传给子代
C. 感染的后果可能是死胎、早产或先天畸形等
D. 是病毒独特的感染方式
440. 口服药物通过胃肠道粘膜细胞主要以何种方式吸收
A. 主动转运
B. 被动扩散
C. 滤过
D. 易化扩散
E. 胞饮

E. 黏膜上皮细胞

423. 缺乏下列哪种 T 细胞，则 B 细胞不能产生抗体或产生低水平的抗体

- A. 辅助性 T 细胞
- B. 抑制性 T 细胞
- C. 杀伤 T 细胞
- D. 细胞毒性 T 细胞
- E. 以上均不正确

424. 血型是指

- A. 红细胞上受体的类型
- B. 红细胞表面特异凝集原的类型
- C. 红细胞表面特异凝集素的类型
- D. 血浆中特异凝集原的类型
- E. 血浆中特异凝集素的类型

425. 骨骼肌中 Ca 离子的结合位点是

- A. 肌纤蛋白

B. 原肌凝蛋白

C. 肌钙蛋白亚单位 I

D. 肌钙蛋白亚单位 C

E. 肌钙蛋白亚单位 T

426. 急性链球菌感染后肾小球肾炎生化改变意义最大的是

- A. 抗“O”明显升高
- B. 血沉升高
- C. 血 IgG 升高
- D. 血白蛋白下降
- E. 血 C3 明显下降

427. 抗原的免疫原性是指

- A. 刺激机体免疫系统，产生抗体的性能
- B. 刺激机体免疫系统，产生致敏淋巴细胞的性能
- C. 与相应抗体在体内外特异性结合的能力

A. 粘液性水肿伴腹水

- B. 丝虫病伴腹水
- C. 卵巢纤维瘤伴腹水
- D. 低蛋白血症伴腹水
- E. 腹腔淋巴瘤伴腹水

419. 50 岁女性，突发剧烈头痛、呕吐，发作性左侧肢体麻木，抽搐一次，血压 26/17kPa，头 CT 未见异常，降血压后恢复正常。应诊断

- A. 腔隙性脑梗死
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 高血压脑病
- D. 壳核出血
- E. 脑栓塞

420. 女，25 岁，心悸，气促，下肢水肿 4 年。望诊心脏负性心尖搏动，已排除粘连性心包炎，可发现下列何项体征

A. 叩诊心脏呈靴型增大

- B. 心前区隆起
- C. 心音遥远
- D. 胸骨左缘扪及收缩期震颤
- E. 交替脉

421. 轻度新生儿缺氧缺血性脑病症状最明显的时间是

- A. 出生 6 小时内
- B. 出生 12 小时内
- C. 出生 24 小时内
- D. 出生 48 小时内
- E. 出生 72 小时内

422. 与移植排斥反应发生无关的细胞是

- A.TC 细胞
- B.B 细胞
- C.Th1 细胞
- D.Th2 细胞

E. 髋关节周围创伤性骨化

415. 初产妇，停经 39 周，见红、阵发性腹痛 8 小时入院。体检：精神疲乏紧张，宫缩 10 ~ 20 秒 / 10 ~ 35 分，宫缩时宫壁不硬，胎心好。肛诊：先露头，半固定，宫口容指尖，前羊水囊不明显，坐骨切迹容 3 横指。最恰当的处理是
- A. 剖宫产
 - B. 人工破膜
 - C. 催产素（缩宫素）
 - D. 哌替啶 100mg 肌注
 - E. 温肥皂水灌肠

416. 4 岁男孩，10 天前受凉感冒，服药后好转。3 天前眼睑浮肿，伴尿少。今烦躁不安，抽搐 2 次，查体：BP150/110mmHg，体温 39℃，呼吸 28 次/分，脉搏 110 次/分，心肺正常，肝未触及，神经系统检查无

- C. 胆总管结石
 - D. 先天性胆总管扩张
 - E. 复发性慢性胰腺炎
411. 原发性免疫缺陷病的共同临床表现是
- A. 反复感染
 - B. 易发生神经母细胞瘤
 - C. 生长发育明显落后
 - D. 特殊面容
 - E. 不同程度智力低下

412. 45 岁男性，车祸 3 小时入院，诊断为骨盆骨折，左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折，首先应密切观察的是哪种并发症
- A. 休克
 - B. 泌尿系统感染
 - C. 创口感染
 - D. 疼痛
 - E. 坠积性肺炎

异常。可能的诊断是急性肾炎合并

- A. 高血压脑病
- B. 循环充血
- C. 高热惊厥
- D. 低钙血症
- E. 肾功能衰竭

417. 6 岁男孩，3 天前右额碰在桌子角上，当时能哭，现右额颞部头皮隆起，局部触之有 12cm×12cm 波动区，无神经系统定位症状，头颅 CT 示：右额颞头皮肿胀。
- 处置应该是
- A. 加压包扎
 - B. 局部不作处置
 - C. 理疗，促其吸收
 - D. 穿刺抽血 + 加压包扎
 - E. 切开引流 + 加压包扎

418. Meig 综合征是指

413. 女，55 岁，患 Graves 病 3 年，1 周来心悸、咳嗽，夜间重。查体：心房颤动，两肺底水泡音。下列哪种因素与其夜间咳嗽加重有关
- A. 大脑皮层对延髓呼吸中枢抑制减弱
 - B. 迷走神经兴奋性增高
 - C. 交感神经兴奋性增高
 - D. 痰量增多
 - E. 以上均有关

414. 男性，70 岁。下楼时不慎摔伤右髋部，查体：右下肢短缩、外旋 50° 畸形，右髋肿胀不明显，但有叩痛。该患最易发生的并发症是
- A. 脂肪栓塞
 - B. 坐骨神经损伤
 - C. 髋内翻畸形
 - D. 股骨头缺血性坏死

407. 有一名 30 岁男性患者，车祸右额颞部着地，伤后意识不清，约半小时后清醒，醒后头痛，有呕吐，3 小时后又出现意识障碍，正侧位颅片示：右颞线状骨折，骨折线跨过脑膜中动脉沟，CT 示右颞梭形高密度影，脑室中线受压移位，入院时右瞳孔散大。治疗的根本措施是

- A. 0.4g 止血芳酸静点
- B. 20% 甘露醇 250ml 静点
- C. 冬眠物理降温
- D. 气管切开
- E. 血肿清除术

408. 引起心肌病变的各种病因中，目前国内外最常见的是

- A. 原发性心肌病
- B. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- C. 病毒性心肌炎

409. 先天性心脏病，二叶式主动脉瓣
C. 主动脉粥样硬化，主动脉瓣关闭不全
D. 肺动脉高压，相对肺动脉瓣关闭不全
E. 高血压性心脏病

410. 肺炎时，不属于肾上腺皮质激素使用指征的是

- A. 气胸
- B. 感染性休克
- C. 严重喘憋
- D. 中毒性脑病
- E. 呼吸衰竭

411. 肾炎性肾病和单纯性肾病鉴别点为

- A. 年龄常在 7 岁以上，浮肿显著
- B. 尿蛋白多为 (++) ~ (+++)，为选择性尿蛋白
- C. 血尿，高血压，氮质血症及血 C3 降低
- D. 血胆固醇增高

D. 风湿性心肌炎

E. 中毒性心肌炎

412. 2 岁男孩因感冒 2 天伴发热来诊，查体：

- T39℃，P130 次/分，神清，咽及右鼓膜中度充血，其余检查正常。在体检中，患儿突然发呆，双眼上翻，出现四肢强直性阵挛性运动，对该患儿首先应该进行
- A. 全面体检
 - B. 保持呼吸道通畅，解痉
 - C. 腰穿刺术
 - D. 静脉注射安定
 - E. 以上都不是

413. 引起右上腹胆绞痛及黄疸的最常见的原因是

- A. 胆道蛔虫症
- B. 急性胆囊炎

E. 血浆蛋白降低

414. 女，24 岁，发热 10 天，右侧胸痛，胸部 X 线检查示：右胸腔中等量积液，胸部叩诊时除积液区浊音外，还可叩得的伴随体征中，哪项是错的

- A. Damoiseau 线
- B. Garland 三角区
- C. Traube 区
- D. Skoda 浊鼓音区
- E. Grocco 三角区

415. 女，妊娠 2 个月，出现难免流产，首要治疗原则是

- A. 静滴催产素（缩宫素）
- B. 保胎
- C. 抗生素抗感染
- D. 尽快清宫
- E. 大量雌激素止血

- D. 需用 INH 6~9 个月
E. 需用 INH + RFP + SM 6~9 个月
399. 女 26 岁，右上浸润型肺结核治愈后一年半，出现右侧结核性渗出性胸膜炎，治疗应选
A. 异烟肼、链霉素
B. 异烟肼、链霉素、对氨水杨酸
C. 异烟肼、链霉素、青霉素
D. 利福平、对氨水杨酸
E. 利福平、异烟肼、乙胺丁醇
400. 男，40 岁。汽车上跌下，左枕部着地，出现进行性意识障碍，继以右侧瞳孔散大，诊断是
A. 左枕顶部硬膜外血肿
B. 左额颞硬膜外血肿
C. 左额颞硬膜下血肿
D. 右额颞硬膜外血肿
- E. 右额颞硬膜下血肿
401. 男性，53 岁，饮酒中发生言语不清，呕吐，随即昏迷。查体：血压 26/16kPa，双眼球向左共同偏视，右鼻唇沟浅，右侧肢体坠落实验阳性，对针刺无反应。诊断脑出血，其部位是
A. 左侧基底节
B. 右侧基底节
C. 左脑桥
D. 右脑桥
E. 左顶叶
402. 男性，68 岁，查体：血压 170/90mmHg，心底部有舒张期哈气样杂音，以胸骨右缘第 2 肋间最响，第二心音亢进。胸片示：主动脉增宽扭曲，心影靴形，最可能的诊断是
A. 风湿性主动脉瓣关闭不全
395. 有一名 30 岁女性患者，2 小时前车祸左顶枕部着地，当时有约 10 分钟意识不清，醒后头痛，左耳流血性脑脊液，四肢活动好，病理征（-），头颅 CT 示：左顶枕部头皮软组织肿胀。下列哪项处置是错误的
A. 卧床休息
B. 观察病情
C. 给予止血药物
D. 给予广谱抗生素
E. 左外耳道冲洗
396. 心得安
A. 抑制甲状腺激素合成
B. 抑制甲状腺激素释放
C. 抑制甲状腺激素与其受体的结合
D. 抑制外周组织中 5'-脱碘酶
E. 破坏甲状腺腺泡细胞
397. 男性，16 岁，低热、咳嗽、咽部不适 2 周，胸 X 线片示：两肺下部网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影，血 WBC 10×10⁹/L。治疗药物首选
A. 青霉素
B. 红霉素
C. 氟康唑
D. 雷米封 + 利福平
E. 病毒唑
398. 2 岁患儿，其父患开放性肺结核，曾接种过卡介苗，因近 1 个月咳嗽来诊。无发热，结核菌素试验，红肿硬结直径 20mm，X 线胸片未见异常，血沉 15mm/h。你将如何处理
A. 以往有过结核感染，不需特殊处理
B. 接种卡介苗反应，不需服药
C. 需用 SM + INH 6~9 个月

E. 白蛋白分解代谢增强

391. 女，18岁，皮肤反复紫癜、瘀斑，月经量多2年。既往经常关节痛，并因此经常服用保泰松等药物。家中无类似疾病患者。10岁起经常刷牙出血。本患者的诊断，不应考虑哪种情况

- A. 先天性血小板功能异常
- B. 获得性血小板功能异常
- C. 血友病
- D. 维生素C缺乏
- E. 过敏性紫癜

392. 类白病反应不同于慢粒白血病的主要化验是

- A. 外周血出现幼稚细胞
- B. 白细胞数目增多
- C. NAP活性增高
- D. 血小板和血红蛋白量大多正常

E. 白细胞胞浆中有中毒颗粒和空泡

393. 男，45岁，腹胀2个月，查体：腹壁静脉曲张，腹水征（+），脾大。该患者腹壁静脉血流方向为

- A. 脐上、脐下皆上行
- B. 脐上、脐下皆下行
- C. 脐上下行，脐下上行
- D. 脐上上行，脐下下行
- E. 由脐部向四周放射状流行

394. 女性，32岁，14岁初潮，月经周期为34天，预测排卵期大约在周期的哪一天

- A. 第14天
- B. 第15天
- C. 第16天
- D. 第20天
- E. 第24天

发病已8天，以下哪种酶值还升高

- A. CPK
- B. LDH
- C. GPT
- D. GOT
- E. r-GT

388. 亚急性重型肝炎患者，近2日出现上腹部不适，烧灼感，反酸，突然出现神志不清，躁动，扑翼样震颤（+），测血氨增高，最可能原因是

- A. 静点氨基酸所致
- B. 离子紊乱所致
- C. 胃粘膜病，引起消化道出血，诱致肝性脑病
- D. 药物引起精神异常
- E. 继发感染，导致病情加重

389. 男，49岁，上腹部隐痛10年，半年来消瘦、

黑便。查体：左锁骨上窝触及2cm×3cm淋巴结2枚。吸烟史20年。Virchow淋巴结是哪种癌转移的标志

- A. 甲状腺癌
- B. 胃癌
- C. 肺癌
- D. 乳癌
- E. 胸腺癌

390. 男性，16岁，近半月全身水肿，检查尿蛋白（++++），透明管型2~3个/HP，血红蛋白120g/L，血压120/80mmHg，血BUN5mmol/L，血肌酐178μmol/L。出现蛋白尿的主要原因是

- A. 肾小球滤过膜的屏障作用受损
- B. 肾小管重吸收蛋白质障碍
- C. 肝脏合成蛋白质的不足
- D. 蛋白质的摄入量不足

- A. 他巴唑治疗
- B. 丙基硫氧嘧啶治疗
- C. 手术治疗
- D. 他巴唑+心得定治疗
- E. ^{131}I 治疗

384. 男性，20岁，发热起病，3天后自行缓解，高度乏力，腹胀，黄疸进行加深，病程第9天出现躁动，神志不清，重度黄疸，肝界缩小，应诊断为

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 急性重型肝炎
- C. 亚急性重型肝炎
- D. 慢性重型肝炎
- E. 中毒性肝炎

385. 某幼儿园最近有水痘流行，为了预防水痘，应采取下列预防措施，除了

- A. 对接触病儿的易感儿童应检疫3周

- B. 隔离病儿至疱疹全部结痂为止
- C. 对体弱者可用水痘痊愈期血清
- D. 对污染的衣物、房间应暴晒，紫外线照射，通风等方法进行消毒
- E. 可对易感者注射丙种球蛋白

386. 某女，突发寒战、高热，伴腹痛、腹泻，腹泻10余次，粪便质少，为粘液脓血便，便细菌培养痢疾杆菌阳性，便常规，脓液(++)，便红细胞6个/HP，便白细胞满视野，该患者首选治疗

- A. 先锋霉素
- B. 红霉素
- C. 氟哌酸
- D. 氯霉素
- E. 痘毒唑

387. 男性，57岁，胸痛、恶心、呕吐，血压80/60mmHg，心电图示：急性心肌梗死。

· 167 ·
剑突下压痛，腹肌紧张。WBC $20 \times 10^9/\text{L}$ 。

本例的治疗原则是

- A. 大量使用抗生素
- B. 胃肠减压，维持水电解质平衡
- C. 解痉挛，镇痛
- D. 服用大量中药利胆
- E. 胆道减压引流，解除梗阻

381. 男性，65岁，以往有劳力型心绞痛，长期服用硝酸甘油，病情尚稳定。近1个月来胸痛又发作，位于胸骨下段，且多发生在午睡时或晚间入睡后，服硝酸甘油无效，起床站立后可缓解。以往有胆结石史但从无发作。1周来患者胸痛，发作在清晨5时，且疼痛时间较长，心电图示 $V_1 \sim V_3$ 导联 ST 段抬高，此时诊断应考虑

- A. 卧位型心绞痛

- B. 恶化型劳力型心绞痛
- C. 食管裂孔疝
- D. 变异型心绞痛
- E. 胆结石

382. OCT 阳性是指在测试

- A. 早期减速在10分钟内连续出现3次以上
- B. 胎心率基线变异在6次以下
- C. 无宫缩时10分钟内出现3次晚期减速
- D. 在10分钟内晚期减速连续出现3次以上，胎心率基线变异在5次以下
- E. 早期减速出现频率达50%以上

383. 农村女性，32岁，甲亢6年，疏于治疗，长期不愈。临床疑诊甲亢心脏病，心功能二级，甲状腺Ⅰ°肿大，甲状腺吸碘率3小时68%，24小时91%，下列哪项治疗应首先考虑

- E. 控制感染，服氢氧化铝凝胶
376. 女，30岁。头部受伤后昏迷半小时，清醒后左侧肢体无力，腰穿血性脑脊液，以后逐渐好转，最可能为
A. 脑震荡
B. 脑挫伤
C. 急性硬膜外血肿
D. 急性硬膜下血肿
E. 脑内血肿
377. 男，50岁，咯痰带血。查体：颈部、上肢水肿，胸前部淤血及静脉曲张，该患者水肿的原因考虑为
A. 下腔静脉阻塞
B. 上腔静脉阻塞
C. 胸导管阻塞
D. 缩窄性心包炎
E. 丝虫病
- 378.NAP活性明显增高见于
A. 慢粒白血病慢性期
B. 急淋白血病缓解期
C. 恶性淋巴瘤Ⅳ期
D. 类白血病反应
E. 多发性骨髓瘤
- 379.75岁老人，跌倒手掌着地，致桡骨下端骨折，应如何处理
A. 切开复位内固定
B. 闭合复位外固定支架固定
C. 悬吊牵引
D. 骨牵引
E. 手法复位，石膏外固定
380. 男性，62岁，右上腹阵发性绞痛，伴恶心呕吐20小时，急诊入院，寒战高热，明显黄疸。检查：BP90/60mmHg，T40℃，P120次/分，巩膜及全身皮肤黄染，
- 163 ·
- E. 嗜异凝集试验
372. 男性，20岁，突发上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹，腹呈板状硬，右下腹压痛明显，膈下无游离气体，应考虑为
A. 急性阑尾炎
B. 急性胆囊炎
C. 急性肠扭转
D. 肠伤寒穿孔
E. 溃疡病穿孔
373. 某妇女，30岁。孕1产0，宫内妊娠20周，合并子宫壁间肌瘤。主诉：下腹痛7天，合并低热，无阴道流血。WBC： $9 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是
A. 子宫肌瘤合并感染
B. 子宫肌瘤红色变性
C. 子宫肌瘤囊性变
D. 子宫肌瘤蒂扭转
374. 女性，40岁，参加婚宴后右上腹痛，呈剧烈绞痛，查体见表情痛苦不安。对该患者在确诊前应禁忌的处置是
A. 镇痛药止痛
B. 抗生素消炎
C. 急查血常规
D. 行PTC检查
E. 紧急行腹部超声检查
375. 女，30岁。因右肾结石行ESWL治疗，3天后排出结石，2周复查右肾结石已排净，结石成分分析为磷酸盐结石，预防磷酸盐结石方法是
A. 口服维生素B₆或氧化镁
B. 口服别嘌呤醇
C. 碱化尿液，服卡托普利
D. 碱化尿液，少食动物内脏
- 164 ·

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 无脱水
- E. 接近休克状态

369.5个月男婴，体温38℃，咳嗽、喘憋明显。

查体：呼吸急促，鼻扇，三凹征明显，双肺听诊满布哮鸣音，偶闻中、小水泡音，胸部X片：双侧肺纹理增强，可见小片状阴影，肺气肿改变明显。可诊断为

- A. 衣原体肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 腺病毒肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

370.女性，17岁，近2个月胸闷、乏力、咳嗽，

查体：颈淋巴结肿大，心肺（-），胸片：

肺门及纵隔淋巴结肿大。WBC $72 \times 10^9/L$ ，结核菌素试验（1:10000）48小时观察（++），诊断应首先考虑

- A. 淋巴肉瘤
- B. 胸内淋巴结结核
- C. 支气管肺癌
- D. 淋巴细胞白血病
- E. 肺结节病

371.10岁女患儿，干咳4天，伴胸痛、发热3天，体温37.5℃，双肺未闻及中小水泡音，血常规示：白细胞 $9.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞65%，X线正位片示：右下肺片状阴影，为诊断应首选哪项检查

- A. OT试验
- B. ESR
- C. 血常规
- D. 冷凝集试验

- B. 降压治疗
- C. 应用激素
- D. 应用脱水剂
- E. 应用止血剂

365.女性，17岁，高热，咳铁锈色痰，右下肺部呼吸音弱，以下哪项不正确

- A. 卧床休息支持治疗
- B. 首选青霉素
- C. 青霉素过敏的选用红霉素
- D. 用药后复查胸片，阴影消散后停抗生素
- E. 抗生素疗程5~7天

366.男，55岁，有冠心病史，6小时前突然出现呼吸困难，咯粉红色泡沫状痰。查体：极度烦躁不安，心尖区舒张期奔马律。该患者奔马律的发生机制是

- A. 左室舒张末期压力负荷过度

- B. 左室舒张早期容量负荷过度
- C. 左室收缩期负荷过度
- D. 左室舒张晚期容量负荷过度
- E. 左室舒张期容量及压力负荷过度

367.男性，60岁，有肺气肿史，发热、咳嗽1周，痰量多而粘稠，胸片示：右上肺大片状阴影，内有多个空腔，水平裂呈向下弧形。治疗上选择

- A. 万古霉素
- B. 苯唑西林
- C. 庆大霉素+利福平
- D. 阿米卡星+红霉素
- E. 阿米卡星+头孢西丁

368.某婴，腹泻3天，伴发热39℃，每日大便7~10次，稀水样，粪质少。患儿今烦躁、哭吵，面色红，口唇及舌干燥，欲饮。估计其为

- 血及白带增多，窥器下见宫颈外观呈菜花状，宫颈活组织检查除外癌变，最可能的诊断是
- A. 宫颈糜烂
 - B. 宫颈息肉
 - C. 宫颈乳头状瘤
 - D. 宫颈结核
 - E. 宫颈囊肿
361. 急性肾炎 2 周，血压 160/100mmHg，尿红细胞散在满视野。首先选用
- A. 降压对症治疗
 - B. 抗炎治疗
 - C. 应用止血药物治疗
 - D. 强地松
 - E. 中药治疗
362. 重度颅脑损伤深昏迷病人，维持呼吸道通畅，防止缺氧的最有效方法是
- 155·
- 征应是
- A. 量少稀薄
 - B. 量少粘稠
 - C. 量多粘稠
 - D. 量极少，不易取出
 - E. 量多稀薄
357. 女，32岁，高热伴尿路刺激症状，查体：双肾区叩击痛。经治疗后体温下降，其下降方式常为
- A. 数周内降至正常
 - B. 数天内降至正常
 - C. 24小时内降至正常
 - D. 数小时内降至正常
 - E. 1小时内降至正常
358. 病人胸部受伤，急诊入院，经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀，休克。查体：左胸饱满，气管向右移位，左侧可触及
- 156·
- A. 维持吸氧
B. 放置通气道
C. 彻底吸痰
D. 气管切开
E. 给予呼吸兴奋剂
363. 30岁男性，以急性阑尾炎住院，早期腹痛位于脐周，伴恶心、呕吐。其腹痛发生机制是
- A. 牵涉痛
 - B. 反射性腹痛
 - C. 躯体性腹痛
 - D. 中枢性腹痛
 - E. 内脏性腹痛
364. 80岁男性，突然出现头痛、呕吐、意识不清，血压 27/16kPa，右侧瞳孔大，左侧偏瘫。此时，最重要的治疗是
- A. 外科手术
- 骨擦音，叩之鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显，诊断首先考虑是
- A. 肋骨骨折
 - B. 张力性气胸
 - C. 肋骨骨折并张力性气胸
 - D. 血心包
 - E. 闭合性气胸
359. 6 个月女婴，因贫血住院，试验检查血清叶酸小于 $3 \mu\text{g/L}$ ，诊断营养性巨幼红细胞性贫血，给予叶酸治疗，为了提高疗效，应同时服
- A. VitB
 - B. VitD
 - C. VitC
 - D. VitA
 - E. VitE
360. 28岁女性，妊娠 6 个月，有接触性阴道流

人工周期治疗3个月仍不见月经，其闭经原因可能是

- A. 子宫内膜损伤
- B. 卵巢病变
- C. 垂体病变
- D. 下丘脑病变
- E. 高催乳素血症

353. 男性患儿3岁，上腹部汽车撞伤2小时入院，腹腔诊断性穿刺(-)。诊断为腹壁挫伤。伤后8小时腹部逐渐饱胀，腹部扪诊时哭闹，腹肌紧张，肠鸣音消失，应考虑

- A. 胃破裂，弥漫性腹膜炎
- B. 腹壁挫伤
- C. 肝破裂
- D. 脾破裂
- E. 胰腺损伤

354. 30岁农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(++)，血红蛋白60g/L，治疗应是

- A. 驱钩虫
- B. 驱钩虫+口服铁剂
- C. 驱钩虫+注射右旋糖酐铁
- D. 输血+注射右旋糖酐铁
- E. 口服叶酸或注射维生素B₁₂

355. 女性，18岁，肺炎球菌肺炎患者，意识模糊，血气PaO₂38mmHg，PaCO₂30mmHg，氧疗时应采用

- A. 内给氧
- B. 高浓度给氧
- C. 持续低流量给氧
- D. 鼻导低浓度给氧
- E. 鼻塞低浓度间歇给氧

356. 29岁妇女，结婚3年不孕。基础体温曲线呈单相型。经前5天取宫颈粘液，其特

RBC0~1个/HP，WBC0~1个/HP，颗粒管型1~2个/HP，肌酐清除率降低，应诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 隐匿性肾炎
- D. 慢性肾炎
- E. 高血压病肾动脉硬化

349. 男性，36岁，有溃疡病史，近2天来黑便，每天1~2次，估计其出血量大约为

- A. 50~70ml
- B. 60~80ml
- C. 70~90ml
- D. 80~100ml
- E. 90~110ml

350. 男性，30岁，急性阑尾炎住院，现腹痛转至右下腹，查体：右下腹压痛，伴抬

手痛及肌紧张。其腹痛发生的机制是

- A. 牵涉痛
- B. 反射性腹痛
- C. 躯体性腹痛
- D. 中枢性腹痛
- E. 内脏性腹痛

351. 8个月小儿，高热5天，伴喘憋，双肺布啰音，中性粒细胞8×10⁹/L。疑为毛细支气管炎，作病毒抗体测定阳性，该抗体IgG的亚类是

- A. IgG2
- B. IgG3
- C. IgG3及IgG4
- D. IgG1
- E. IgG4

352. 人流后1年未见月经来潮，子宫、附件均正常，孕激素试验(-)，基础体温双相，

痛前期，需终止妊娠，下列哪项提示胎儿已成熟

- A. 羊水胆红素类物质用 ΔOD_{450} 测值 > 0.02
- B. 卵磷脂与鞘磷脂比值 (L/S) > 2
- C. 羊水肌酐测定 < 2mg%
- D. 羊水中脂肪细胞出现率达 15%
- E. B型超声测胎头双顶径 8cm

345. 菌痢病人，腹泻 2 天，每日 10 次，脓血便伴发热，查 BP11/9kPa，P100 次 / 分，皮肤凉，苍白。应诊断

- A. 未发生休克
- B. 休克早期
- C. 休克发展期
- D. 休克晚期
- E. 虚脱

346. 急性阑尾炎病人，10 小时前脐周痛，现

骨左缘 2、3 肋间可及Ⅲ级收缩期杂音，胸骨左缘下端短促舒张期杂音，肺动脉第二音亢进。提示

- A. 产生右向左分流
- B. 左向右分流量较大
- C. 左向右分流量较小
- D. 预兆将发生心力衰竭
- E. 合并主动脉瓣关闭不全

341. 女，36 岁，患糖尿病 1 个月，胰岛素治疗过程中出现全身性轻至中度水肿。该患者发生水肿是由于

- A. 胰岛素过敏
- B. 维生素 B₁ 缺乏
- C. 蛋白质缺乏
- D. 水、钠潴留
- E. 特发性水肿

342. 女性，64 岁，右侧轻偏瘫 2 天，血压

腹痛加剧，转移至右下腹，病变尚未波及腹膜壁层。其腹痛发生的机制是

- A. 牵涉痛
- B. 反射性腹痛
- C. 躯体性腹痛
- D. 中枢性腹痛
- E. 内脏性腹痛

347. 女性病人，入院 3 天，头部受伤后立即昏迷，10 分钟后清醒，有呕吐，对受伤情况不能回忆，诊断是

- A. 脑震荡
- B. 脑挫裂伤
- C. 颅内血肿
- D. 脑干损伤
- E. 脑供血不足

348. 男性，25 岁，近年夜尿增多，偶有水肿。BP190/110mmHg，Hb60g/L，尿蛋白 (+)，

24/16kPa，头 CT 示：左基底节区小低密度灶。考虑诊断

- A. 腔隙性脑梗死
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 高血压脑病
- D. 壳核出血
- E. 脑栓塞

343. 运动员百米赛跑途中突然闻及左膝撕裂声，然后倒地，查体左膝不能主动伸，X 线片示髌骨中段骨折，考虑造成骨折的原因是

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 病理性骨折
- D. 肌肉拉力
- E. 积累性劳损

344. 25 岁妇女，孕 36 周，G1P0，合并重度子

- B. 肾病综合征
- C. 急进性肾炎
- D. 隐匿性肾炎
- E. 以上都不是

337. 30岁男性，劳动中突感剧烈头痛、呕吐，一度意识不清，醒后颈枕部痛，右侧眼睑下垂，右瞳孔大，颈强直，克氏征阳性。最可能的诊断是

- A. 急性脑膜炎
- B. 脑出血、脑疝
- C. 小脑出血
- D. 脑干出血
- E. 蛛网膜下腔出血

338. 一中年女性，近20天感周身乏力，腹胀，食欲不振，尿色深如浓茶样，化验ALT300U/L，胆红素定量40nmol/L，血清球蛋白45g/L，肝炎病原学阴性，抗核抗

体(+)，类风湿因子(+)，诊断为

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 慢性肝炎活动
- C. 自身免疫性肝炎
- D. 胆囊炎
- E. 溃疡型肝炎

339. 男性，24岁，腹部闭合性损伤后2小时，血压120/80mmHg，脉搏96次/分，全腹压痛，反跳痛，肌紧张，移动性浊音不明显，肠鸣音消失，尿无异常。应诊断为

- A. 腹腔内实质脏器损伤
- B. 腹腔内空腔脏器损伤
- C. 泌尿系损伤
- D. 胰腺损伤
- E. 肝破裂

340. 5岁女孩，已确诊房间隔缺损，听诊于胸

·143·

·144·

经胰岛素治疗，症状时轻时重，有明显的低血糖症状，近2个月眼睑及下肢浮肿，乏力，腰痛，BP160/100mmHg，尿蛋白(++)，颗粒管型少许，尿糖(++)。应诊断为

- A. 糖尿病肾病
- B. 肾动脉硬化
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾炎
- E. 胰岛素副作用

334. 40岁男性，1年前因胫腓骨骨折，行手法复位，石膏外固定，现检查见骨折处有反常活动，X线显示胫骨上下端髓腔被硬化骨封闭，骨折端有3mm间隙，并向后成角15°，其治疗应采用

- A. 手法复位，小夹板固定
- B. 手法复位，石膏外固定

- C. 切开复位，内固定外固定
- D. 切开复位，外固定
- E. 切开复位，植骨内固定加外固定

335. 24岁初产妇，妊娠40周，宫口开全1小时，胎心116次/分，胎膜已破，羊水Ⅱ°混浊，胎头+4，枕右前位。此时恰当处理应是

- A. 产钳术助娩
- B. 静脉滴注缩宫素加速产程进展
- C. 吸氧，等待自然分娩
- D. 胎头吸引术助娩
- E. 立即行剖宫产术

336. 患者25岁，近日腰痛，双下肢出现凹陷性水肿，尿常规检查尿蛋白(++)，红细胞0~1个/HP，血浆蛋白降低，清蛋白>30g/L，胆固醇正常，血肌酐102μmol/L，应诊断为

- A. 慢性肾炎

·141·

·142·

- B. 急性重型肝炎
- C. 亚急性重型肝炎
- D. 淤胆型肝炎
- E. 中毒性肝炎

330.8 个月婴儿，人工喂养，经常患腹泻。体检：体重 5kg，精神萎靡，食欲差，面色苍白，腹壁皮下脂肪厚度 0.2cm，皮肤干燥，考虑为

- A. I 度营养不良
- B. II 度营养不良
- C. III 度营养不良
- D. 维生素 A 缺乏
- E. 慢性腹泻

331. 女性，20岁，劳累后畏寒高热，右胸痛，查体：急性病容，口周疱疹，右肺中下部闻及管样呼吸音，临床诊断右肺炎，最可能的病原体是

- A. 肺炎支原体
- B. 肺炎克雷伯杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 肺炎衣原体
- E. 金黄色葡萄球菌

332. 男性，25岁，车祸伤 1 小时。查体：脉搏 130 次/分，血压 86/60mmHg。烦躁不安，发绀，严重呼吸困难，皮肤湿冷，左颈部皮下捻发感，气管右移，左胸饱满，左肺呼吸音消失。胸片示左肺完全萎陷。
最可能的诊断为

- A. 左侧进行性血胸
- B. 左侧闭合性气胸
- C. 左侧开放性气胸
- D. 左侧张力性气胸
- E. 左侧反常呼吸运动

333. 男性，26岁，明显的“三多一少”症状 10 年，

- 139 ·
- B. 呼吸道
 - C. 颅内
 - D. 肛周感染
 - E. 肠道

326.65岁女性，跌倒后右手掌着地，腕部疼痛，肿胀，压痛，无反常活动，但餐叉状畸形明显，该患最可能的诊断是

- A. 右腕关节脱位
- B. 右舟状骨骨折
- C. 右腕 Colles 骨折
- D. 尺骨茎突骨折
- E. 右腕关节挫伤

327. 一支气管肺癌病人，近来出现头面部、颈部和上肢水肿。查体可见颈静脉怒张，其发生是由

- A. 上腔静脉阻塞
- B. 下腔静脉阻塞

- 140 ·
- C. 癌转移至心包积液
 - D. 癌转移至胸腔大量积液
 - E. 以上均有可能

328. 在荧光定量分析法中，下列哪种不是影响荧光强度的因素

- A. 荧光物质的浓度
- B. 溶剂的性质
- C. 荧光物质的摩尔吸光系数
- D. 温度
- E. 溶液的 pH 值

329. 女性，发热起病，乏力腹胀，食欲不振，发病第 9 天出现躁动不安，神志不清，巩膜及皮肤深度黄染，肝界缩小，注射部位可见瘀斑，血胆红素定量 $300 \mu \text{mol/L}$ ，ALT 150U/L，血清白蛋白 29g/L。此患者临床诊断应考虑

- A. 急性黄疸型肝炎

- B. 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎
C. 胆囊穿孔腹膜炎
D. 绞窄性肠梗阻
E. 急性出血性胰腺炎
322. 男性，30岁，车祸伤半小时。体格检查：发绀，烦躁不安，呼吸困难，左侧大块胸壁软化，两肺湿啰音。首要的处理是
A. 紧急剖胸手术
B. 吸氧及雾化吸入
C. 清除呼吸道分泌物
D. 软化胸壁牵引固定
E. 左侧胸腔闭式引流
323. 62岁女性，晨起出现讲话不清，右侧肢体无力，两天后因病情逐渐加重就诊。血压14/11kPa，意识清，运动性失语，右侧偏瘫，可完全排除的诊断是
A. 脑栓塞

·135·

- 四肢抖动，踝阵挛，巴氏征（+）。该患儿的诊断可能是
A. 病毒性脑膜炎
B. 多动症
C. 癫痫小发作
D. 先天愚型
E. 巨幼细胞性贫血
318. 偏头痛最常见的先兆是
A. 感觉先兆
B. 运动先兆
C. 视觉先兆
D. 言语先兆
E. 感觉合并运动先兆

319. 60岁甲亢病人，甲状腺Ⅲ°肿大，高代谢症状严重，肝、肾功能正常。首选的治疗措施为
A. 立即手术

- B. 脑血栓形成
C. 短暂脑缺血发作
D. 脑出血
E. 腔隙性脑梗死
324. 男婴，7个月。呕吐、腹泻4天，大便10~15次/天。蛋花汤样便，尿量极少，皮肤弹性差，呈花纹状，眼窝及前囟明显凹陷，心音低钝，四肢厥冷，大便镜检偶见白细胞，血钠124mmol/L。该患儿的诊断为
A. 中度高渗性脱水
B. 中度等渗性脱水
C. 重度低渗性脱水
D. 重度等渗性脱水
E. 中度低渗性脱水

325. 急性再障感染最多见于
A. 皮肤粘膜

·136·

- B. 立即¹³¹I治疗
C. 复方碘溶液治疗2周后手术
D. 抗甲状腺药物控制症状后手术
E. 抗甲状腺药物长期治疗
320. 女性，21岁，消瘦，多饮2个月，咽痛，发热3天，意识不清4小时。哪项检查能最快获得诊断
A. 尿糖，尿酮
B. 血糖，血酮
C. 血气分析
D. 血浆血糖测定
E. 尿常规

321. 男性，30岁，2小时前劳动中突发上腹刀割样疼痛，迅速波及全腹，舟状腹，全腹膜刺激征，肝浊音界不清，肠鸣音消失。诊断是
A. 阑尾穿孔腹膜炎

·133·

·134·

- C. 立即阴道检查，根据宫口扩张程度决定分娩方式
- D. 立即肛查，了解宫口扩张情况
- E. 静脉滴注止血药物

314. 男，32岁，呼吸困难3~4年，查体：心尖区舒张期杂音及三尖瓣区全收缩期吹风样杂音。心脏望诊时可看到

- A. 心尖搏动向左向下移位
- B. 心尖搏动增强
- C. 心尖搏动减弱
- D. 负性心尖搏动
- E. 胸骨上窝搏动

315. 患儿，11个月。近一个月面色渐苍白，该患儿出生时为足月顺产，生长发育正常，未患过任何疾病，母乳喂养，其母孕期和哺乳期身体均健康，该患经检查诊断为缺铁性贫血，其缺铁的主要原因

- C. IgA肾病
- D. 慢性肾炎
- E. 泌尿系感染

310. 46岁男性，突发头痛、恶心、呕吐，无明显肢体瘫痪，脑膜刺激征阳性，脑脊液呈均匀一致血性，下列哪一诊断最不可能

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑叶出血
- C. 壳核出血
- D. 尾状核头出血
- E. 小脑出血

311. 患者18岁，发热起病，3天后体温下降，伴恶心、呕吐、尿色深如豆油样，病程第8天出现嗜睡，继之神志不清，巩膜皮肤深度黄疸，肝界缩小，诊断应考虑

- A. 急性黄疸型肝炎

- 是什么
- A. 先天储铁不足
 - B. 铁摄入量不足
 - C. 生长发育过快
 - D. 铁吸收障碍
 - E. 铁丢失过多

316. 男，1岁，因生长发育落后就诊。不认识父母，不能独坐，表情呆滞。生后6个月起反复抽搐发作，毛发黄褐色，尿有鼠尿臭味。最可能的诊断是

- A. 小儿癫痫
- B. 婴儿痉挛症
- C. 甲状腺功能减低
- D. 脑瘫
- E. 苯丙酮尿症

317. 1岁婴儿，面色苍黄，毛发稀疏，易怒少哭，查体：体温正常，神清，不会扶站，

- B. 感染中毒性脑病
- C. 急性重型肝炎
- D. 亚急性重型肝炎
- E. 淤胆型肝炎

312. 2岁小儿，曾多次患肺炎，无发绀，胸骨左缘第3~4肋间Ⅲ级粗糙全收缩期杂音，X线检查左心室增大，肺动脉段突出，肺血管影增粗，主动脉影较小。诊断为

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉瓣狭窄

313. 初孕妇，26岁，妊娠34周。因腹部直接受撞击出现轻微腹痛，伴少量阴道流血

- A. 立即行剖宫产结束妊娠
- B. 卧床休息，给予镇静药观察病情变化

手术治疗已 5 天，目前仍疼痛加剧，伴高热，右上腹广泛压痛，反跳痛，腹肌紧张，肠音减弱，体温 39℃，白细胞计数 $18 \times 10^9/L$ ，应做

- A. 胆囊切除术
- B. 胆囊切除及胆总管引流
- C. 胆囊造瘘及腹腔引流术
- D. 胆囊切除及腹腔引流术
- E. 胆总管十二指肠引流术

307.1 岁男患儿，面色苍黄、毛发稀枯 3 个月，血常规示：Hb89g/L，中性粒细胞变大并有分叶过多，骨髓象示：幼红细胞巨幼变。为明确诊断，首先应选择的检查是

- A. 血清维生素 B₁₂ 测定
- B. 血清铁蛋白测定
- C. 血清铁测定
- D. 血清维生素 B₆ 测定

E. 血清乙酸测定

308. 男性，30 岁，左前胸刀刺伤半小时，查体：烦躁不安，皮肤苍白湿冷，呼吸困难，脉细弱，140 次/分，颈静脉怒张，血压 70/50mmHg。左前胸第 5 肋间见约 4cm 刀伤口。最可能的诊断是

- A. 心脏压塞
- B. 失血性休克
- C. 左侧进行性血胸
- D. 左侧张力性气胸
- E. 心脏大血管破裂

309. 男性，30 岁，临床表现为反复发作性肉眼血尿，在劳累及感染后加重。发作时伴有肌肉痛，无高血压及肾功能减退，可考虑诊断

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 隐匿性肾炎

127· 检查，右侧膈肌升高，活动受限，右 7、8、9 肋骨骨折，诊断为

- A. 胃破裂
- B. 肠破裂
- C. 脾破裂
- D. 肝破裂
- E. 损伤性气胸

304.1 岁男孩，持续高热、咳嗽 7 天，伴喘憋、嗜睡 2 天，今日惊厥 2 次，抽后神志不清。体检：浅昏迷，体温 39.5℃，呼吸 80 次/分，心率 180 次/分，面色苍白，口周发绀，三凹征明显，两肺呼吸音粗，左背部下部叩诊浊音，可闻支气管呼吸音及中细湿啰音，心音低钝，肝肋下 4cm，前囟饱满，Kernig 征阴性，Barbinski 征阳性，血白细胞 $10 \times 10^9/L$ 。脑脊液检查：细胞数 $6 \times 10^6/L$ ，潘氏试验阴性，糖 3.6mmol/L，氯化物 12mmol/L。最可能的诊断是

- A. 腺病毒肺炎，心力衰竭，中毒性脑病
- B. 粟粒性肺结核，结脑
- C. 呼吸道合胞病毒肺炎，心力衰竭，高热惊厥
- D. 金葡菌肺炎，心力衰竭，高热惊厥
- E. 支原体肺炎，心力衰竭，化脓性脑膜炎

305. 女性，26 岁，3 小时前摔伤左前臂，来院检查发现前臂肿胀，瘀斑，剧痛，并有短缩成角畸形，诊断首先考虑

- A. 前臂软组织挫伤
- B. 尺神经损伤
- C. 尺桡骨双折
- D. 桡骨骨折
- E. 尺骨骨折

306. 女性，60 岁，诊断为急性胆囊炎，经非

- A. 局部高度肿胀
B. 压痛明显
C. 下肢不能自主活动
D. 骨摩擦音
E. 明显跛行
300. 右心导管检查发现肺动脉血氧含量较右心室高提示
A. 右向左分流
B. 肺动脉高压
C. 肺动脉狭窄
D. 房间隔缺损
E. 以上都不是
301. 男性，30岁。无吸烟史。高热、胸痛及咳嗽1周，咳脓痰3天，胸片示：右肺外周圆形肿块，中央薄壁空洞并有液平。进一步的检查是
A. 结核菌素试验
- B. 痰细胞学检查
C. 支气管镜检查
D. 痰培养加药敏试验
E. 经胸壁穿刺活组织检查
302. 男性，32岁，系复发性甲亢病人，现药物治疗6个月， FT_3 、 FT_4 正常，甲状腺II°肿大，TSAb滴度仍高，且较前无明显下降，下一步的治疗应选择
A. 加大抗甲状腺药物剂量
B. 减少抗甲状腺药物剂量
C. 继续目前治疗
D. 手术治疗
E. 除原治疗外，加免疫抑制剂
303. 患者40岁，胸腹部摔伤，呼吸困难，腹痛，呕吐，血压90/70mmHg，右肺呼吸音弱，右上腹压痛，腹肌紧张，反跳痛明显，腹部无明显移动性浊音，肠鸣音弱，X线

·123·

·124·

294. 下面哪种血尿应考虑为上尿路结石
A. 无痛性血尿
B. 活动后血尿
C. 终末血尿
D. 初期血尿
E. 血尿伴血块
295. 易发生蒂扭转的卵巢囊肿是
A. 巧克力囊肿
B. 粘液性囊腺瘤
C. 皮样囊肿
D. 浆液性囊腺瘤
E. 滤泡囊肿
296. 左侧卵巢静脉一般汇入
A. 腹主动脉
B. 脐内静脉
C. 左肾静脉
D. 脐总静脉
- E. 脐外静脉
297. 左侧卧位可使腹痛减轻，提示何种疾病
A. 十二指肠淤滞症
B. 胰体癌
C. 反流性食管炎
D. 胃粘膜脱垂
E. 胃溃疡
298. 左冠状动脉回旋支阻塞引起的心肌梗死是
A. 前间壁
B. 下侧壁
C. 高侧壁
D. 后间壁
E. 前壁
299. 右下肢被机动车压伤，具备下列哪项可诊断为骨折

·121·

·122·

289. 动脉粥样硬化导致器官病变，最常见的
是哪一类

- A. 肾动脉
- B. 肠系膜动脉
- C. 冠状动脉
- D. 脑动脉
- E. 下肢动脉

290. 考核抗结核治疗效果的主要指标是

- A. 痰菌检查
- B. 胸部 X 线
- C. 结核中毒症状的消失
- D. 咳嗽减轻，痰量减少
- E. 体力明显恢复

291. 老年人蛛网膜下腔出血的特点是

- A. 头痛、呕吐严重
- B. 常有抽搐发作
- C. 脑膜刺激征明显

D. 意识障碍多见，头痛不明显

E. 常伴眼底视网膜出血

292. 肾病综合征出现大量蛋白尿，其主要机
制是

- A. 肾小球滤过膜内皮窗孔径异常过大
- B. 肾小球基膜糖蛋白成分变化负电荷消
失
- C. 肾小球上皮细胞足突裂隙增大
- D. 肾血流量增加
- E. 肾静脉回流障碍

293. 下肢短缩，外展，极度外旋位

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨粗隆间骨折
- C. 股骨上 1/3 骨折
- D. 股骨上中段骨折
- E. 股骨髁上骨折

·119·
A. 心电图

- B. 放射性核素
- C. 二维超声心动图
- D. 冠状动脉造影
- E. 胸片

285. 甲型肝炎病毒具有哪项特点

- A. 是脱氧核糖核酸（DNA）病毒
- B. 黑猩猩和绒猴易感，但不能传代
- C. 甲型肝炎病毒感染后易成慢性携带者
- D. 在细胞培养中 HAV 引起细胞病变
- E. 只有一个血清型和一个抗原抗体系统

E. 破坏甲状腺腺泡细胞

287. 甲硝唑是下列哪种疾病治疗时的首选药
物

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 细菌性阴道炎
- C. 念球菌阴道炎
- D. 淋病
- E. 老年性阴道炎

286. 甲基硫氧嘧啶

- A. 抑制甲状腺激素合成
- B. 抑制甲状腺激素释放
- C. 抑制甲状腺激素与其受体的结合
- D. 抑制外周组织中 5'-脱碘酶

288. 男，10岁，突发剑突下剧烈绞痛1小时，
疼痛呈钻顶样，辗转不安。查体：腹肌
柔软，右上腹部轻微压痛，首先考虑的
诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 胆总管结石
- C. 胆道蛔虫病
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃炎

279. 皮下出血面积的直径多大称为淤点

- A. < 2mm
- B. 2 ~ 3mm
- C. 3 ~ 5mm
- D. > 5mm
- E. 以上均可

280. 下述哪项检查结果不符合 Graves 症的诊断

- A. T_3 抑制试验抑制率 > 50%
- B. TSAb 阳性
- C. TGAb 和 TPOAb 阳性
- D. TSH 降低
- E. rT_3 升高

281. 卡介苗接种后 OT 试验阳性的时间为

- A. 1 ~ 2 周
- B. 2 ~ 3 周
- C. 3 ~ 4 周

D. 6 ~ 8 周

E. 8 ~ 12 周

282. 关于卡那霉素，表述正确的是

- A. 结核菌抑菌剂
- B. 结核菌全杀菌剂
- C. 结核菌半杀菌剂
- D. 对结核菌无影响
- E. 对末梢神经有损害

283. 目前认为，多数人类肾小球疾病是

- A. 遗传性疾病
- B. 是细菌感染性疾病
- C. 免疫介导的疾病
- D. 免疫缺陷性疾病
- E. 是肾小球损伤性疾病

284. 目前发现心肌缺血及诊断心绞痛最常用的无创性检查方法是

·115·
274. 下列情况合并心绞痛时，不宜应用硝酸甘油的是

- A. 冠心病
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 心梗后心绞痛
- D. 严重贫血
- E. 肥厚型梗阻性心肌病

275. 丘疹、新旧水疱和结痂同时存在见于

- A. 风疹
- B. 猩红热
- C. 水痘
- D. 幼儿急疹
- E. 麻疹

276. 代谢产物由胆汁排入肠道，很少经过肾排泄的磺脲类药物是

- A. 格列本脲
- B. 格列吡嗪

C. 格列奇特

D. 格列波脲

E. 格列喹酮

277. 代谢异常原因性肝肿大不包括

- A. 血色病
- B. 肝淀粉样变
- C. 结节病
- D. 肝豆状核变性
- E. 脂肪肝

278. 外伤后急性脑受压，最可靠的早期临床表现是

- A. 血压升高，呼吸脉搏变慢
- B. 头痛，呕吐，视乳头水肿
- C. 头痛，呕吐，进行性意识障碍
- D. Cushing 反应
- E. 瞳孔由正常变为不等大

- A. 血清 ALT
B. 血清胆碱酯酶活性明显降低
C. 血清胆固醇明显降低
D. 凝血酶原时间及活动度明显异常
E. 血清胆红素明显升高
270. 下列颅脑损伤最急需处理的是
A. 脑震荡
B. 顶部的凹陷骨折，深度达 1.5cm
C. 颅底骨折引起外耳道出血
D. 开放性颅脑损伤，脑组织外溢
E. 颅内血肿并脑疝形成
271. 孕妇患急性肾盂肾炎应首选
A. 青霉素
B. 氨苄青霉素
C. 红霉素
D. 四环素
- B. 寻找尿路梗阻等不利因素
C. 多饮水，定时排尿
D. 增加营养，提高免疫的功能
E. 大剂量抗生素联合应用
265. 对于风湿性心脏病患者，提示有风湿活动的是
A. 抗“O”增高
B. 白细胞增高
C. 发生了心力衰竭找不到任何诱因
D. 发热 4~5 天
E. 关节疼痛
266. 对于功能性低血糖病人，为减少低血糖发作，下述哪项饮食调整是不对的
A. 少食多餐
B. 进较干食物
C. 高蛋白饮食
D. 高脂饮食
- E. 庆大霉素
272. 孕妇淋病治疗可以使用的药物是
A. 氟嗪酸
B. 红霉素
C. 美满霉素
D. 强力霉素
E. 四环素
273. 孕足月，初产妇，24岁，第二产程2小时30分钟，胎盘娩出后，有间歇性阴道流血并有血块排出，量超过500ml，查：子宫轮廓不清。首先应考虑为
A. 阴道静脉破裂
B. 凝血机制障碍
C. 胎盘残留
D. 宫颈裂伤
E. 子宫收缩乏力
- E. 低纤维饮食
267. 对于丙型肝炎，下列哪项是不正确的
A. 急性丙型肝炎症状较轻
B. 黄疸型患者仅占 25%
C. 易转为慢性肝炎
D. HCV 感染主要通过输血获得
E. 肝细胞癌和丙肝病毒感染无关
268. 下列检查结果，哪项符合佝偻病激期改变
A. 血清钙正常
B. 血清磷增高
C. 钙磷乘积大多高于 30
D. 碱性磷酸酶增高
E. 长骨 X 线检查骨质密度增浓
269. 下列检验中对重型肝炎诊断价值最小的是

- C. 主动脉缩窄
D. 嗜铬细胞瘤
E. 肾动脉狭窄
260. 头皮血肿的处理原则，正确的是
A. 均需切开引流
B. 均需穿刺抽出积血加压包扎
C. 采用局部适当加压包扎
D. 巨大头皮血肿易引起中线移位故脱水治疗
E. 均需静脉输血抢救休克
261. 对一氧化碳中毒有确诊价值的是
A. 血氧饱和度下降
B. 皮肤黏膜樱桃红色
C. 呼吸困难
D. 血氧合血红蛋白浓度降低
E. 血碳氧血红蛋白浓度升高
262. 对乙肝病毒感染具有保护作用的是
A. 抗 HBE
B. 抗 HBs
C. DNA 聚合酶
D. 抗核抗体
E. 抗 HBc
263. 对于 M1 正确的是
A. 骨髓增生活跃，原粒细胞占未分化细胞 > 90%
B. 最易发生 DIC 及 CNS 白血病
C. Ph1 多阳性
D. NAP 升高
E. CD19 (+) CD33 (-) HLA-DR (+)
264. 对于一患慢性肾盂肾炎患者，经系统治疗，尿菌已阴性，为防止复发，下列哪项措施是错误的
A. 停药后，复查尿常规和细菌培养
- 107 ·
255. 关于肝破裂的诊断，下列哪项是错误的
A. 右上腹外伤
B. 局部疼痛及压痛
C. 血红蛋白值逐渐下降
D. 心率加快
E. 必须等待腹腔穿刺抽出血液
256. 关于卵泡生长与发育，哪项是错误的
A. 原始卵泡包含 1 个卵母细胞与周围一层梭形细胞
B. 新生儿有 10 万个始基卵泡，一生中只有 400 ~ 500 个发育成熟
C. 颗粒细胞分泌粘多糖在卵泡周围形成透明带
D. 卵母细胞与周围颗粒细胞组成放射冠
E. 卵丘内含有卵细胞
257. 关于判断组织器官灌流不足，下列哪项是错误的
- A. 神志淡漠
B. 皮肤苍白
C. 收缩压 < 90mmHg
D. 中心静脉压 6 ~ 8cmH₂O (0.59 ~ 0.78kPa)
E. 尿量 < 30ml/h
258. 关于尿路结石预防机制，以下正确的是
A. 服维生素 B₆ 以增加尿中草酸盐溶解
B. 服氧化镁以减少尿中草酸盐排出
C. 碱化尿液以利于磷酸盐的溶解
D. 患草酸盐结石应多吃菠菜西红柿，多吃高蛋白高糖
E. 别嘌呤醇可使尿酸形成减少
259. 下列疾病中，哪种不伴有高血压
A. 急性肾炎
B. 急性肾盂肾炎
- 105 ·
- 106 ·

251. 对孕期生殖道衣原体感染，下列哪项是首选治疗方案
- A. 因沙眼衣原体感染会引起胎儿发育异常，应立即终止妊娠
 - B. 因沙眼衣原体感染者在分娩时会导致新生儿感染，孕期应积极药物治疗
 - C. 因沙眼衣原体感染者对胎儿无致命威胁，不必治疗，产后再行治疗
 - D. 因沙眼衣原体感染者在治疗中药物对胎儿造成不利影响，故不宜药物治疗
 - E. 为防止药物对下一代不良影响故孕期不必治疗，足月时常规采取剖宫产结束分娩

252. 关于有机磷的代谢和排泄正确的是
- A. 在体内蓄积，毒性持久
 - B. 经肾排泄
 - C. 肝内氧化产物不如原来毒性强
 - E. 磷 (P)

246. TRH 兴奋试验在 Graves 病时结果应为
- A. TSH 升高
 - B. TSH 异常升高
 - C. TSH 无变化
 - D. TSH 降低
 - E. 以上都不是

247. 胆总管的血液供应主要来自
- A. 肝固有动脉
 - B. 胆囊动脉
 - C. 胃十二指肠动脉
 - D. 肝右动脉
 - E. 肝左动脉

248. 急性重型病毒性肝炎病理变化是
- A. 肝细胞发生碎屑状坏死
 - B. 肝细胞灶性坏死

- D. 肝内水样产物比原来毒性强
- E. 经皮肤、呼吸道吸收，不经胃肠道排泄

253. 关于抗结核药物的副作用，下列哪项是错误的
- A. 异烟肼：肝功损害
 - B. 利福平：肝功损害
 - C. 吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害
 - D. 链霉素：耳鸣耳聋
 - E. 乙胺丁醇：视神经炎

254. 关于肝（脾）造血期不正确的是
- A. 肝脏造血自胚胎第 8 周开始
 - B. 肝脏造血，胚胎第 5 个月达高峰
 - C. 肝脏造血至生后 4 ~ 5 日停止
 - D. 脾脏开始造血比肝脏晚 1 个多月
 - E. 脾脏至胚胎第 5 个月时完全停止造血

- C. 毛细胆管淤胆
- D. 纤维组织增生
- E. 大量肝细胞坏死

249. 对于慢性乙型肝炎，下列哪项不是干扰素治疗适应证
- A. 血清 ALT 升高
 - B. HBeAg 阳性
 - C. HBV-DNA 阳性
 - D. 有自身免疫性疾病
 - E. 血清胆红素正常

250. 对未明确诊断的急腹症病人，下列哪项处置是错误的
- A. 严密观察
 - B. 禁用吗啡、杜冷丁等止痛剂
 - C. 禁用泻药和灌肠
 - D. 流食
 - E. 抗炎治疗

241. 关于肺炎克雷伯杆菌肺炎，下列哪项是错误的

- A. 该细菌常存在于人体上呼吸道和肠道
- B. 病变以上叶较多见
- C. 病死率高
- D. 治疗首选头孢类药
- E. 慢性病例有时需做肺叶切除

242. 关于泌尿系结石对泌尿系的损害，下列哪项是错误的

- A. 直接损害
- B. 泌尿系梗阻
- C. 泌尿系感染
- D. 恶性变
- E. 诱发憩室

243. 关于性周期的描述下列哪项是错误的

- A. 月经是子宫内膜周期性变化的临床表现

B. 子宫内膜的周期性变化受卵巢的影响

- C. 卵巢的周期性变化直接受垂体、下丘脑的控制
- D. 孕激素对下丘脑产生正负反馈调节
- E. 雌激素对下丘脑产生正负反馈调节

244. 恶性肿瘤早期常有

- A. 消瘦
- B. 无力
- C. 食欲不振
- D. 贫血
- E. 以上都不对

245. 核酸分子中百分比含量相对恒定的元素是

- A. 碳 (C)
- B. 氢 (H)
- C. 氧 (O)
- D. 氮 (N)

236. 下列哪种激素促进卵泡的募集和生长

- A.FSH
- B.LH
- C.PRL
- D.PG
- E.GnRH

B. 铁蛋白主要在细胞浆中

- C. 含铁血黄素可能是变性的铁蛋白
- D. 体内铁主要贮存在肝脾骨髓
- E. 铁蛋白不溶于水，由皮肤细胞代谢

237. 关于肾病综合征的治疗，下列哪项是错误的

- A. 只要血肌酐不升高，应给予高蛋白饮食
- B. 限制食盐和水的摄入
- C. 免疫抑制剂与糖皮质激素可以合用
- D. 可应用抑制血小板凝集药物
- E. 因血浆胶体渗透压低，尿量虽少也不能用利尿剂

239. 急性白血病浸润所致体征最多见于

- A. 中枢神经系统
- B. 心脏增大
- C. 胸骨压痛
- D. 牙龈肿胀，皮肤损害
- E. 淋巴结、肝脾肿大

238. 关于贮存铁，下列哪项是错误的

- A. 以铁蛋白和含铁血黄素形式存在

240. 急性炎症早期局部浸润的炎细胞主要是

- A. 嗜中性粒细胞
- B. 单核细胞
- C. 嗜酸性粒细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 浆细胞

- D. 不易出现周围循环衰竭
E. 确诊有赖于痰培养
231. 急性单核细胞白血病可有
A.NAP 强阳性
B.t (9;22) (q34;q11)
C.PAS 阳性
D. 过氧化物酶阳性
E. 非特异性酯酶阳性，能被 NaF 抑制
232. 葡萄胎患者术后避孕首选
A. 口服避孕药
B. 针剂避孕药
C. 埋入法避孕
D. 阴茎套
E. 宫内节育器
233. 原发性高血压的主要病理生理是
A. 心排出量升高
- B. 交感神经兴奋性增加
C. 肾素分泌过多
D. 周围血管阻力增加
E. 血管内皮细胞过多分泌内皮素
234. 昏晕常见于
A. 椎基底动脉系统 TIA
B. 颈内动脉血栓形成
C. 大脑前动脉血栓形成
D. 大脑中动脉血栓形成
E. 大脑后动脉血栓形成
235. 下列哪种情况常有震颤
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 肺动脉瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全

- 95·
226. 关于急性脑血管病的病因，下列何者是不正确的
A. 脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化
B. 脑栓塞最常见的病因是风心病合并房颤的心源性栓子脱落
C. 脑血栓形成最常见病因是动脉炎
D. 蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤
E. 短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化
227. 关于脾破裂，以下哪项是不正确的
A. 行脾切除术
B. 行脾缝合修补术
C. 待失血性休克好转后手术
D. 可收集腹腔内出血行自体输血
E. 白细胞计数多升高
228. 肾病综合征常见于
A. 微小病变
B. 毛细血管内增生性肾炎
C. 系膜增生性肾炎
D. 新月体肾炎
E. 系膜毛细血管性肾炎
229. 易发生 DIC 的白血病是
A.AML-M1
B.ALL-L2
C.AML-M5
D.AML-M3
E.CML-BC
230. 关于葡萄球菌肺炎，下列哪项是错误的
A. 是急性肺部化脓性感染
B. 病原菌经呼吸道或由皮肤感染灶经血行到达肺脏
C. 可引起全身多发性化脓性病变
- 96·

- B. 结核菌菌体蛋白质可引起过敏反应
C. 类脂质能引起结核结节
D. 多糖类引起免疫反应
E. 标准菌株为 R37Hv
222. 关于胃十二指肠大出血，下列哪项正确
A. 肠鸣音减弱或消失
B. 可有移动性浊音
C. 出现休克，说明失血量至少超过 1500ml
D. 胃小弯溃疡出血，常来自胃左、右动脉
E. 十二指肠后壁出血来自胰十二指肠下动脉
223. 关于胰岛素瘤，下列哪项不是该病的特点
A. 低血糖经常出现在空腹或活动后
B. 胰岛素释放指数增加

- D. 裴斯综合征
E. 致命性家族失眠症
217. 下列哪种疾病抗人球蛋白试验阳性
A.6 磷酸葡萄糖脱氢酶 (G-6-PD) 缺乏症
B. 海洋性贫血
C. 遗传性球形细胞增多症
D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
E. 自身免疫性溶血性贫血
218. 关于非淋菌性尿道炎的治疗原则，不正确的是
A. 早期诊断，早期治疗
B. 及时、足量、规则治疗
C. 不同病性采用不同的治疗方案
D. 同时治疗性伴
E. 抗衣原体、支原体、真菌联合用药

219. 子宫峡部是

- C. 血糖降至 1.67mmol/L，胰岛素则停止释放
D. 禁食后多在 48 小时出现低血糖
E. 胰高血糖素可诱发低血糖

224. 关于骨折的愈合，下列哪项不正确
A. 多次手法复位，不利于骨折愈合
B. 手术比手法复位，更能增加愈合机会
C. 骨牵引过度可造成延迟愈合或不愈合
D. 内固定和外固定不充分不利愈合
E. 适当功能练习有利于愈合
225. 关于高血压的流行病学调查以下哪因素未确定与发病有关
A. 年龄
B. 体重
C. 钠盐
D. 吸烟
E. 饮酒

- A. 子宫颈阴道部
B. 子宫颈阴道上部
C. 子宫颈管最狭窄部分
D. 子宫颈与子宫体之间最狭窄部分
E. 子宫体最狭窄部分
220. 关于弥漫性轴索损伤，下列哪项是错误的
A. 受伤当时立即出现的昏迷时间较长
B. 神志好转后，可因继发脑损伤而再次昏迷
C. 造成广泛的脑皮层损伤
D. 昏迷原因主要是皮层与皮层下中枢失去联系
E. CT 可见皮髓质交界处，胼胝体等区域有多个点状出血灶
221. 关于结核病，下列哪条是错误的
A. 细核菌分为人型、牛型和鼠型

- B. 肠切除，肠吻合术
C. 肠外置造口术
D. 肠捷径吻合
E. 以上都不是
212. 肾病综合征时，产生水肿的主要始动因素是
A. 毛细血管滤过压增高
B. 毛细血管通透性增高
C. 钠与水的潴留
D. 血浆胶体渗透压降低
E. 淋巴液回流受阻
213. 国人咯血的常见原因是
A. 肺结核
B. 肺吸虫
C. 肺梗死
D. 肺淤血
E. 肺癌
214. 体内产生 NADPH 的主要代谢途径是
A. 糖酵解
B. 三羧酸循环
C. 糖原分解
D. 磷酸戊糖途径
E. 糖异生
215. 体内缺铁初期的最早最可靠的诊断依据是
A. 典型的小细胞低色素性贫血血象
B. 血清总铁结合力增高
C. 血清铁减低
D. 骨髓贮存铁减少或缺乏
E. 血清转运铁蛋白饱和度下降
216. 下列哪种疾病不是朊毒体感染
A. 克雅病
B. 莱姆病
C. 库鲁病
206. 产后子宫内膜完全修复的时间
A. 产后 6 周
B. 产后 8 周
C. 产后 10 周
D. 产后 4 周左右
E. 产后 30 天
207. 在我国，围生期是指
A. 妊娠第 37 周期到出生后第 2 周
B. 妊娠第 28 周期到出生后第 1 周
C. 妊娠第 28 周期到出生后第 2 周
D. 妊娠第 38 周期到出生后第 2 周
E. 妊娠第 38 周期到出生后第 1 周
208. 我国肝硬化最常见的病因是
A. 慢性酒精中毒
B. 乙型病毒性肝炎
C. 自身免疫性肝炎
D. 丙型病毒性肝炎
209. 引起慢性肾功能不全的病因最常见的
A. 慢性肾盂肾炎
B. 肾结核
C. 肾结石
D. 肾小动脉硬化
E. 慢性肾小球肾炎
210. 我国育龄期妇女最常用的长效避孕措施为
A. 避孕套
B. 阴道隔膜
C. 宫内节育器
D. 口服避孕药
E. 安全期避孕
211. 严重结肠损伤的治疗最好为
A. 裂伤缝合

- E. 闭式引流后，引流量每小时大于200ml，持续3小时
201. 急性坏死性肠炎可出现
A. 便色黄或暗绿，有腥臭味
B. 便次较多，发育不受影响
C. 粘液脓血便，常伴有发热
D. 血便或呈赤豆汤样便
E. 便泡沫多，含粘液，豆渣样
202. 抢救羊水栓塞的首要措施是
A. 纠正DIC及继发纤溶
B. 纠正呼吸循环衰竭
C. 纠正肾功能衰竭
D. 立即终止妊娠
E. 切除子宫
203. 抢救颅内血肿病人，最根本措施是
A. 20% 甘露醇 250ml 快速静点
- B. 气管切开，减轻脑水肿
C. 清除血肿
D. 人工冬眠及物理降温
E. 去骨瓣减压
204. 抑制血小板聚集功能的药物是
A. 布洛芬
B. 卡托普利
C. 强地松
D. 阿司匹林
E. 苯丙酸诺龙
205. 肾脏活体组织病理检查为50%以上肾小囊中有新月体形成，其最可能的诊断为
A. 急性肾小球肾炎
B. 慢性肾小球肾炎
C. 狼疮性肾炎
D. 糖尿病肾病
E. 急进性肾小球肾炎

- 83·
- E. 临床甲亢表现消失
196. 关于溶血性贫血的定义，哪一项是正确的
A. 红细胞寿命缩短
B. 红细胞破坏增加
C. 骨髓造血功能亢进
D. 红细胞破坏增加，骨髓能代偿
E. 红细胞破坏增加，超过骨髓代偿能力
197. 来院就诊的25岁妊娠初孕妇，对估计病情及决定处理方案最有价值的辅助检查方法是
A. 全血粘度比值和血浆粘度比值
B. 测定红细胞比容
C. 眼底检查
D. 测定血谷丙转氨酶值
E. 测定尿雌激素/肌酐值
198. 呕血最常见的原因是
A. 胃底、食管静脉曲张破裂
B. 食管癌
C. 消化性溃疡
D. 钩端螺旋体病
E. 急性胃粘膜病变
199. 急性肾炎常见于
A. 微小病变
B. 毛细血管内增生性肾炎
C. 系膜增生性肾炎
D. 新月体肾炎
E. 系膜毛细血管性肾炎
200. 进行性血胸是指
A. 损伤后DIC
B. 血胸量大于500ml
C. 血胸量大于1000ml
D. 胸腔闭式引流一次放出血量达500ml
- 84·

- C. 前置胎盘
D. 产后失血性休克
E. 不全流产大出血
191. 肝外胆管癌发生率最高的部位是
 A. 左肝管
 B. 下段胆管
 C. 中段胆管
 D. 上段胆管
 E. 胆囊管
192. 肝素、双香豆素用于
 A. 脑保护剂
 B. 抗凝治疗
 C. 溶栓治疗
 D. 血液稀释疗法
 E. 脑代谢活化剂
193. 肝硬化性腹水约占腹水患者的
 A. 55%
 B. 60%
 C. 65%
 D. 70%
 E. 75%
194. 6 ~ 14 岁血红蛋白的低限为
 A. 100g/L
 B. 110g/L
 C. 120g/L
 D. 90g/L
 E. 125g/L
195. 抗甲状腺药停药的关键指标是
 A. T₃、T₄ 正常
 B. T₃、T₄ 正常，TRAb 明显下降或转阴
 C. TSH 正常
 D. FT₃ 正常
- D. 呕吐物呈酸臭味，有宿食
E. 无呕吐
186. 坐骨结节间径 7cm，后矢状径 7cm，足月妊娠一般应采取何种分娩方式
 A. 产钳术
 B. 胎吸术
 C. 剖宫产
 D. 会阴侧切
 E. 自然分娩
187. 4 岁小儿标准体重是
 A. 12kg
 B. 14kg
 C. 16kg
 D. 18kg
 E. 20kg
188. 何谓大量咯血
 A. 日咯血量 > 100ml
 B. 日咯血量 > 200ml
 C. 一次咯血量 > 100ml
 D. 一次咯血量 > 200ml
 E. 一次咯血量 > 300ml
189. 作子宫切除时，下列注意事项哪项是错误的
 A. 推离膀胱腹膜反折时，避免损伤膀胱
 B. 推离直肠子宫腹膜反折时，避免损伤直肠
 C. 切除子宫骶骨韧带时，避免损伤输尿管
 D. 切除阔韧带时，避免损伤膀胱
 E. 切断子宫动脉时，注意勿损伤输尿管
190. Sheehan 综合征最常见的原因是
 A. 胎盘早期剥离
 B. 输卵管妊娠

- B. 出现毒蕈碱和烟碱样症状
C. 血胆碱酯酶活性降低
D. 阿托品试验诊断阳性
E. 呕吐物和衣服有大蒜味
181. 患儿 3 个月，体检时发现后囟尚未闭合，为明确病情，首选的检查是
A. 腰穿，检查脑脊液
B. T₃、T₄、TSH
C. 血碱性磷酸酶
D. 全身骨骼 X 光片
E. 属正常情况，无需检查
182. 低分子右旋糖酐是用于
A. 脑保护剂
B. 抗凝治疗
C. 溶栓治疗
D. 血液稀释疗法
E. 脑代谢活化剂
183. 输血后肝炎主要由哪种病毒引起
A. 甲型肝炎病毒
B. 乙型肝炎病毒
C. 丙型肝炎病毒
D. 戊型肝炎病毒
E. 丁型肝炎病毒
184. 研究提示 Graves 病的发病与下列哪种细菌感染有关
A. 大肠杆菌
B. 幽门螺杆菌
C. α 链球菌
D. 耶尔森菌
E. 肺炎球菌
185. 急性完全性输入段梗阻形成可有
A. 呕吐物为食物，无胆汁
B. 呕吐物为胆汁，无食物
C. 呕吐物既有胆汁，又有食物
175. 下列哪种有机磷农药中毒，从尿中可检出三氯乙醇
A. 对硫磷
B. 敌百虫
C. 内吸磷
D. 马拉硫磷
E. 甲拌磷
176. 判断急性心肌梗死面积最有价值的是
A. Q 波的宽度，深度
B. 白细胞增加的程度
C. 疼痛和持续时间
D. 血沉增快的程度
E. 血清 CPK 增高的程度
177. 判断糖尿病控制程度较好的指标是
A. 空腹血糖
B. 饭后血糖
C. 糖化血红蛋白
178. 诊断双胎妊娠最常用的方法是
A. 听胎心
B. 腹部触诊
C. X 线腹部摄片
D. B 超
E. 多普勒超声检查
179. 诊断外伤性脾破裂，下列哪项最重要
A. 左上腹有外伤史
B. 有早期休克表现
C. 腹部有压痛而且逐渐扩大
D. 有进行性贫血
E. 诊断性腹腔穿刺，有不凝固血液
180. 诊断有机磷中毒最重要的指标是
A. 确切的接触史

170. 诊断房间隔缺损时，最有意义的右心导管检查结果是
A. 导管由右心房进入左心房
B. 右心房血氧含量高于上下腔静脉平均血氧含量
C. 右心室血氧含量增高
D. 右心房压力增高
E. 右心室压力增高
171. 诊断颅盖骨折通常依据是
A. 头颅 X 线摄片
B. 头皮伤痕
C. 局部触诊闻及骨擦音
D. 剧烈头痛伴呕吐
E. 对侧肢体偏瘫
172. 诊断感染性心内膜炎的最重要方法是
A. 免疫学检查
B. 心电图检查

- C.X 线检查
D. 血培养
E. 常规生化检查
173. 诊断腹部闭合性损伤胃破裂，最有意义的是
A. 白细胞计数及中性粒细胞数增高
B. 腹部肌紧张及反跳痛
C. 有固定压痛点
D. 膈下游离气体
E. 超声波测出腹腔内有积液
174. 尿激酶、链激酶主要用于
A. 脑保护剂
B. 抗凝治疗
C. 溶栓治疗
D. 血液稀释疗法
E. 脑代谢活化剂

- 71.
165. 诊断慢性血管内溶血的重要依据是
A. 贫血与黄疸
B. 脾肿大
C. 血红蛋白尿
D. 尿含铁血黄素阳性
E. 粪胆原增加
166. 诊断典型劳力性心绞痛，最有特征的是
A. 胸痛多在夜间发作
B. 胸痛发作多在 15 分钟以上
C. 持续左前胸憋闷感
D. 疼痛时心电图示 ST 段抬高
E. 休息或含硝酸甘油数分钟内疼痛消失
167. 诊断肺结核最可靠的依据是
A. 结核中毒症状及明显的呼吸道局部症状
B. 胸片示锁骨上下浸润性病灶及空洞形成

- 72.
- C.5 单位结素试验强阳性
D. 痰中找到结核菌
E. 血沉明显增快
168. 诊断性刮宫刮出多量豆腐渣样组织时，应高度怀疑
A. 无排卵型功能失调性子宫出血
B. 有排卵型功能失调性子宫出血
C. 不全流产
D. 子宫内膜癌
E. 子宫肉瘤
169. 诊断性腹腔穿刺不应用于
A. 小儿及老年人
B. 精神状态不正常者
C. 昏迷病人
D. 诊断已明确的病人
E. 诊断不明确的病人

- E. 红细胞平均直径恢复正常
160. 特异性投射系统的特点是
A. 弥散投射到大脑皮质广泛区域
B. 点对点投射到大脑皮质特定区域
C. 上行激活系统是其主要结构
D. 改变大脑皮质兴奋状态是其主要功能
E. 对催眠药和麻醉药敏感
161. 胸部损伤下述哪种情况为剖胸探查手术适应证
A. 气胸肺萎陷超过 30%
B. 多根多处肋骨骨折
C. 胸部爆震伤
D. 进行性血胸
E. 损伤性窒息发绀严重
162. 脑震荡可出现
A. 伤后无昏迷，3 小时后意识障碍
- B. 伤后立即昏迷，伴去脑强直发作
C. 伤后浅昏迷，脑脊液血性
- D. 伤后昏迷，片刻后清醒
- E. 伤后啼哭，抽搐
163. 某工地，工人因外伤致股骨干闭合性骨折，在运往医院途中应该
A. 用木板床运送
B. 置左下肢外展屈曲位
C. 置左下肢内收内旋位
D. 人力牵引置下肢中立位
E. 将左下肢和右下肢捆扎一起
164. 诊断肾病综合征的基本条件为
A. 高血压
B. 高胆固醇血症
C. 大量蛋白尿
D. 少尿
E. 以上都有

165. 病人突然昏迷、抽搐、瞳孔缩小、皮肤湿冷、多汗、呼吸困难，应考虑下列哪几种疾病可能性大
A. CO 中毒
B. 巴比妥类药物中毒
C. 中暑
D. 阿托品中毒
E. 有机磷农药中毒
166. 消化性溃疡发生的决定因素是
A. 胃蛋白酶
B. 胆盐
C. 乙醇
D. 胃酸
E. 非甾体类药物
167. 胃肠粘膜因炎症等病变致血浆、粘液渗出所致的腹泻称为
A. 动力性腹泻
- B. 吸收不良性腹泻
C. 渗出性腹泻
D. 渗透性腹泻
E. 分泌性腹泻
168. 3 ~ 6 个月婴儿患佝偻病，其主要的骨骼症状是
A. 方颅
B. 颅骨软化
C. 肋骨串珠
D. 郝氏沟
E. “O” 形腿
169. 缺铁性贫血，铁剂治疗 5 至 10 天首先出现的治疗反应是
A. 红细胞总数增高
B. 血清铁增加
C. 骨髓外铁增加
D. 网织红细胞数升高

- E. 金葡菌肺炎
150. 胸部损伤后咯血或痰中带血提示
A. 气胸
B. 血胸
C. 肺或支气管损伤
D. 食管损伤
E. 损伤性窒息
151. 下列哪项符合急性淋巴细胞性白血病
A. 为儿童最多见的急性白血病
B. 中枢神经系统白血病少见
C. 化疗效果差
D. 易发生 DIC 出血严重
E. 与 EB 病毒感染有关
152. 关于头皮裂伤，错误的是
A. 钝性撞击不会发生裂伤
B. 急救时应立即包扎止血
- C.24 小时的裂伤清创后可一期缝合
D. 清创后，采用分层缝合为好
E. 头皮缺损应予修补
153. 关于出生后血液循环的改变，以下哪项不正确
A. 肺循环的阻力下降
B. 左心房压力增高，体循环压力升高
C. 卵圆孔功能上关闭
D. 动脉导管功能上关闭
E. 脐血管血流停止，立即形成韧带
154. 急性肾炎临床表现中消失或恢复正常最慢是
A. 高血压
B. 水肿
C. 血尿及微量蛋白尿
D. 补体 C3
E. 管型尿

- 63·
- A. 龟头水肿性红斑、糜烂、渗液，可见脓性分泌物
B. 龟头见一指甲大小溃疡，质硬，边缘隆起，基底清洁，不痛
C. 冠头沟处串珠样排列的光滑小丘疹
D. 龟头见指甲大小白斑，界清，无自觉症状
E. 暗红，见一较大溃疡，疼痛，质较硬，表面分泌物多
- 测出硝基酚
A. 敌百虫
B. 对硫磷
C. 内服磷
D. 马拉硫磷
E. 甲拌磷
146. 最易引起脓气胸的肺炎是
A. 金葡菌肺炎
B. 肺炎球菌肺炎
C. 克雷伯杆菌肺炎
D. 病毒性肺炎
E. 肺炎支原体肺炎
147. 下列哪种有机磷农药中毒，从尿中可检
148. 下列哪种肌瘤不易早期出现症状
A. 浆膜下肌瘤
B. 黏膜下肌瘤
C. 肌壁间肌瘤
D. 宫颈肌瘤
E. 肌瘤红色变性
149. 下列哪种肺炎可呈暴发性流行
A. 肺炎球菌肺炎
B. 肺炎支原体肺炎
C. 肺炎克雷伯杆菌肺炎
D. 军团菌肺炎
- 64·

140. 表现为心脏炎并心力衰竭的急性风湿热的治疗，下列哪一项是不恰当的

- A. 吸氧、低盐饮食
- B. 大剂量激素
- C. 小剂量阿司匹林
- D. 利尿剂
- E. 维持电解质平衡

141. 急性肾炎时，产生水肿的主要始动因素是

- A. 毛细血管滤过压增高
- B. 毛细血管通透性增高
- C. 钠与水的潴留
- D. 血浆胶体渗透压降低
- E. 淋巴液回流受阻

142. 关于 2:3:1 含钠液，下列哪项是错误的

- A. 0.9% 氯化钠 2 份
- B. 5% 葡萄糖 3 份

C. 1.4% 碳酸氢钠 1 份

- D. 1.87% 乳酸钠 1 份
- E. 1.2% 氯化钾 1 份

143. 能出现反常呼吸的肋骨骨折是

- A. 单根肋骨骨折
- B. 两根肋骨骨折
- C. 双侧肋骨单根骨折
- D. 多根多处肋骨骨折
- E. 多发性肋软骨骨折

144. 通常只在儿童或青少年可听到的心音是

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 第五心音额外心音

145. 硬下疳典型表现为

146. 改善急性左心衰竭症状最有效的药物是

- A. 利尿剂
- B. 洋地黄
- C. 钙离子拮抗剂
- D. β 肾上腺素能受体阻滞剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

147. 张力性气胸主要的病理生理改变是

- A. 纵隔向健侧移位
- B. 纵隔扑动
- C. 胸壁反常呼吸运动
- D. 肺内气体对流
- E. 皮下气肿

148. 妊娠早期合并甲亢最有意义的指标是

- A. 甲状腺肿大

B. 多食、心率快

- C. T₃、T₄ 升高
- D. 消瘦
- E. FT₃、FT₄ 升高

149. 妊娠早期羊水的主要来源是

- A. 母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
- B. 胎儿肺
- C. 胎儿尿液
- D. 胎膜
- E. 胎儿皮肤

150. 表示有传染性指标是

- A. HBsAg
- B. 抗 HBs
- C. HBeAg
- D. 抗 HBE
- E. 抗 HBc

- D. 口服糖耐量试验
E. 空腹胰岛素测定
130. 直肠破裂
A. 左肩放射性痛
B. 尿淀粉酶升高
C. 脐下游离气体
D. 腹膜后积气
E. 腹部外伤后直肠指检指套染血
131. 转为慢性肝炎比例最高的是
A. 甲型肝炎病毒
B. 乙型肝炎病毒
C. 丙型肝炎病毒
D. 丁型肝炎病毒
E. 戊型肝炎病毒
132. 轮状病毒引起肠炎的机制，哪项不正确
A. 乳糖消化障碍，使肠腔渗透压增高，
B. 氯化铵
C. 碳酸氢钠
D. 氯化钾
E. 别嘌呤醇
126. 混合性呼吸困难见于
A. 急性喉炎
B. 气管异物
C. 支气管哮喘
D. 大量胸腔积液
E. 颅脑外伤
127. 提高早期胃癌诊断率的三项关键性手段是
A. 纤维胃镜检查，胃液细胞学检查，X线钡餐检查
B. 纤维胃镜检查，胃液酸碱度检查，X线钡餐检查
C. 胃液细胞学检查，粪便隐血试验，X线钡餐检查
- 导致水和电解质从肠壁反流入肠腔
B.Na-K-ATP 酶钠泵活性降低
C. 钠与葡萄糖吸收障碍
D. 病毒侵袭小肠绒毛上成熟的带有微绒毛的上皮细胞
E. 病毒产生肠毒素使肠道分泌增加
133. 肾小球疾病出现大量蛋白尿的主要原因是
A. 肾小球内皮窗孔径增大
B. 肾小球基膜结构的改变
C. 肾小球上皮细胞足突裂隙增宽
D. 电荷屏障遭到破坏
E. 肾小球血流量增大
134. 1岁小儿未接种过卡介苗，PPD 阳性表示
A. 受过结核感染，不一定有活动结核
B. 对结核无免疫力，需立即接种卡介苗
C. 体内有活动结核
- 55·
线钡餐检查
D. 胃液细胞学检查，粪便隐血试验，纤维胃镜检查
E. 纤维胃镜检查，粪便隐血试验，X线钡餐检查
128. 10个月婴儿患佝偻病（激期），其特征性表现是
A. 易激惹
B. 烦闹
C. 睡眠不安
D. 多汗、枕秃
E. 方颅
129. 若诊断临床糖尿病，应选择下述哪项检查
A. 尿糖
B. 空腹血糖
C. 糖化血红蛋白
- 56·

120. 软化灶是指局部脑组织的

- A. 萎缩
- B. 变性
- C. 坏死
- D. 水肿
- E. 脓肿

D. 4周

E. 6周

121. 非抑制性胰岛素样活性过高导致低血糖的是

- A. Addison 病
- B. 糖原积累病
- C. 肝硬化
- D. 腹膜外肿瘤
- E. NIDDM 早期

123. 常见副反应为干咳的药物是

- A. 卡托普利
- B. 硝苯地平
- C. 双氢氯噻嗪
- D. 氨苯蝶啶
- E. 美托洛尔

122. 急性肾盂肾炎的疗程通常是

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周

124. 晚期肺结核可发生

- A. 喉、肠结核
- B. 胸膜炎
- C. 肺心病
- D. 脑膜结核
- E. 支气管扩张症

125. 减少尿酸形成时可服用

- A. 氧化镁或维生素 B₆

可诊断为

- A. 轻型糖尿病
- B. 糖耐量低减
- C. 继发性糖尿病性糖尿
- D. 餐后糖尿
- E. 非葡萄糖糖尿

D. CT

E. MRI

116. 重度新生儿寒冷损伤综合征的硬肿范围是

- A. < 20%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%
- E. > 50%

118. 人乳中的脂肪易于消化吸收，是因为人

- 乳中含有
- A. 蛋白酶
- B. 淀粉酶
- C. 乙型乳糖
- D. 甲型乳糖
- E. 脂肪水解酶

117. 颅内肿瘤的诊断

- A. X线颅片
- B. 脑电图
- C. 脑血管造影

119. 良性与恶性肿瘤判定中，最有诊断意义

- 的是
- A. 生长方式
- B. 生长速度
- C. 肿瘤的异型性
- D. 对机体影响
- E. 出血与坏死

- A. 肺源性
B. 心源性
C. 中毒性
D. 呼吸中枢性
E. 精神性
111. 预防草酸盐结石时可服用
A. 氧化镁或维生素 B₆
B. 氯化铵
C. 碳酸氢钠
D. 氯化钾
E. 别嘌呤醇
112. 佝偻病初期的主要临床表现是
A. 多汗、枕秃
B. 骨骼改变
C. 非特异性神经精神症状
D.X 线长骨片显示骨骼端钙化预备带消失
105. 细菌性痢疾的病变部位主要是
A. 乙状结肠、直肠
B. 空肠
C. 回肠
D. 十二指肠
E. 以上都不是
106. 抗胰岛素的激素不足导致低血糖的是
A. Addison 病
B. 糖原积累病
C. 肝硬化
D. 腹膜外肿瘤
E. NIDDM 早期
107. 下列属于脂溶性维生素的是
A. 维生素 A
B. 维生素 B
C. 维生素 C
D. 叶酸
- E. 血清钙、磷、碱性磷酸改变
113. 梗阻性黄疸时，BUS 显示胆总管和肝内胆管均不扩张，为明确诊断应选择哪项检查
A. 放射性核素胰腺扫描
B. PTC
C. 低张十二指肠造影
D. ERCP
E. CT
114. 常并发败血症的肺炎
A. 金葡菌肺炎
B. 肺炎球菌肺炎
C. 克雷伯杆菌肺炎
D. 病毒性肺炎
E. 肺炎支原体肺炎
115. 患者饭后尿糖（++），空腹尿糖阴性，
- E. 烟酸
108. 急性肾小球肾炎的诊断依据中，哪一项是关键
A. 全身水肿
B. 高血压
C. 尿少
D. 血尿及红细胞管型尿
E. 蛋白尿及透明管型尿
109. 预防尿酸盐结石可服用
A. 氧化镁或维生素 B₆
B. 氯化铵
C. 碳酸氢钠
D. 氯化钾
E. 葡萄糖酸钙
110. 按发生机制，呼吸窘迫见于哪类呼吸困难

- B. 儿童每隔 5 年复种一次
C. 卡介苗效果是绝对肯定的
D. 接种前均需做结素试验
E. 使人产生免疫力同时也产生变态反应
101. 注意增强常见于
A. 青春型精神分裂症
B. 偏执型精神分裂症
C. 单纯型精神分裂症
D. 紧张型精神分裂症
E. 慢性精神分裂症
102. 关于他巴唑治疗甲亢的作用机制，下述哪一点是错误的
A. 抑制甲状腺过氧化酶活性
B. 抑制碘的活化
C. 抑制酪氨酸碘化
D. 抑制碘化酪氨酸的缩合
E. 抑制甲状腺素的释放
103. 关于外伤性下视丘损伤，下列哪项是错误的
A. 早期意识障碍
B. 早期锥体束征
C. 高热或低温
D. 消化道出血或穿孔
E. 尿崩症
104. 肩部外伤致锁骨骨折患者，检查时发现：肩外展、伸肘、屈肘功能及腕、手的功能完全丧失，并有感觉障碍。此患应选择哪种治疗
A. 早期手术切开复位，内固定，同时探查臂丛神经
B. 手法复位，横 8 字绷带固定
C. 手法复位，石膏外固定
D. 手法复位，夹板固定
E. 牵引复位

- 43·
- B. 胃肠运动及分泌均抑制
C. 胃肠运动及分泌均增强
D. 胃肠运动抑制，分泌增强
E. 胃肠内的括约肌抑制
96. 闭合性气胸，肺萎陷不超过百分之几，患者可无自觉症状，不需处理
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
E. 50%
97. 关于上尿路结石的治疗，哪项是不确切的
A. 结石引起肾疼前时应手术
B. 双侧肾结石应先手术简单安全一侧
C. 双侧输尿管结石，先取梗阻重一侧
D. 一侧肾结石一侧输尿管结石，先取输尿管结石
- 44·
- E. 结石引起梗阻，肾功能严重受损应手术
98. 关于金黄色葡萄球菌肺炎的特点，不正确的是
A. 多见于新生儿及婴幼儿
B. 冬春季节发病较多
C. 肺组织出血、坏死和多发性小脓肿形成
D. 中毒症状重
E. X 线的特征较固定
99. 关于支原体肺炎，以下哪项是错误的
A. 秋季发病多
B. 儿童青少年多
C. 可引起肺炎性浸润和空洞形成
D. 有咽炎，支气管炎表现
E. 半数病例无症状
100. 关于卡介苗接种，下述哪项是正确的
A. 菌苗为无毒人型活结核菌

- A. 鼻流血
- B. 双眼睑皮下青紫，逐渐加重
- C. 乳突下或咽后壁粘膜下瘀血
- D. 脑脊液耳漏
- E. 颞部头皮肿胀瘀血

91. Murphy 征阳性则提示

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 急性胆管炎
- C. 肝总管结石
- D. 左肝管结石
- E. 急性胆囊炎

92. 小儿体重在出生后第一年，后半年平均每月增长

- A. 200 ~ 300g
- B. 300 ~ 400g
- C. 400 ~ 500g
- D. 500 ~ 600g

85. 血钙离子低于多少，可引起手足搐搦发作

- A. 1.0mmol/L(4mg/dl)
- B. 1.75mmol/L(7mg/dl)
- C. 1.88mmol/L(7.5mg/dl)
- D. 2.25mmol/L(9mg/dl)
- E. 1.38mmol/L(5.5mg/dl)

86. 血胸继发感染诊断最可靠的依据是

- A. 寒战，高热
- B. 白细胞计数增高
- C. 胸腔穿刺检查，红细胞与白细胞比例为 300:1
- D. 胸腔穿刺液混浊
- E. 穿刺液查到细菌，细菌培养阳性

87. 血管检查所见的临床意义，哪项正确

- A. 奇脉—休克
- B. 水冲脉—动脉导管未闭
- C. 交替脉—高血压

E. 600 ~ 800g

93. 多根多处肋骨骨折急救要点主要是

- A. 输血补液，防治休克
- B. 控制反常呼吸，保持呼吸道通畅
- C. 立即行开胸探查术
- D. 加压给氧
- E. 镇静、镇痛

94. 多数先天性甲状腺功能减低症患儿出现明显症状的时间是

- A. > 1 个月
- B. > 3 个月
- C. > 6 个月
- D. > 9 个月
- E. > 12 个月

95. 交感神经对胃肠运动与分泌的作用是

- A. 胃肠运动增强，分泌抑制

D. 短绌脉—心包积液

E. 重搏脉—急性心肌梗死

88. 小儿特有的对能量的需要是

- A. 基础代谢
- B. 活动所需
- C. 生长所需
- D. 食物的特殊动力作用
- E. 排泄的消耗

89. 一妇女正常阴道分娩刚结束，检查脐带时符合下列哪种情况才正确

- A. 一条脐动脉，二条脐静脉
- B. 二条脐动脉，一条脐静脉
- C. 一条脐静脉，一条脐动脉
- D. 二条脐静脉，二条脐动脉
- E. 一条脐动脉，三条脐静脉

90. 后颅凹骨折后会出现

80. 血中直接调节胰岛素分泌而且经常起调节作用的重要因素是
A. 游离脂肪酸
B. 血糖浓度
C. 肾上腺素
D. 胃肠道激素
E. 血酮体浓度
81. 血压持续升高，有脑血栓形成见于
A. 高血压病一期
B. 高血压病二期
C. 高血压病三期
D. 急进型高血压病
E. 高血压脑病
82. 12个月婴儿头围应是
A. 34cm
B. 46cm
C. 48cm
83. 血压骤然升高，剧烈头痛，抽搐昏迷见于
A. 高血压病一期
B. 高血压病二期
C. 高血压病三期
D. 急进型高血压病
E. 高血压脑病
84. 血尿的正确概念是
A. 离心尿沉渣高倍镜下每视野3个以上红细胞
B. 离心尿沉渣低倍镜下偶见个别红细胞
C. 尿呈洗肉水样
D. 显微镜下大量红细胞
E. 离心尿沉渣高倍镜下每视野10个以上红细胞

- 35·
- D. 大量胸腔积液
E. 有机磷中毒
75. 下列哪项症状常见于严重休克
A. 肺性发绀
B. 心性混合性发绀
C. 淤血性周围性发绀
D. 缺血性周围性发绀
E. 混合性发绀
76. 延髓外侧面是由
A. 大脑前动脉供血
B. 大脑后动脉供血
C. 大脑中动脉供血
D. 基底动脉供血
E. 椎动脉供血
77. 新生儿期指的是
A. 从孕期28周至生后28天内
- B. 从孕期28周至生后1个月内
C. 从出生后脐带结扎时起至生后28天内
D. 从出生后脐带结扎时起至生后30天内
E. 从出生后脐带结扎时起至生后1个月内
78. 仰卧位和左侧卧位听诊最清晰的心音是
A. 第一心音
B. 第二心音
C. 第三心音
D. 第四心音
E. 第五心音
79. 血中还原血红蛋白至少达多少时，皮肤粘膜可出现发绀
A. > 70g/L
B. > 65g/L
C. > 60g/L
D. > 55g/L
E. > 50g/L
- 36·

- E. 以上全不是
70. 单核-巨噬细胞对下列哪种血细胞的生成有调节作用
A. 红细胞
B. 血小板
C. 白细胞
D. 红细胞和白细胞
E. 以上均不正确
71. 牛乳与人乳比较最大的缺点是
A. 牛乳含较多的酪蛋白
B. 牛乳中缺乏脂肪酶
C. 牛乳中缺乏各种免疫因子
D. 牛乳易为细菌污染
E. 牛乳是以甲型乳糖为主
72. 男，32岁，胸骨左缘第3肋间有舒张早期递减型吹风样杂音，可考虑主动脉瓣关闭

不全诊断。由于肺动脉扩张引起瓣膜相对关闭不全所产生的杂音称为
A. Austin-Flint 杂音
B. Graham-Steel 杂音
C. Gibson 杂音
D. Duroziez 杂音
E. Oliver 征

- 31·
- C. 胃肠吻合口的部位
D. 近端空肠与胃小弯的关系
E. 结肠前或结肠后胃肠吻合
65. 早期肺癌首选的治疗方法是
A. 药物治疗
B. 放疗法
C. 放疗加化疗
D. 手术切除病肺
E. 免疫疗法
66. 因消化道恶性肿瘤转移最早受累的是
A. 肺
B. 肾
C. 肝
D. 脾
E. 胰
67. 引起急性上呼吸道感染的主要病原为

73. 以下哪项不是小儿疾病的特点
A. 起病急
B. 变化快
C. 合并症多
D. 后遗症多
E. 感染性疾病多
74. 吸气性呼吸困难见于
A. 脑外伤
B. 甲状腺肿大
C. 心肌病

- 32·
- A. 细菌
B. 病毒
C. 真菌
D. 原虫
E. 螺旋体
68. 因溃疡病作胃大部切除术，适当的胃切除量
A. 30% ~ 40%
B. 40% ~ 50%
C. 50% ~ 60%
D. 60% ~ 70%
E. 70% ~ 80%
69. 缺铁性贫血早期形态学改变为
A. 小细胞正色素性贫血
B. 小细胞低色素性贫血
C. 正细胞正色素性贫血
D. 大细胞性贫血

- A. 桡骨干的斜骨折
B. 股骨干的横骨折
C. 伸直型肱骨髁上骨折
D. 尺、桡骨双骨的青枝骨折
E. 股骨颈骨折内收型
60. 下列哪项符合 M3 特点
A. 过氧化物酶阴性
B. 无 Auer 小体
C. 非特异酯酶阴性
D. 苏丹黑染色阴性
E. 糖原 PAS 反应 (+) 或成块或颗粒状
61. 有机磷中毒引起的毒蕈碱样症状是
A. 肌束颤动
B. 流涎
C. 血压升高
D. 瞳孔缩小
E. 休克
62. BMI(kaup) 指数是指
A. 体重 / 身高 $\times 1000$
B. 体脂含量
C. 体重 / 身高 $^2 \times 10000$
D. 胸围 / 身高 $\times 100$
E. 体脂含量 / 身高 $\times 100$
63. 有关慢性肾炎，下列哪一项是正确的
A. 发病与链球菌感染有明确关系
B. 大部分与急性肾炎之间有确定的因果关系
C. 发病机制的起始因素为免疫介导性炎症
D. 不同的病例其肾小球的病变是相同的
E. 可发生于任何年龄，其中女性居多
64. 毕 I 式与毕 II 式胃大部分切除术的主要区别是
A. 切断十二指肠
B. 切除胃的多少

- 27·
- 进入主动脉
D. 肺循环血量减少
E. 室间隔缺损部位，发生右向左分流是造成青紫的主要原因
55. 有关盆腔脓肿的治疗错误的是
A. 小脓肿可采用非手术治疗
B. 可采用经腹腔排脓
C. 已婚妇女可采用后穹隆途径排脓
D. 盆腔脓肿未形成时，应以药物为主，辅以物理疗法
E. 脓肿较大时，须手术治疗
56. 下列哪项是肺炎球菌肺炎有特殊意义的症状
A. 突然寒战、稽留热
B. 咳嗽、胸痛
C. 气急、发绀
D. 咳铁锈色痰
- E. 恶心、呕吐、腹胀
57. 在腹部平片不易显影的结石是
A. 磷酸盐结石
B. 草酸盐结石
C. 尿酸结石
D. 碳酸盐结石
E. 混合结石
58. 在暴发型流脑休克型的治疗中，经充分扩容、纠酸治疗无效时，血管活性药物可首选
A. 阿拉明
B. 多巴胺
C. 654-2
D. 苄胺唑啉
E. 异丙基肾上腺素
59. 下列哪项骨折为稳定性骨折
- 26·

- B. 股骨头
- C. 椎体
- D. 腕舟状骨
- E. 足舟状骨

51. 在诊断闭合性腹部外伤合并内出血中，以下哪项最重要
- A. 左季肋部挫伤合并肋骨骨折
 - B. 血红蛋白 80g/L , 红细胞 $2.5 \times 10^{12}/\text{L}$
 - C. 左上腹明显压痛及肌紧张
 - D. 腹腔穿刺抽出不凝固血液
 - E. 血压 $80/60\text{mmHg}$, 脉搏 110 次 / 分
52. 关于病理性黄疸的临床特点，以下哪项不正确
- A. 生后 24 小时内出现
 - B. 无论早产儿还是足月儿，血清胆红素均 $> 205 \sim 257 \mu\text{mol/L}$
 - C. 足月儿黄疸持续 2 周不消退

- D. 早产儿持续 4 周不消退
- E. 黄疸退而复现

53. 有关肾小球疾病下列哪项是错误
- A. 肾小球疾病其病因，发病机制，临床及病理表现不尽相同
 - B. 原发性肾小球疾病多数病因是清楚的
 - C. 肾小球疾病是免疫介导的炎症疾病
 - D. 肾小球疾病是引起慢性肾功衰竭的主要疾病
 - E. 肾小球疾病可分为原发性，继发性及遗传性

54. 有关法洛四联症的血流动力学改变的叙述，下列哪项不正确
- A. 肺动脉狭窄程度随年龄而加重
 - B. 肺动脉狭窄较轻者，在室间隔缺损部位可有左向右分流
 - C. 肺动脉狭窄严重者，右心室血液大部分

·23·
5. 下列哪项是导致尿瘘的主要原因

- A. 产伤
- B. 放疗引起
- C. 晚期癌肿侵及膀胱
- D. 膀胱结核
- E. 尿路感染

46. 在注射胰岛素治疗营养不良时，应先服
- A. 钙剂
 - B. 锌剂
 - C. 葡萄糖
 - D. 维生素 A
 - E. 维生素 B 族

47. 扩张肾小球入出球小动脉的药物是
- A. 布洛芬
 - B. 卡托普利
 - C. 强地松
 - D. 阿司匹林

- E. 苯丙酸诺龙

48. 再障最主要的诊断依据是
- A. 全血细胞减少，有出血或感染表现
 - B. 网织红细胞减少
 - C. 骨髓增生不良
 - D. 肝脾淋巴结不肿大
 - E. 铁剂叶酸治疗无效

49. 协调性子宫收缩乏力，宫口开大 5cm，无头盆不称，正确的处理应是
- A. 人工破膜后催产素静脉滴注
 - B. 催产素静脉滴注
 - C. 等待产程自然进展
 - D. 剖宫产
 - E. 催产素静脉推注
50. 压缩性骨折最常发生于
- A. 肱骨头

缩

40. 下列哪项不符合动脉导管未闭的临床表现
A. 胸骨左缘第 2 肋间粗糙响亮的连续性机器样杂音
B. 周围血管征阳性
C. 肺动脉高压时出现差异性青紫
D. 胸部 X 线示主动脉影缩小
E. 右心导管示肺动脉血氧高于右心室
41. 下列哪项不符合再障
A. 发热，贫血，出血倾向
B. 骨髓增生低下
C. 红系白系血小板有二系以上减少
D. 无淋巴结肿大
E. 偶见局灶巨核细胞增多
42. 下列哪项是乙肝病毒复制指标
A. HBsAg

- B. 抗 HBE
C. 抗 HBs
D. HBeAg
E. 抗 HBcIgG

43. 何时做头部 CT 检查，诊断脑梗死阳性率较高
A. 发病 6 小时以后
B. 发病 12 小时以后
C. 发病 48 小时以后
D. 发病 18 小时以后
E. 发病 1 周以后
44. 下列哪项是加剧肾小球硬化的主要因素
A. 三高现象
B. 中性粒细胞
C. 血小板
D. 补体
E. 内皮细胞

19.
E. 骨盆倾斜度 80°
35. 肿瘤相关性抗原是指
A. 某一肿瘤细胞所特有的抗原
B. 肿瘤细胞不表达的抗原
C. 正常组织细胞不表达的抗原
D. 肿瘤细胞高表达，正常细胞也可少量表达的抗原
E. 肿瘤细胞与正常细胞都可高表达的抗原
36. 下列哪项对肺炎球菌肺炎的诊断最有价值
A. 高热、咳铁锈色痰
B. 白细胞升高，核左移，胞浆有中毒颗粒
C. 胸片大片均匀致密影呈肺叶或肺段分布
D. 肺部湿性啰音
E. 痰培养肺炎球菌阳性
37. 下列哪项组合不正确
A. 急粒白血病—可见 Auer 小体

20.
B.M3 白血病—t (15:17)
C. 急淋白血病—过氧化物酶阳性
D. 慢粒白血病—NAP 下降
E. 慢淋白血病—以成熟小淋巴细胞为主
38. 关于新生儿缺氧缺血性脑病，下列哪一项不正确
A. 有宫内窘迫或出生窒息时
B. 多见于早产儿
C. 可出现意识障碍
D. 原始反射减弱或消失
E. 肌张力增高或减弱
39. 下列哪项不符合正常胎盘剥离的情况
A. 子宫体变硬呈球形
B. 宫底向上升达脐上
C. 阴道口外露脐带自行延长
D. 向下压迫宫底脐带延长
E. 耻骨联合上方轻压子宫下段，脐带不回

- A. 初生至 6 小时
B. 初生至 12 小时
C. 初生至 24 小时
D. 初生至 48 小时
E. 初生至 72 小时
31. 下列哪项不是暴发型流脑（休克型）的典型表现
A. 高热，中毒症状重
B. 迅速扩大的全身淤点、淤斑
C. 脑脊液米汤样，糖、氯减少
D. 脑膜刺激征
E. 血培养脑膜类双球菌阳性
32. 下列哪项中的病人，不需要进行抗结核化疗
A. 发热咳嗽一周，胸片正常，结核菌素试验强阳性
B. 胸片示结核病灶正在好转
- A. 子宫圆韧带
B. 子宫阔韧带
C. 子宫主韧带
D. 宫骶韧带
E. 以上四对的共同作用
26. 下列哪项不是促进院内感染性肺炎发病增多的因素
A. 抗肿瘤化疗
B. 辅助呼吸
C. 大量肾上腺皮质激素的应用
D. 营养不良
E. 三代头孢菌素的大量应用
27. 下列哪项不是躯体性腹痛的特点
A. 疼痛定位准确
B. 疼痛程度剧烈而持久
C. 可有局部腹肌强直
D. 咳嗽、体位变化可加重疼痛
- C. 慢纤洞型患者三年中复查 5 次胸片无变化，近一月午后发热，乏力
D. 左结核性胸膜炎系统化治疗十月后，胸膜肥厚粘连
E. 女性 28 岁，咯血 20 天，胸片正常，痰结核菌涂片 (+)
33. 选择性免疫球蛋白缺陷不包括
A. 选择性 IgA 缺陷
B. 选择性 IgM 缺陷
C. 选择性 IgE 缺陷
D. 选择性 IgG 亚类缺陷
E. IgM 升高的 IgG 和 IgA 缺陷
34. 下列哪项为骨盆测量的正常值
A. 对角径 10 ~ 11cm
B. 坐骨棘间径 9cm
C. 坐骨切迹 < 2 指
D. 耻骨弓角度 90°
E. 常伴自主神经兴奋症状
28. 血细胞发育过程中的一般规律描述正确的是
A. 细胞体积由小变大
B. 核浆比例由小到大
C. 核染色质结构由粗糙到疏松细致
D. 核仁从有到无
E. 胞质中颗粒从多到少
29. 下列哪项不是确诊风湿热的主要表现
A. 心脏炎
B. 多发性关节炎
C. 舞蹈病
D. 发热
E. 环形红斑
30. 重度新生儿缺氧缺血性脑病症状最明显的时间是

- B. 伤后逆行性遗忘
C. 意识障碍期间可有皮肤苍白，血压下降，呼吸浅慢
D. 清醒后头痛，恶心，呕吐
E. 脑脊液红细胞阳性
21. 判定新生儿轻度窒息是指生后 1 分钟的 Apgar 评分为
A. 0 ~ 1 分
B. 2 ~ 3 分
C. 4 ~ 7 分
D. 5 ~ 8 分
E. 8 ~ 10 分
22. 下列哪个征象肯定进入第二产程
A. 产妇进气向下用力
B. 胎头部分露于阴道
C. 产妇排尿困难
D. 子宫口开全
15. 下列哪些疾病属于性传播疾病
A. 阴茎结核疹
B. 阴部疱疹
C. 口腔皮肤结核
D. 假性湿疣
E. 鲍文样丘疹病
16. 麻疹疫苗的初种年龄为
A. 4 个月
B. 5 个月
C. 6 个月
D. 7 个月
E. 8 个月
17. 下列哪项不是内脏性腹痛的特点
A. 疼痛部位含糊
B. 疼痛部位接近腹中线
C. 常伴自主神经兴奋症状
D. 腹痛可因体位变化加重
- E. 脐带脱出于阴道口外
23. 下列哪个途径不传染艾滋病
A. 吸食母乳
B. 器官移植传播
C. 共用食具传播
D. 人工授精
E. 共用剃刀、牙刷，可经破损处传染
24. 下列哪个症状属于交感神经节后纤维的兴奋症状
A. 肌束颤动
B. 流涎
C. 多汗
D. 呼吸肌麻痹
E. 支气管痉挛
25. 下列哪对韧带维持着子宫体处于前倾前屈的位置
E. 疼痛感觉模糊
18. 下列哪项不是风湿活动的指标
A. 不规则发热、乏力
B. 面色苍白，心率增快
C. 血 ASO 大于 500 单位
D. 血沉增快，粘蛋白增加
E. 心电图示 P-R 间期延长
19. 下列哪项不是孕激素的作用
A. 促进乳腺腺管发育成熟
B. 促进宫颈口闭合，减少黏液分泌
C. 抑制输卵管肌节律性收缩的振幅
D. 增强子宫平滑肌对宫缩剂的敏感性
E. 负反馈作用于下丘脑—垂体引起促性腺激素降低
20. 下列哪项不是诊断脑震荡的依据
A. 伤后立即出现意识障碍

- E. 锁骨中线上平脐处
10. 下列组合哪项正确
- A. 急性淋巴细胞白血病—儿童病例绿色瘤常见
 - B. 急粒白血病—特异性皮肤损害多见
 - C. M3—多伴 DIC
 - D. 慢淋白血病—多见急变
 - E. 慢粒白血病—多伴中枢神经系统白血病
11. 下列哪条血管闭塞最易导致偏瘫
- A. 小脑下后动脉
 - B. 大脑中动脉
 - C. 脊髓前动脉
 - D. 小脑下前动脉
 - E. 大脑前动脉
12. 生后 24 小时内出现黄疸者，应首先考虑
- A. 新生儿肝炎
- B. 胆道闭锁
- C. 新生儿溶血病
- D. 败血症
- E. 母乳性黄疸
13. 下列哪项诊断肋骨骨折是不可靠的
- A. 间接疼痛
 - B. 胸壁反常呼吸运动
 - C. 骨擦感
 - D. 局部疼痛
 - E. 受伤后胸部变形
14. 下列哪些症状不是营养性巨幼红细胞性贫血的表现
- A. 面色苍黄，疲乏无力
 - B. 虚胖，毛发稀疏发黄
 - C. 肝脾轻度肿大
 - D. 异食癖
 - E. 舌炎，腹泻
- A. 链球菌感染后急性肾炎
- B. 膜性病变为主的肾炎
- C. 肾小球病变为主的肾炎
- D. 肺出血肾炎综合征
- E. 狼疮性肾炎
6. 新生儿败血症主要的感染途径是
- A. 胎内
 - B. 产道
 - C. 肠道
 - D. 脐部
 - E. 口腔黏膜
7. 初孕妇，28岁，孕32周因全身浮肿及头疼来诊，妊娠前即有面部及下肢浮肿。查血压160/110mmHg，尿蛋白（+++），可见颗粒管型，经治疗孕37周自然分娩，产后6周，血压降至128/75mmHg，尿蛋白（++），浮肿（+）。下列诊断哪项可能大
- A. 先兆子痫
 - B. 妊娠合并原发性高血压
 - C. 妊娠合并肾炎
 - D. 慢性肾炎基础上并发先兆子痫
 - E. 原发性高血压基础上并发先兆子痫
8. 24小时尿量少于多少为少尿
- A. 100ml
 - B. 200ml
 - C. 300ml
 - D. 400ml
 - E. 500ml
9. 营养不良测定腹壁皮下脂肪厚度的部位
- A. 脐上
 - B. 脐下
 - C. 脐旁
 - D. 肋下

单选题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 典型苯丙酮尿症最主要治疗方法是给予
 - A. 低苯丙氨酸饮食
 - B. 酪氨酸
 - C. 四氢生物蝶呤
 - D. 5-羟色胺
 - E. 左旋多巴
2. 下列关于难免流产的叙述中，哪个不正确
 - A. 阴道流血增多
 - B. 出现阴道流水
 - C. 阵发性腹痛加重
 - D. 有部分胎盘嵌顿于宫颈口，部分胎盘排出
 - E. 子宫大小与停经月份相符或略小
3. 下列关于酶的叙述，正确的是
 - A. 活化的酶均具有活性中心
 - B. 能提高反应系统的活化能
 - C. 所有的酶都具有绝对特异性
 - D. 随反应进行酶量逐渐减少
 - E. 所有的酶均具有辅基或辅酶
4. 下列哪一项提示小气道梗阻
 - A. 吸气时出现喘鸣音伴吸气相延长
 - B. 呼气时出现喘鸣音伴吸气相延长
 - C. 呼气时出现喘鸣音伴呼气相延长
 - D. 吸气时肺部是否有固定的湿啰音
 - E. 吸气时肺部是否有不固定的中、粗湿啰音
5. 下列肾脏病中哪种为抗肾小球基底膜抗体性肾炎