



中华人民共和国国家标准

GB 17149.2—1997

化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management
of contact dermatitis induced by cosmetics

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 17149.2—1997。

1997-12-15 发布

1998-12-01 实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部发布

前　　言

为配合中华人民共和国《化妆品卫生监督条例》的实施特制定本标准。

本标准规定的诊断标准和治疗原则仅涉及化妆品引起的刺激性接触性皮炎和变应性接触性皮炎。

本标准从 1998 年 12 月 1 日实施。

本标准的附录 A、附录 B 是标准的附录。

本标准的附录 C、附录 D 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位：解放军空军总医院、大连医学院第二附属医院、南京医学院第一附属医院、北京协和医院。

本标准主要起草人：黄畋、蔡瑞康、刘玮、赵辨、袁兆庄。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017年第7号)和强制性标准整合精简结论,本标准自2017年3月23日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

中华人民共和国国家标准

化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则

GB 17149.2—1997

Diagnostic criteria and principles of management
of contact dermatitis induced by cosmetics

化妆品接触性皮炎系指由接触化妆品而引起的刺激性接触性皮炎和变应性接触性皮炎。

1 范围

本标准规定了化妆品接触性皮炎的诊断标准和处理原则。

本标准适用于化妆品引起的刺激性接触性皮炎和变应性接触性皮炎。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 17149.1—1997 化妆品皮肤病诊断标准及处理原则 总则

3 诊断原则

有明确的化妆品接触史,并根据发病部位,皮疹形态,必要时进行皮肤斑贴试验进行综合分析而诊断,但需要排除非化妆品引起之接触性皮炎。

4 诊断标准

4.1 刺激性接触性皮炎

4.1.1 有明确的化妆品接触史,且接触后较快出现皮炎改变。

4.1.2 皮损局限于接触部位,界限清楚。

4.1.3 在同样条件下,一般较多接触者发病。

4.1.4 皮损形态常呈急性或亚急性皮炎,有程度不等的红斑、丘疹、水肿、水疱。破溃后可有糜烂,渗液,结痂。自觉局部皮损瘙痒灼热或疼痛。皮损严重程度和接触物的浓度、接触时间有明显联系。

4.1.5 发生在口唇粘膜时可有干燥、脱屑,局部刺痒或灼痛。

4.1.6 去除病因后很快痊愈。

4.1.7 排除其他非化妆品接触因素所致病变。

4.2 变应性接触性皮炎

4.2.1 有明确使用或多次使用化妆品的历史,并有一定的潜伏期。

4.2.2 在使用同一种化妆品的人群中,一般仅有少数人发病。

4.2.3 原发部位局限于接触部位,但可向周围或远隔部位扩散。

4.2.4 皮损形态多样,自觉瘙痒。可表现为皮炎、红斑鳞屑、头面部红肿、眼周皮炎伴发结合膜炎、手掌手指汗疱疹样以及接触性荨麻疹样表现。