

临床助理医师考试真题精华（二）

第 1 题 (单项选择题)

下列属于贮存铁的是

- A.血红蛋白铁
- B.肌红蛋白铁
- C.转铁蛋白结合的铁
- D.乳铁蛋白结合的铁
- E.含铁血黄素

正确答案：E,

第 2 题 (单项选择题)

大量饮水导致尿量改变的机制是

- A.肾小球毛细血管血压升高
- B.血浆晶体渗透压升高
- C.囊内压升高
- D.抗利尿激素分泌减少
- E.肾血浆流量减少

正确答案：D,

第 3 题 (单项选择题)

在上运动神经元和感觉完好情况下，右上腹壁反射消失提示

- A.右侧胸髓 3~4 节段病损
- B.右侧胸髓 5~6 节段病损
- C.右侧胸髓 7~8 节段病损
- D.右侧胸髓 9~10 节段病损
- E.右侧胸髓 11~12 节段病损

正确答案：C,

第 4 题 (单项选择题)

易造成小脑幕裂孔疝的疾病是

- A.颅内动脉瘤
- B.后颅凹肿瘤
- C.颞部巨大硬脑膜外血肿
- D.脑挫裂伤
- E.脑膜膨出

正确答案：C,

第 5 题 (单项选择题)

原发性肝细胞肝癌最理想的肿瘤标记物为

- A. AFP
- B. GGT2

C.CA19-9

D. CA125

E. CEA

正确答案：A,

第 6 题 (单项选择题)

膀胱癌最常见的组织类型是

A.非上皮性肿瘤

B.鳞状细胞癌

C.腺癌

D.绒毛膜上皮癌

E.移行细胞癌

正确答案：E,

第 7 题 (单项选择题)

肝右叶巨大肿瘤压迫下腔静脉时，考虑的治疗方法不包括

A.肝动脉结扎术

B.肝动脉栓塞术

C.肝动脉灌注化疗

D.肝移植手术

E.肝叶切除术

正确答案：E,

第 8 题 (单项选择题)

单纯性睾丸鞘膜积液最可靠的诊断依据是

- A.阴囊肿大
- B.阴囊肿块表面光滑
- C.阴囊肿块有波动感
- D.透光试验阳性
- E.右侧阴囊无睾丸

正确答案：D,

第 9 题 (单项选择题)

根据蛋白尿的发生机制，蛋白尿可分为五类，下列哪一类是错误的

- A.肾小球性蛋白尿
- B.肾小管性蛋白尿
- C.溢出性蛋白尿
- D.分泌性蛋白尿
- E.假性蛋白尿

正确答案：E,

第 10 题 (单项选择题)

闭经病人用孕激素治疗后出现撤药性阴道流血，表示

- A.子宫内膜呈萎缩型
- B.子宫内膜有结核病灶
- C.体内缺乏雌激素
- D.子宫内膜对雌激素不起反应
- E.子宫内膜已受雌激素影响

正确答案：E,

第 11 题 (单项选择题)

输血后 7~14 天发生的输血并发症是

- A.非溶血性发热性输血反应
- B.过敏反应
- C.迟发型溶血反应
- D.细菌污染反应
- E.输血相关的急性肺损伤

正确答案：C,

第 12 题 (单项选择题)

右心衰竭体循环淤血的表现是

- A.端坐呼吸
- B.心源性哮喘
- C.劳力性呼吸困难

D.阵发性夜间呼吸困难

C. E.肝颈静脉反流征阳性

正确答案：E,

第 13 题 (单项选择题)

男，48 岁。发作性胸痛 1 个月，每次发作含硝酸甘油后缓解，考虑冠心病心绞痛。最常用的检测方法是

A.心脏 X 线摄片

B.心电图运动负荷试验

C.放射性核素检查

D.动态心电图

E.超声心动图

正确答案：B,

第 14 题 (单项选择题)

尿毒症病人高血压的主要原因是

A.肾素增多

B.促红素减少

C.水钠潴留

D.血管加压素增多

E.交感神经兴奋

正确答案：C,

第 15 题 (单项选择题)

吗啡可引起

A.引起瞳孔扩大

B.可引起呼吸抑制

C.可引起共济失调

D.可引起急性心力衰竭

E.可引起再生障碍性贫血

正确答案：B,

第 16 题 (单项选择题)

磺酰脲类药物药理作用为

A.可使电压依赖性钾通道开放

B.可促进胰岛素释放而降血糖

C.不改变体内胰高血糖素水平

D.可使电压依赖性钠通道开放

E.能抑制抗利尿激素的分泌

正确答案：B,

第 17 题 (单项选择题)

心指数是指

- A.每平方米体表面积的心率
- B.每千克体重的心做功量
- C.每千克体重心输出量
- D.每平方米体表面积的每搏输出量
- E.每平方米体表面积的心输出量

正确答案：E,

第 18 题 (单项选择题)

右心衰竭的病人常因组织液生成过多而致下肢水肿，其主要原因是

- A.血浆胶体渗透压降低
- B.毛细血管血压增高
- C.组织液静水压降低
- D.组织液胶体渗透压升高
- E.淋巴回流受阻

正确答案：B,

第 19 题 (单项选择题)

大豆与谷类食物混食，主要补充谷类中最缺乏的必需氨基酸是

- A.赖氨酸
- B.苏氨酸
- C.蛋氨酸

D.亮氨酸

E.异亮氨酸

正确答案：A,

第 20 题 (单项选择题)

乙型肝炎后肝硬化的主要合并症不包括

A.肝癌

B.门静脉高压症

C.急性肠系膜上静脉血栓形成

D.肝功能衰竭

E.急性肝静脉血栓形成

正确答案：E,

第 21 题 (单项选择题)

直肠长度约为

A. 5~10cm

B. 12~15cm

C. 16~20cm

D. 21~25cm

E.26 ~30cm

正确答案：B,

第 22 题 (单项选择题)

男性，50 岁。乙型肝炎病史 10 年，近 3 个月肝区胀痛不适，CT 检查:肝右叶 5cm 占位性病变，为进一步明确性质应首选检测

- A. CA19-9
- B. 甲胎蛋白
- C. 癌胚抗原
- D. CA15-3
- E. 碱性磷酸酶

正确答案：B,

第 23 题 (单项选择题)

对各型癫痫都有一定疗效的药物是

- A. 乙琥胺
- B. 苯妥英钠
- C. 卡马西平
- D. 丙戊酸钠
- E. 苯巴比妥

正确答案：D,

第 24 题 (单项选择题)

氨基糖苷类抗生素的主要不良反应为

A.抑制骨髓

B.耳毒性

C.肝毒性

D.心脏毒性

E.消化道反应

正确答案：B,

第 25 题 (单项选择题)

区别血尿和血红蛋白尿的主要方法是

A.观察血尿颜色

B.做尿胆原测定

C.做尿潜血试验

D.做尿三杯试验

E.做尿沉渣镜检

正确答案：E,

第 26 题 (单项选择题)

尿毒症患者发生纤维性骨炎的主要原因是

A.尿钙排泄增多

B.继发性甲状旁腺功能亢进

C.尿磷排泄减少

D.营养不良和低蛋白血症

C. E.活性维生素 D 合成障碍

正确答案：B,

第 27 题 (单项选择题)

为确定肝脓肿穿刺点或手术引流进路，首选的辅助检查为

A.腹部 X 线平片

B. B 超

C. CT

D. MRI

E.肝动脉造影

正确答案：B,

第 28 题 (单项选择题)

慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿时,最特异的诊断性检查为

A.热溶血试验

B.蔗糖溶血试验

C.酸溶血试验

D.荧光斑点试验

E.抗人球蛋白试验

正确答案：C,

第 29 题 (单项选择题)

病人反复出现一些想法，明知不必要或不合理，但无法控制，该状态为

- A.强迫性思维
- B.思维奔逸
- C.联想散漫
- D.强制性思维
- E.思维插入

正确答案：A,

第 30 题 (单项选择题)

不符合妄想特征的是

- A.内容与客观现实不符合
- B.是一种病理的信念
- C.内容多与患者自身相关
- D.内容受文化背景影响
- E.受教育越高越容易出现妄想

正确答案：E,

第 31 题 (单项选择题)

对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是

- A.全程血尿

B.合并尿道刺激征

C.尿潜血阳性

D.肉眼血尿

E.变性红细胞尿

正确答案：E,

第 32 题 (单项选择题)

在下列缺铁性贫血的临床表现中，属于组织缺铁表现的是

A.头晕

B.眼花

C.心悸

D.异食癖

E.气短

正确答案：D,

第 33 题 (单项选择题)

球部尿道损伤后最有特征性的症状是

A.初始血尿

B.终末血尿

C.全程血尿

D.尿道溢血

E.会阴部肿痛

正确答案：D,

第 34 题 (单项选择题)

抗精神病药物的治疗作用与下列通路有关的是

A.结节漏斗系统通路

B.黑质纹状体通路

C.中脑-边缘系统通路

D.小脑大脑皮质通路

E.小脑-颞叶系统通路

正确答案：C,

第 35 题 (单项选择题)

肝蒂内包含的结构不包括

A.肝动脉

B.肝静脉

C.门静脉

D.淋巴管

E.神经

正确答案：B,

第 36 题 (单项选择题)

2 型糖尿病的特点是

- A.都有“三多一少”表现
- B.患者体型均较肥胖
- C.患者空腹血糖都增高
- D.空腹均呈阳性
- E.少数以酮症酸中毒为首表现

正确答案：E,

第 37 题 (单项选择题)

尿中发现大量透明管型时，提示病变在

- A.肾小管和肾盏
- B.肾小管和肾盂
- C.肾小管和肾小球
- D.肾小管和输尿管
- E.肾小管和膀胱

正确答案：C,

第 38 题 (单项选择题)

保存期内的全血最重要的有效成分是

- A.红细胞
- B.白血病

C.血小板

D.凝血因子

E.免疫球蛋白

正确答案：A,

第 39 题 (单项选择题)

脑膜炎双球菌有不同的菌群，目前我国流行的菌群以下列哪群为主

A. A 群

B. B 群

C. C 群

D. D 群

E. E 群

正确答案：A,

第 40 题 (单项选择题)

伤寒患者最有特征性的病理改变部位是在

A.回肠末端

B.升结肠

C.乙状结肠

D.肝，脾

E.心，脑

正确答案：A,

第 41 题 (单项选择题)

溶组织内阿米巴的致病型是

- A.包囊
- B.小滋养体
- C.大滋养体
- D.裂殖体
- C. E.配子体

正确答案：C,

第 42 题 (单项选择题)

易造成枕骨大孔疝的疾病是

- A.颅内动脉瘤
- B.后颅凹肿瘤
- C.颞部巨大硬脑膜外血肿
- D.脑挫裂伤
- E.脑膜膨出

正确答案：B,

第 43 题 (单项选择题)

关于甲状腺滤泡状腺癌正确的是

- A.多见于儿童
- B.生长慢，属低度恶性
- C.来源于滤泡旁降钙素分泌细胞
- D.有侵入血管的倾向
- E.预后优于甲状腺乳头状腺癌

正确答案：D,

第 44 题 (单项选择题)

尿渗透压降低常见于

- A.中枢性尿崩症
- B.甲状旁腺功能亢进症
- C.甲状腺功能亢进症
- D.糖尿病
- E.原发性醛固酮增多症

正确答案：A,

第 45 题 (单项选择题)

良性前列腺增生症最早出现的症状往往是

- A.尿频
- B.排尿困难
- C.血尿

D.尿痛

E.尿急

正确答案：A,

第 46 题 (单项选择题)

男，21 岁，右侧肢体抽搐 2 年。突然昏迷 1 小时，查体：神智浅昏迷,左侧肢体偏瘫。CT 显示右额叶脑内血肿。临床诊断最可能是

A.原发性癫痫

B.脑动脉硬化

C.脑动脉瘤

D.脑血管畸形

E.高血压脑出血

正确答案：D,

第 47 题 (单项选择题)

男，44 岁。切伤右手中指，即可来诊治。检查神经肌腱功能正常。处理出血最简便，最有效的措施是

A.以止血钳夹住血管 5 分钟

B.冷冻止血

C.外用止血药

D.以气压止血带止血

E.局部包扎或缝合

正确答案：E,

第 48 题 (单项选择题)

男，16 岁，右肘部摔伤 2 天。右肘关节肿胀，压痛明显，活动受限，内上髁处有骨擦感。

对诊断有意义的首选检查是

A.核素骨扫描

B. X 线摄片

C. B 型超声

D. CT

E. MRI

正确答案：B,

第 49 题 (单项选择题)

男性,68 岁。肝右叶巨大肿瘤，腹腔积液征阳性,血清生化检查，白蛋白 20g/L,总胆红素 60umol/L，血管造影示：门静脉右支闭塞。最适合的治疗方法是

A.扩大肝右叶切除术

B.肝动脉结扎术

C.全身化疗

D.肝动脉内抗癌药物持续注入法

E.放射疗法

正确答案：D,

第 50 题 (单项选择题)

最容易引起细菌污染反应的血液制品是

A.浓缩红细胞

B.白蛋白

C.新鲜冰冻血浆

D.冷沉淀

E.浓缩血小板

正确答案：E,

第 51 题 (单项选择题)

关于特发性血小板减少性紫癜 (ITP)的概念, 哪一种描述是错误的

A.急性型 ITP 与感染因素有关

B.血小板寿命缩短

C.骨髓巨核细胞总数减少

D.临床上是比较常见的一种出血性疾病

E.急性型 ITP 多见于儿童

正确答案：C,

第 52 题 (单项选择题)

9 岁男孩。午餐时突发神志丧失，手中持碗失落，碗打碎后即醒。脑电图示 3 周/秒棘慢波规律性和对称性发放。最可能的诊断是

- A. 复杂部分发作
- B. 部分性发作
- C. 杰克逊癫痫
- D. 失神发作
- E. 不能分类的癫痫发作

正确答案：D,

第 53 题 (单项选择题)

去除血液中白细胞可有效预防的输血不良反应是

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 过敏反应
- C. 细菌污染反应
- D. 急性（即发性）溶血性输血反应
- E. 迟发型溶血性输血反应

正确答案：D,

第 54 题 (单项选择题)

胃癌淋巴结转移的常见部位是

- A. 右锁骨上

B.左锁骨上

C.右颈部

D.左颈部

E. E.左颌下

正确答案： B,

第 55 题 (单项选择题)

骨软骨瘤多见于

A.长管骨骨端

B.长管骨干骺端

C.长管骨骨干

D.长管骨骨骺

E.扁骨骨端

正确答案： B,

第 56 题 (单项选择题)

高血压伴有低血钾应首先考虑

A.主动脉缩窄

B.原发性醛固酮增多症

C.嗜铬细胞瘤

D.继发于慢性肾炎的高血压

E.肾动脉狭窄

正确答案：B,

第 57 题 (单项选择题)

关于感染性休克病人应用糖皮质激素的依据与方法，不正确的是

A.糖皮质激素可以稳定细胞及溶酶体膜，免受内毒素的破坏

B.大剂量糖皮质激素对心脏发挥正性肌力作用

C.适当应用糖皮质激素可以减少合并症

D.糖皮质激素应从大剂量开始

E.要取得疗效至少要使用 5 天

正确答案：E,

第 58 题 (单项选择题)

诊断上尿路结石首选的检查方法是

A.腹部平片+静脉尿路造影

B.逆行造影

C. CT

D.肾动脉造影

E. MRI

正确答案：A,

第 59 题 (单项选择题)

血尿病人，膀胱镜见膀胱右侧壁有 2.5cm*1.0cm 新生物,有蒂，距右输尿管口 3cm，活检诊断移行细胞癌 T1 期，首选的治疗方法是

- A.膀胱灌注治疗
- B.经尿道膀胱肿瘤电切术
- C.膀胱部分切除术
- D.膀胱全切术
- E.放疗

正确答案：B,

第 60 题 (单项选择题)

男性，40 岁，发热伴鼻出血 1 周，检查牙龈肿胀,肝脾轻度肿大,血红蛋白 40g/L，白细胞 6.0x10⁹/L，血小板 15X10⁹/L,骨髓象原始细胞占 60%，过氧化酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断为

- A.急性粒细胞性白血病
- B.急性早幼粒细胞白血病
- C.急性淋巴细胞白血病
- D.急性红白血病
- E.急性单核细胞性白血病

正确答案：E,

第 61 题 (单项选择题)

肾病综合症最基本的表现是

A.尿蛋白定量>3.5g/24h

B.尿颗粒管型

C.血浆白蛋白<35g/L

D.高度水肿

E.高脂血症

正确答案：A,

第 62 题 (单项选择题)

女性，26岁，已婚。停经50日突觉右下腹剧痛伴休克，面色苍白。为确诊，最简便、有效地辅助诊断方法是

A.阴道后穹窿穿刺

B.尿妊娠试验

C.阴道镜检查

D.宫腔镜检查

E.腹腔镜检查

正确答案：A,

第 63 题 (单项选择题)

男，50岁，胃癌行根治性胃大部切除术后2年，因上腹疼痛不适，进食后饱胀、消瘦、贫血入院。钡餐检查：胃空肠吻合口处有充盈缺损和狭窄，最可能的诊断是

A.残胃癌

B.胃癌复发

C.碱液反流性胃炎

D.吻合口消化性溃疡

E.吻合口炎性水肿

正确答案：B,

第 64 题 (单项选择题)

女性，28岁，足月产后5天，下腹疼痛3天，发热1天，阴道分泌物无异味，子宫增大，既往有子宫肌瘤史。本例首先考虑的诊断是

A.产褥感染

B.肌瘤恶性变

C.肌瘤玻璃样变

D.肌瘤囊性变

E.肌瘤红色样变

正确答案：E,

第 65 题 (单项选择题)

胃窦部溃疡的最佳手术方式是

A.胃大部切除胃十二指肠吻合术

B.胃大部切除胃空肠吻合术

C.高选择性迷走神经切断术

D.胃窦切除，选择性迷走神经切除术

E.迷走神经干切除术

正确答案：A,

第 66 题 (单项选择题)

男性，35 岁。双下肢水肿 2 周。查体：血压 130/80mmHg，双下肢轻度凹陷性水肿。尿常规：蛋白(++++), 红细胞(++)。Scr122umol/L。血浆白蛋白 28g/L。肾活检提示：肾小球系膜轻度增生，系膜区可见免疫复合物沉积。该病人首选治疗药物是

A.环磷酰胺

B.环孢素 A

C.霉酚酸酯

D.糖皮质激素

E.硫唑嘌呤

正确答案：D,

第 67 题 (单项选择题)

男性,70 岁。健康体检时 B 超发现胆囊内有一约 0.8cm 直径的结石，随体位活动，口服法胆囊显影，充盈缺损不明显。既往无胃病史，无胆囊炎发作史，无心脏病，糖尿病史。目前的建议治疗是

A.观察，随诊

B.溶石疗法

C.中药排石

D.择期行胆囊切除术

E.择期行腹腔镜胆囊切除术

正确答案：A,

第 68 题 (单项选择题)

对有明显黄疸及腹水的肝癌病人，不应该的治疗是

A.全身化学治疗

B.介入治疗

C.肿瘤局部注射无水酒精

D.免疫治疗

E.合理中医中药

正确答案：A,

第 69 题 (单项选择题)

提高胃癌治愈率的关键在于

A.术前，术中，术后化疗

B.根治性手术

C.早期诊断

D.放射治疗

E.综合治疗

正确答案：C,

第 70 题 (单项选择题)

男,65 岁, 高血压病,糖尿病史多年。一天前发现左侧上下肢活动受限,吐字不清,神志清楚。无明显头痛,呕吐。检查发现左侧上, 下肢肌力 3 级,左半身痛觉减退,头颅 CT 未见异常,临床上考虑可能性最大的疾病是

- A.脑出血
- B.脑栓塞
- C.短暂性脑缺血发作
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑血栓形成

正确答案: E,

第 71 题 (单项选择题)

下列哪项是引起继发性再生障碍性贫血最常见的病因

- A.药物及化学物质
- B.物理因素
- C.病毒感染
- D.细菌感染
- E.营养因素

正确答案: A,

第 72 题 (单项选择题)

男性，58 岁。突然头痛，呕吐，伴意识丧失 30 分钟。查体神志清楚，颈部抵抗，克氏征阳性。右侧眼睑下垂，右侧瞳孔 4mm，光反应消失。最可能的诊断是

- A.脑梗死
- B.蛛网膜下腔出血
- C.高血压脑出血
- D.脑动静脉畸形出血
- E.颅脑肿瘤

正确答案：B,

第 73 题 (单项选择题)

病人男性，21 岁。右侧肢体抽搐 2 年，突然昏迷 1 小时。查体：神志浅昏迷，左侧肢体偏瘫。CT 显示右额叶脑内血肿，临床诊断最可能为

- A.原发性癫痫
- B.脑动脉硬化
- C.脑动脉瘤
- D.脑血管畸形
- E.高血压脑出血

正确答案：D,

第 74 题 (单项选择题)

男性，45岁。经理，送来急诊，自述半小时前突然感觉气紧、胸闷、心悸、头晕、出汗，认为生命垂危，要求紧急处理，近1个月来这种情况发生过三次，每次持续0.5小时，发病间隙期一切正常，发病与饮食无明显关系。最可能的诊断是

- A. 癔症发作
- B. 低钾血症
- C. 惊恐发作
- D. 心肌梗死
- E. 内脏性癫痫

正确答案：C,

第 75 题 (单项选择题)

3岁患儿,高热10小时,伴头痛,频繁呕吐,腹泻3次为稀水样便。查:T39℃,血压50/30mmHg,精神萎靡,全身散在大小不等瘀斑,心肺未见异常。CSF检查:细胞数15000*10⁶/L,蛋白微量,葡萄糖2.2mmol/L,该患儿可能的诊断是

- A. 败血症, 感染性休克
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 中毒型细菌性痢疾
- E. 化脓性脑膜炎

正确答案：B,

第 76 题 (单项选择题)

10 岁男孩, 1 年来时有尿频、尿急、尿痛和排尿困难, 尿流中断, 改变体位后又能继续排尿, 首先应考虑

- A. 急性膀胱炎
- B. 前列腺炎
- C. 尿道狭窄
- D. 膀胱结石
- E. 输尿管结石

正确答案: D,

第 77 题 (单项选择题)

关于蛋白尿的描述错误的是

- A. 多发性骨髓瘤所致的蛋白尿为溢出性
- B. 狼疮性肾炎所致的蛋白尿为混合性
- C. 糖尿病肾病的蛋白尿主要为小球性
- D. 间质性肾炎的蛋白尿以小管性为主
- E. 高蛋白饮食后出现的蛋白尿为生理性

正确答案: E,

第 78 题 (单项选择题)

男, 40 岁。因大量蛋白尿, 高度水肿, 诊断为肾病综合症入院。肾穿刺活检病理为: 微小病变型。给予泼尼松 60mg/日口服, 症状有所控制。治疗 3 周后, 又出现大量蛋白尿, 双下肢水肿加剧, 肾功能减退。此时应该考虑

- A.感染
- B.肾静脉血栓形成
- C.加用细胞毒药物
- D.糖皮质激素冲击
- E.急性肾衰竭

正确答案：B,

第 79 题 (单项选择题)

男,40 岁。诊断左肾结核，膀胱容量 20mL，右肾严重积水伴尿毒症，宜首先行

- A.膀胱扩大术
- B.右肾造瘘术
- C.左肾切除术
- D.左肾结核病灶清除术
- E.膀胱造瘘术

正确答案：B,

第 80 题 (单项选择题)

女性，40 岁。右上腹阵发性绞痛伴恶心、呕吐 3 小时来院急诊。体温 37℃，右上腹轻压痛，Murphy 征 (--)。既往检查胆囊内有小结石，对该病人首先考虑胆囊结石合并

- A.急性胆囊炎
- B.急性胆管炎

C.急性胆绞痛

D.急性胰腺炎

E.急性胃炎

正确答案：C,

第 81 题 (单项选择题)

男，26岁。右侧阴囊增大不适半年。检查肿块约2.5cm*2.0cm大小，有囊性感，无压痛，平卧位不消失，透光试验阳性。双侧睾丸附睾可清晰触及，大小位置正常。应诊断为

A.睾丸鞘膜积液

B.睾丸肿瘤

C.腹股沟疝

D.精索鞘膜积液

E.阴囊象皮肿

正确答案：D,

第 82 题 (单项选择题)

男，18岁，近一年来对家人亲友变得冷淡，不去上学，不洗澡，不主动更换衣服，对自己有关的各种事情表现的无动于衷。最可能的诊断为精神分裂症

A.偏执型

B.单纯型

C.紧张型

D.青春型

E.混合型

正确答案：B,

第 83 题 (单项选择题)

青春期甲状腺肿,肿大明显时首选的治疗方法是

A. 口服硫氧嘧啶类药物

B.行甲状腺大部分切除术

C. 口服甲状腺素片

D.行放射性核素碘治疗

E.多食营养丰富的食物

正确答案：C,

第 84 题 (单项选择题)

女性，48 岁，大便带血 3 个月，排便有下坠感，伴有里急后重，直肠经检查距离肛门 12cm 处 3cmx3cm 的肿块，菜花状，质脆，易出血，病理诊断直肠腺癌。若选择手术，最佳术式为

A.经腹会阴直肠癌根治术

B.经腹直肠癌切除术

C.经腹直肠癌切除，人工肛门，远端封闭手术

D.拉下式直肠癌切除术

E.局部切除加放疗术

正确答案：B,

第 85 题 (单项选择题)

男性, 25 岁, 因车祸 2 小时就诊, 诊断脾破裂, 腹腔大量积血。就诊时血压 100/60mmHg, 心率 110 次/分。输血, 输液共 2000mL 后血压 90/50mmHg, 心率 130 次/分。除继续输血外, 最佳治疗方法是

A.注射升压药

B.腹腔引流

C.行脾切除术

D.血管造影并行脾动脉栓塞

E.静脉输注白蛋白

正确答案：C,

第 86 题 (单项选择题)

男性, 80 岁, 右腹股沟斜疝 6 小时来诊, 既往有可复性腹股沟肿物史 30 年, 检查: 右侧腹股沟至阴囊 10cm*6cm, 嵌顿疝, 皮肤无红肿, 最恰当的治疗方法是

A.试行手法复位

B.手术复位并行疝囊高位结扎

C.手术复位并加强腹股沟管疝修补术

D.手术复位并行无张力疝修补

E.手术复位

正确答案: A,

第 87 题 (单项选择题)

男性, 25 岁, 因十二指肠溃疡急性穿孔行胃大部切除术, 术后恢复顺利并进食。第 8 天, 在半流食鸡蛋时, 突然出现频繁呕吐, 下列治疗中, 错误的是

- A. 禁食, 胃肠减压
- B. 输液
- C. 应用糖皮质激素
- D. 肌注新斯的明
- E. 紧急手术治疗

正确答案: E,

第 88 题 (单项选择题)

男性, 17 岁, 感冒一周后出现颜面及双下肢水肿。查体: 血压 140/90mmHg。颜面及双下肢轻度水肿。尿常规: 蛋白 (++) , 红细胞 (+)。Scr176umol/L, 补体 C3 轻度下降。诊断为急性肾小球肾炎。下列哪些药物不宜使用

- A. 利尿剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- D. 糖皮质激素
- E. 钙离子拮抗剂

正确答案: D,

第 89 题 (单项选择题)

男, 32 岁, 3 天前淋雨, 次日出现寒战、高热, 继之咳嗽, 咳少量黏液脓性痰, 伴右侧胸痛。查体体温 39℃, 急性病容, 口角和鼻周有疱疹。心率 110 次/分, 律齐, 血白细胞 $11 \times 10^9/L$ 。胸片最可能的诊断是

- A. 急性肺脓肿
- B. 干酪性肺炎
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

正确答案: E,

第 90 题 (单项选择题)

女, 48 岁, 近 3 个月来头痛、乏力、早醒、坐立不安, 常担心家人出事, 怀疑自己得了不治之症, 给家庭带来负担, 悲观失望。最可能的诊断是

- A. 神经衰弱
- B. 焦虑症
- C. 抑郁症
- D. 强迫症
- E. 癔症

正确答案: C,

第 91 题 (单项选择题)

慢性酒精中毒的震颤谵妄的临床表现是

- A.停酒后出现的急性精神症状群
- B.长期饮酒过程中出现的慢性精神症状群
- C.停酒后缓慢出现的记忆障碍
- D.长期饮酒过程中出现的记忆障碍
- E.长期饮酒过程中出现的行为改变

正确答案：A,

第 92 题 (单项选择题)

女性，20 岁，因低热、腹痛诊断为结核性腹膜炎,近日来呕吐、腹胀、未解大便。查体：肠鸣音亢进。最可能的并发症是

- A.肠梗阻
- B.肠穿孔
- C.中毒性肠麻痹
- D.肠出血
- E.腹腔脓肿

正确答案：A,

第 93 题 (单项选择题)

下列哪项不属于原发性肾病综合症常见的病理类型

- A.微小病变型

B.系膜增生性肾炎

C.毛细血管内增生性肾炎

D.膜性肾病

E.局灶性节段性肾小球硬化

正确答案：C,

第 94 题 (单项选择题)

女性，30岁。4小时前跌伤后昏迷5分钟，清醒后步行回家。1小时前因剧烈头痛，呕吐3次来诊治。查体：昏迷，P64次/分，Bp180/90mmHg,R18次/分,左瞳孔3mm,右瞳孔2mm,右侧下肢肌力III级。诊断应考虑为

A.脑震荡

B.脑挫伤

C.急性硬膜外血肿

D.急性硬膜下血肿

E.急性脑内血肿

正确答案：C,

第 95 题 (单项选择题)

短暂性脑缺血发作(TIA)，出现相应的症状及体征，完全恢复最长应在

A. 6小时内

B. 12小时内

C. 24 小时内

D. 48 小时内

E. 72 小时内

正确答案：C,

第 96 题 (单项选择题)

一青年患者，突然出现剧烈头痛、恶心和呕吐，意识清，四肢无瘫痪，颈项有阻力。为鉴别其为蛛网膜下腔出血还是化脓性脑膜炎，宜采用的主要方

法是

A. 血白细胞总数和分类检查

B. 颅脑 CT 扫描

C. 反复测量体温

D. 抽血作细菌培养

E. 腰椎穿刺查脑脊液

正确答案：E,

第 97 题 (单项选择题)

男性，16 岁，3 天来左膝关节肿胀。自幼于外伤后易出血不止，查体：皮肤黏膜未见出血及紫癜，出血时间 2min，凝血时间 30min，凝血酶时间正常，疾病分类为

A. 纤维蛋白生成障碍

B. 凝血酶生成障碍

C.血小板异常

D.凝血活酶生成障碍

E.血管壁功能异常

正确答案：B,

第 98 题 (单项选择题)

颅内肿瘤中最多见的是

A.转移瘤

B.脑膜瘤

C.神经上皮性肿瘤

D.垂体腺瘤

E.胆脂瘤

正确答案：C,

第 99 题 (单项选择题)

在中国，急性胰腺炎最常见的诱因是

A.暴饮暴食

B.酗酒

C.胆道结石病

D.胃肠炎

E.甲状旁腺功能亢进

正确答案：C,

第 100 题 (单项选择题)

西方国家急性胰腺炎最常见的致病因素是

A.暴饮暴食

B.酗酒

C.胆道结石病

D.胃肠炎

E.甲状旁腺功能亢进

正确答案：B, 第 101 题 (单项选择题)

伴有低血钾的高血压，应首先考虑哪种疾病

A.皮质醇增多症

B.原发性醛固酮增多症

C.嗜铬细胞瘤

D.慢性肾炎

E.肾动脉狭窄

正确答案：B,

第 102 题 (单项选择题)

在高血压的内分泌疾病中，尿儿茶酚胺增多见于

A.皮质醇增多症

B.原发性醛固酮增多症

C.嗜铬细胞瘤

D.慢性肾炎

E.肾动脉狭窄

正确答案：E,

第 103 题 (单项选择题)

胃癌好发部位是

A.幽门管

B.胃底和胃体

C.胃体大弯侧

D.胃窦小弯侧

E.贲门小弯侧

正确答案：D,

第 104 题 (单项选择题)

胃粘膜分泌盐酸的壁细胞主要分布于

A.幽门管

B.胃底和胃体

C.胃体大弯侧

D.胃窦小弯侧

E.贲门小弯侧

正确答案：B,

第 105 题 (单项选择题)

哪种贫血可进行骨髓移植治疗

A.巨幼细胞性贫血

B.再生障碍性贫血

C.自身免疫性溶血性贫血

D.慢性病贫血

E.缺铁性贫血

正确答案：B,

第 106 题 (单项选择题)

哪种疾病出现原位溶血

A.巨幼细胞性贫血

B.再生障碍性贫血

C.自身免疫性溶血性贫血

D.慢性病贫血

E.缺铁性贫血

正确答案：A,

第 107 题 (单项选择题)

一侧肾结核无功能，对侧肾正常，应作

- A.抗结核治疗
- B.病灶清除术
- C.肾部分切除术
- D.肾切除术
- E.肾造瘘

正确答案：D,

第 108 题 (单项选择题)

一侧肾结核无功能，对侧肾重度积水并尿毒症,应先作

- A.抗结核治疗
- B.病灶清除术
- C.肾部分切除术
- D.肾切除术
- E.肾造瘘

正确答案：E,

第 109 题 (单项选择题)

代谢性碱中毒伴有的电解质紊乱是

- A.低钾血症
- B.高钙血症

C.镁缺乏

D.高钾血症

E.高氯血症

正确答案：A,

第 110 题 (单项选择题)

结肠破裂修补术后 5 天，病人血钠 136mmol/L，血钾 6.8mmol/L,血 PH 值 7.3，近 24 小时尿量 520mL，应诊断为

A.低钾血症

B.高钙血症

C.镁缺乏

D.高钾血症

E.高氯血症

正确答案：D,

第 111 题 (单项选择题)

仅用等渗盐水纠正等渗性缺水时，可导致

A.低钾血症

B.高钙血症

C.镁缺乏

D.高钾血症

E.高氯血症

正确答案：E,

第 112 题 (单项选择题)

慢性肾功能不全出现肾性贫血最合适的治疗药物是

A. 口服碳酸钙

B.必需氨基酸疗法

C.补充 1, 25-(OH) 2-D 3

D.促红细胞生成素

E.血液透析治疗

正确答案：D,

第 113 题 (单项选择题)

尿毒症患者伴高钾血症最有效的降低血钾疗法是

A. 口服碳酸钙

B.必需氨基酸疗法

C.补充 1, 25-(OH) 2-D 3

D.促红细胞生成素

E.血液透析治疗

正确答案：E,

第 114 题 (单项选择题)

男，38岁，间歇性水肿10余年，10mmHg，尿蛋白++，颗粒管型2~3t/HP，尿比重1.010~1.012

可能的诊断是

- A. 肝炎后肝硬化
- B. 原发性高血压
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 肾病综合征

正确答案：E,

第115题 (单项选择题)

男，38岁，间歇性水肿10余年，10mmHg，尿蛋白++，颗粒管型2~3t/HP，尿比重1.010~1.012

为了解该患者双肾是否已经缩小，应首选的检查是

- A. 静脉肾盂造影
- B. ECT
- C. CT
- D. 放射性核素肾图
- E. B超

正确答案：E,

第 116 题 (单项选择题)

女性，48 岁，发作性剑突下及右上腹绞痛 3 天，伴有寒战，半年前有类似发作史。查体：体温 39℃，脉搏 110 次/分，血压 140/85mmHg，血常规检查：WBC $12 \times 10^9/L$ ，N80%，神志清楚，皮肤，巩膜黄染，右肋缘下触及肿大的胆囊，触痛。

首选的检查方法是

A.腹部 B 超

B. MRCP

C. ETCP

D. PTC

C. E.腹部 CT

正确答案：A,

第 117 题 (单项选择题)

女性，48 岁，发作性剑突下及右上腹绞痛 3 天，伴有寒战，半年前有类似发作史。查体：体温 39℃，脉搏 110 次/分，血压 140/85mmHg，血常规检查：WBC $12 \times 10^9/L$ ，N80%，神志清楚，皮肤，巩膜黄染，右肋缘下触及肿大的胆囊，触痛。

该病人此时最有效的处理是

A.胆总管切开取石，T 形管引流

B.联合应用大剂量抗生素

C.补液，恢复血容量

D.给予糖皮质激素

E.物理降温，支持治疗

正确答案：A,

第 118 题 (单项选择题)

女性，51 岁，乙型肝炎病史 30 余年。2 小时前进食烧饼后突然出现呕血，量约 800ml。查体未发现全身皮肤，粘膜黄染和腹水。如果该病人需要接受急诊手术，最佳手术方式是

A.经颈静脉肝内门体分流术

B.非选择性门体分流术

C.选择性门体分流术

D.贲门周围血管离断术

E.脾切除术

正确答案：D,

第 119 题 (单项选择题)

下列哪项不是肝性脑病的诱因

A.消化道出血

B.高钾性酸中毒

C.便秘

D.低血糖

E.缺氧

正确答案：B,

第 120 题 (单项选择题)

女性，30 岁，4 小时前跌伤后昏迷 5 分钟,清醒后步行回家。1 小时前因剧烈疼痛，呕吐 3 次来诊。查体：昏迷，P64 次/分，BP180/90mmHg,R18 次/分，左瞳孔 3mm，右瞳孔 2mm, 右侧下肢肌力 III 级。

诊断应考虑为

- A.脑震荡
- B.脑挫伤
- C.急性硬膜外血肿
- D.急性硬膜下血肿
- E.急性脑内血肿

正确答案：C,

第 121 题 (单项选择题)

女性，30 岁，4 小时前跌伤后昏迷 5 分钟,清醒后步行回家。1 小时前因剧烈疼痛，呕吐 3 次来诊。查体：昏迷，P64 次/分，BP180/90mmHg,R18 次/分，左瞳孔 3mm，右瞳孔 2mm, 右侧下肢肌力 III 级。

应立即采取的检查方法是

- A.脑电图
- B.脑血管造影
- C.头部 CT

D.眼底检查

E.心电图

正确答案：C,

第 122 题 (单项选择题)

女性，30岁，4小时前跌伤后昏迷5分钟，清醒后步行回家。1小时前因剧烈疼痛，呕吐3次来诊。查体：昏迷，P64次/分，BP180/90mmHg，R18次/分，左瞳孔3mm，右瞳孔2mm，右侧下肢肌力III级。

应立即采取的急救措施是

A.应用促苏醒剂

B.应用降血压药

C.亚低温治疗

D.严密观察病情变化

E.静滴甘露醇，同时作开颅准备

正确答案：E,

第 123 题 (单项选择题)

右肾绞痛伴有血尿，进一步检查，应先进行

A.膀胱镜

B.静脉尿路造影

C.X线平片

D.尿找肿瘤细胞

E. CT

正确答案：C,

第 124 题 (单项选择题)

腹部平片不易显影的尿结石是

A.磷酸盐结石

B.草酸盐结石

C.碳酸盐结石

D.尿酸结石

E.混合结石

正确答案：D,

第 125 题 (单项选择题)

女，35岁，半年前母突然病故。此后失眠，情绪低沉，不愿与人交往。近3个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母被害之事，后来又感到自己的思维，情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常。

该患者没有出现的症状是

A.被害妄想

B.强制性思维

C.情感低落

D.思维被洞悉妄想

E.言语性幻听

正确答案：B,

第 126 题 (单项选择题)

女，35岁，半年前母突然病故。此后失眠，情绪低沉，不愿与人交往。近3个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母被害之事，后来又感到自己的思维，情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常。

该患者最可能的诊断是

A.抑郁症伴精神病性症状

B.反应性神经病

C.神经衰弱

D.精神分裂症伴抑郁症状

E.躯体疾病所致精神障碍

正确答案：D,

第 127 题 (单项选择题)

女，35岁，半年前母突然病故。此后失眠，情绪低沉，不愿与人交往。近3个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母被害之事，后来又感到自己的思维，情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常。

该患者治疗首选的药物是

A.氯硝安定

B.氟西丁

C.氯丙嗪

D.丙咪嗪

E.利培酮

正确答案：E,

第 128 题 (单项选择题)

骨髓中找到里一斯细胞，下列哪种疾病最有诊断

A.霍奇金病

B.非霍奇金淋巴瘤

C.急性粒细胞白血病

D.急性淋巴细胞白血病

E.急性单核细胞白血病

正确答案：A,

第 129 题 (单项选择题)

恶性淋巴瘤累及颈，腹股沟淋巴结，肝及肺,并伴有发热，盗汗及体重减轻，临床分期属

A.III A

B. IV B

C. IV A

D. III B

E. IIB

正确答案：B,

第 130 题 (单项选择题)

霍奇金病特征性的热型是

A.间歇热

B.稽留热

C.弛张热

D.周期性发热

E.不规则热

正确答案：D,

第 131 题 (单项选择题)

女，43 岁，右下腹持续性疼痛 5 天，伴恶心、呕吐，呕出物为胃内容物。体温 38.5℃。

体检发现右下腹 5cm*5.5cm 大小肿块。触痛明显。最可能的诊断是

A.粪块所致肠梗阻

B.盲肠肿瘤

C.急性化脓性阑尾炎

D.阑尾周围脓肿

E.盲肠扭转

正确答案：D,

第 132 题 (单项选择题)

女，43 岁，右下腹持续性疼痛 5 天，伴恶心、呕吐，呕出物为胃内容物。体温 38.5℃。体检发现右下腹 5cm*5.5cm 大小肿块。触痛明显。此时较合适的处理是

A.急诊行阑尾切除术

B.急诊手术脓肿引流

C.肠道准备后行右半结肠切除术

D. X 线钡灌肠

E.暂不手术,保守治疗

正确答案：E,

第 133 题 (单项选择题)

女性，41 岁，近 3 周出现兴趣缺乏，易疲劳，言语少，动作迟缓，自觉脑子笨,没有以前聪明，早醒，食欲减退，腹胀，便秘，全身酸痛，有时感心慌气急。

你认为该病人最可能的诊断是

A.焦虑症

B.神经衰弱

C.疑病症

D.抑郁症

E.癔症

正确答案：D,

第 134 题 (单项选择题)

女性，41 岁，近 3 周出现兴趣缺乏，易疲劳，言语少，动作迟缓，自觉脑子笨,没有以前聪明，早醒，食欲减退，腹胀，便秘，全身酸痛，有时感心慌气急。

常三环类抗抑郁药物的每天有效治疗剂量一般至少为

A. 50mg

B.75mg

C. 100mg

D. 150mg

E. 300mg

正确答案：D,

第 135 题 (单项选择题)

抑郁症的主要症状不包括

A. “三无”症状

B. “三自”症状

C.自杀

D.情绪低落昼重夜轻

E.情绪低落昼轻夜重

正确答案：E,

第 136 题 (单项选择题)

女性，30岁。2天来进行性双下肢瘫痪,大小便障碍，体温正常。胸水平以下深浅感觉丧失和截瘫。脑脊液检查压力正常，白细胞 $80 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞占 80%,蛋白轻度增高。最可能的诊断是

- A.脊髓出血
- B.急性骨髓炎
- C.脊髓肿瘤
- D.多发性硬化
- E.急性硬膜外脓肿

正确答案：B,

第 137 题 (单项选择题)

女性，30岁。2天来进行性双下肢瘫痪,大小便障碍，体温正常。胸水平以下深浅感觉丧失和截瘫。脑脊液检查压力正常，白细胞 $80 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞占 80%,蛋白轻度增高。脊髓灰质炎的瘫痪特点是

- A.对称性迟缓性瘫痪，有感觉障碍
- B.对称性迟缓性瘫痪，无感觉障碍
- C.不对称性迟缓性瘫痪，有感觉障碍
- D.不对称性迟缓性瘫痪，无感觉障碍
- E.双下肢痉挛性瘫痪，无感觉障碍

正确答案: D,

第 138 题 (单项选择题)

心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

A.妊娠 20 ~22 周

B.妊娠 24~26 周

C.妊娠 28~30 周

D.妊娠 32 ~34 周

E.妊娠 36 ~38 周

正确答案: D,

第 139 题 (单项选择题)

男, 40 岁, 发现血尿, 蛋白尿 5 年, 查体: BP150/90mmHg, 24 小时尿蛋白定量 1.0~1.7g, 血肌酐 100 μ mol/L。

首选考虑的临床诊断是

A.肾血管性高血压

B.慢性肾炎

C.隐匿性肾炎

D.高血压肾损害

E.肾病综合症

正确答案: B,

第 140 题 (单项选择题)

男, 40 岁, 发现血尿, 蛋白尿 5 年, 查体: BP150/90mmHg, 24 小时尿蛋白定量 1.0~1.7g, 血肌酐 100 μ mol/L。

理想的血压控制目标是

A. <160/95mmHg

B. <140/90mmHg

C. <160/85mmHg

D. <135/85mmHg

C. E. <125/75mmHg

正确答案: E,

第 141 题 (单项选择题)

男, 40 岁, 发现血尿, 蛋白尿 5 年, 查体: BP150/90mmHg, 24 小时尿蛋白定量 1.0~1.7g, 血肌酐 100 μ mol/L。

治疗的主要目标是

A. 防止或延缓肾脏病进展

B. 降血压

C. 消除尿蛋白

D. 消除血尿

E. 消除水肿

正确答案：A,

第 142 题 (单项选择题)

下列哪种药物不用于难治性肾病综合症的治疗

A.甲泼尼龙

B.环孢素 A

C.环磷酰胺

D.硫唑嘌呤

E.氟尿嘧啶

正确答案：E,

第 143 题 (单项选择题)

初步的诊断最可能是

A.原发性甲亢

B.单纯性甲状腺肿

C.继发性甲亢

D.桥本甲状腺炎

E.亚急性甲状腺炎

正确答案：C,

第 144 题 (单项选择题)

女性,35 岁,颈前区肿块 10 年,近年来易出现出汗、心悸,渐感呼吸困难。体检:晨起心率 104/分, BP120/60mmHg;无突眼,甲状腺 III 度肿大,结节状,心电图示:窦性心率不齐。

确诊主要依据

- A.颈部 CT
- B.血 T₃, T₄ 值
- C.甲状腺 B 超
- D.颈部 X 线检查
- E. MRI

正确答案: B,

第 145 题 (单项选择题)

女性,35 岁,颈前区肿块 10 年,近年来易出现出汗、心悸,渐感呼吸困难。体检:晨起心率 104/分, BP120/60mmHg;无突眼,甲状腺 III 度肿大,结节状,心电图示:窦性心率不齐。

最佳的治疗方法是

- A.内科药物治疗
- B.甲状腺大部分切除术
- C.甲状腺全切术
- D.放射性核素治疗
- E.外放射治疗

正确答案：B,

第 146 题 (单项选择题)

男性，37 岁，中上腹饥饿性隐痛反复发作 7 年,伴泛酸，嗝气,进食和服用抑酸剂可缓解。
4 小时前突然出现中上腹剧痛并且腹痛持续存在。

该患者可能发生的并发症是

- A.急性胰腺炎并发出血坏死
- B.食管穿孔
- C.胃癌并发幽门梗阻
- D.消化性溃疡并发急性穿孔
- E.急性胆囊炎并发胆汁性腹膜炎

正确答案：D,

第 147 题 (单项选择题)

男性，37 岁，中上腹饥饿性隐痛反复发作 7 年,伴泛酸，嗝气,进食和服用抑酸剂可缓解。
4 小时前突然出现中上腹剧痛并且腹痛持续存在。

为确诊应选择的检查手段是

- A.血清淀粉酶测定
- B.癌胚抗原测定
- C.胃镜检查
- D.腹部 X 片

E.中腹部 B 超

正确答案：D,

第 148 题 (单项选择题)

男，54 岁，2 型糖尿病 15 年，长期口服格列本脲，10mg/d。查体：血压 140/90mmHg，心肺和腹部检查未见异常，双下肢无水肿。眼底检查：视网膜病变 III 期。空腹血糖 6.8mmol/L，餐后 2h 血糖 10.6mmol/L，血尿素氮 6.2mmol/L，血肌酐 92.5mmol/L。尿常规检查尿糖 50mmol/L,蛋白阴性。为排除糖尿病肾病，最需要的实验室检查是

A.尿酸化功能试验

B.尿相差显微镜检

C.肌酐清除率

D.尿微量白蛋白

E.24 小时尿蛋白定量

正确答案：D,

第 149 题 (单项选择题)

男，54 岁，2 型糖尿病 15 年，长期口服格列本脲，10mg/d。查体：血压 140/90mmHg，心肺和腹部检查未见异常，双下肢无水肿。眼底检查：视网膜病变 III 期。空腹血糖 6.8mmol/L，餐后 2h 血糖 10.6mmol/L，血尿素氮 6.2mmol/L，血肌酐 92.5mmol/L。尿常规检查尿糖 50mmol/L,蛋白阴性。糖尿病治疗应选择

A.磺脲类降血糖药加量

B.双胍类降血糖药

C. α -葡萄糖苷酶抑制剂

D.噻唑烷二酮类

E.胰岛素

正确答案：E,

第 150 题 (单项选择题)

男，54岁，2型糖尿病15年，长期口服格列本脲，10mg/d。查体：血压140/90mmHg，心肺和腹部检查未见异常，双下肢无水肿。眼底检查：视网膜病变III期。空腹血糖6.8mmol/L，餐后2h血糖10.6mmol/L，血尿素氮6.2mmol/L，血肌酐92.5mmol/L。尿常规检查尿糖50mmol/L，蛋白阴性。经检查为糖尿病早期肾病，治疗应首选

A.利尿剂

B.血管紧张素转换酶抑制剂

C. α 受体阻滞剂

D. β 受体阻滞剂

E.钙通道阻滞剂

正确答案：B,