



中华人民共和国国家标准

GB 2898—1995

50% 对 硫 磷 乳 油

50% Parathion emulsifiable concentrate

1995-06-12 发布

1996-02-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 2898—1995

50% 对 硫 磷 乳 油

代替 GB 2898—82

50% Parathion emulsifiable concentrate

1 主题内容与适用范围

本标准规定了对硫磷乳油的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存的要求。本标准适用于由对硫磷原药与乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制的乳油。

2 引用标准

GB 190 危险货物包装标志
GB 191 包装储运图示标志
GB/T 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备
GB/T 1600 农药水分测定方法
GB/T 1604 农药验收规则
GB/T 1605 商品农药采样方法
GB 3796 农药包装通则
GB 4838 乳油农药包装

3 技术要求

3.1 外观：棕色至褐色透明液体。

3.2 对硫磷乳油还应符合下列指标要求：

项 目	指 标
对硫磷含量, % (m/m) \geq	50.0
水分, % (m/m) \leq	0.4
酸度(以 H_2SO_4 计), % (m/m) \leq	0.2
乳液稳定性(稀释 200 倍)	合格
低温稳定性 ¹⁾	合格
热贮稳定性 ¹⁾	合格

注：1) 正常生产时，至少半年检验一次。当更换原料，停产检修后重新生产或改变工艺时，应及时检验。

4 试验方法

除另有说明，本试验所使用的试剂均为分析纯；所用的水应符合 GB 6682 中的三级水规格；所述溶液，如未指明溶剂，均系水溶液。

国家技术监督局 1995-06-12 批准

1996-02-01 实施